










ระยะ	พัฒนาการของคัพภะ				
	25 ส่วนในพัน	30 ส่วนในพัน	35 ส่วนในพัน	40 ส่วนในพัน	45 ส่วนในพัน
2-cell					
	1 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง	1-2 ชั่วโมง	1-2 ชั่วโมง
4-cell					
	2 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	2-3 ชั่วโมง	3 ชั่วโมง
8-cell					
	4 ชั่วโมง	4 ชั่วโมง	4-5 ชั่วโมง	5-6 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง


ภาพที่ 10 การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของคัพภะปลิงดำเมื่อทำการฟักที่ความเค็มแตกต่างกัน 5 ระดับ

ระยะ	พัฒนาการของคัพภะ				
	25 ส่วนในพัน	30 ส่วนในพัน	35 ส่วนในพัน	40 ส่วนในพัน	45 ส่วนในพัน
16-cell	 5-6 ชั่วโมง	 4-5 ชั่วโมง	 5-6 ชั่วโมง	 8 ชั่วโมง	 8-9 ชั่วโมง
32-cell	 8 ชั่วโมง	 7-8 ชั่วโมง	 8-9 ชั่วโมง	 12 ชั่วโมง	 ไขเสีย
64-cell	 11 ชั่วโมง	 9-10 ชั่วโมง	 10 ชั่วโมง	 ไขเสีย	-

ภาพที่ 10 (ต่อ)

ระยะ	พัฒนาการของคัพภะ				
	25 ส่วนในพัน	30 ส่วนในพัน	35 ส่วนในพัน	40 ส่วนในพัน	45 ส่วนในพัน
128-cell	 17-18 ชั่วโมง	 13-14 ชั่วโมง	 15-16 ชั่วโมง	-	-
Blastula	 23 ชั่วโมง	 19 ชั่วโมง	 21 ชั่วโมง	-	-
Gastrula	 34 ชั่วโมง	 27 ชั่วโมง	 38 ชั่วโมง	-	-

ภาพที่ 10 (ต่อ)

ระยะ	พัฒนาการของคัพภะ				
	25 ส่วนในพัน	30 ส่วนในพัน	35 ส่วนในพัน	40 ส่วนในพัน	45 ส่วนในพัน
Auricularia				-	-
	63 ชั่วโมง	46 ชั่วโมง	59 ชั่วโมง		

ภาพที่ 10 (ต่อ)