

ตารางที่ 10 ประสิทธิภาพการควบคุมหนอน *Z. ochreata* ในการปลูกข้าวครั้งที่ 2

วิธีการ	จำนวน แมลงก่อนพ่น	จำนวนแมลงหลังการฉีดพ่น ¹							
		1	2	3	4	5	6	7	8
ไม่พ่นสาร	2.60a	3.10b	2.90c	2.40b	2.00c	1.60c	1.40c	0.90c	0.80c
สะค้าน	3.10a	2.50ab	2.50b	1.90ab	1.70c	1.30c	1.00b	0.70c	0.60b
สะเดา	2.40a	2.50ab	2.30ab	1.80ab	1.40bc	1.10bc	0.80ab	0.60bc	0.40ab
Bt	3.70a	1.10a	1.30a	0.70a	0.50a	0.30a	0.00a	0.00a	0.00a
IPM	4.80a	1.60ab	1.60a	0.80a	0.90ab	0.70ab	0.60ab	0.20ab	0.00a
%CV	78.97	77.22	28.12	85.83	58.35	62.53	79.43	93.16	104.75

¹ ค่าเฉลี่ยจำนวนแมลงหลังการฉีดพ่นที่มีตัวอักษรเหมือนกันในแนวดิ่ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT (p=0.05)

ตารางที่ 11 ประสิทธิภาพการควบคุมหนอน *Z. ochreata* ในการปลูกข้าวครั้งที่ 3

วิธีการ	จำนวน แมลงก่อนพ่น	จำนวนแมลงหลังการฉีดพ่น ¹							
		1	2	3	4	5	6	7	8
ไม่พ่นสาร	3.30a	3.90c	3.10c	2.90c	2.10c	1.90d	1.10d	0.90b	0.80c
สะค้าน	3.10a	3.70c	2.90bc	2.70c	1.80c	1.50cd	0.70cd	0.70bc	0.60c
สะเดา	2.40a	3.50bc	2.10b	2.40bc	1.60bc	1.10bc	0.50bc	0.70bc	0.50bc
Bt	2.60a	1.10a	0.40a	1.20a	0.30c	0.00a	0.00a	0.00a	0.00a
IPM	2.90a	1.90ab	0.70a	1.70ab	0.60ab	0.50ab	0.10ab	0.30ab	0.10ab
%CV	49.08	65.87	55.66	45.92	91.25	80.00	109.36	131.99	114.26

¹ค่าเฉลี่ยจำนวนแมลงหลังการฉีดพ่นที่มีตัวอักษรเหมือนกันในแนวดิ่ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT (p=0.05)

ตารางที่ 10 ประสิทธิภาพการควบคุมหนอน *D. accalis* ในการปลูกบัวบกครั้งที่ 1

วิธีการ	จำนวน แมลงก่อนพ่น	จำนวนแมลงหลังการฉีดพ่น ¹							
		1	2	3	4	5	6	7	8
ไม่พ่นสาร	6.20a	6.10a	5.10b	4.90c	2.90c	2.00c	1.20c	1.20c	0.90c
สะค้าน	6.40a	5.60a	4.60ab	4.20bc	2.70c	1.80c	1.00c	0.90bc	0.60b
สะเดา	6.00a	5.10a	4.50ab	4.20bc	2.40bc	1.30bc	0.80bc	0.20ab	0.50ab
Bt	5.60a	4.50a	4.00ab	3.90ab	1.20a	0.00a	0.00a	0.00a	0.00a
IPM	5.20a	4.80a	3.60a	3.20a	1.70ab	0.30ab	0.20ab	0.10a	0.00a
%CV	33.44	57.56	29.84	23.84	45.92	103.10	120.58	161.37	104.08

¹ค่าเฉลี่ยจำนวนแมลงหลังการฉีดพ่นที่มีตัวอักษรเหมือนกันในแนวดิ่ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT (p=0.05)

ตารางที่ 11 ประสิทธิภาพการควบคุมหนอน *D. accalis* ในการปลูกข้าว ครั้งที่ 2

วิธีการ	จำนวน แมลงก่อนพ่น	จำนวนแมลงหลังการฉีดพ่น ¹							
		1	2	3	4	5	6	7	8
ไม่พ่นสาร	4.30a	4.00a	3.90c	2.90b	2.10c	1.40c	1.60c	1.00c	0.70c
สะค้าน	3.90a	4.00a	3.70c	2.70b	1.80bc	1.10bc	0.90bc	0.60bc	0.60bc
สะเดา	4.60a	3.60a	3.50bc	2.40b	1.60bc	0.60ab	0.80bc	0.30ab	0.30ab
Bt	4.50a	2.90a	1.30a	0.90a	0.30a	0.00a	0.00a	0.00a	0.00a
IPM	3.70a	3.40a	1.90ab	1.60a	0.60ab	0.30a	0.40b	0.20ab	0.10a
%CV	27.94	40.30	64.78	40.59	99.77	102.35	92.97	123.46	119.67

¹ค่าเฉลี่ยจำนวนแมลงหลังการฉีดพ่นที่มีตัวอักษรเหมือนกันในแนวดิ่ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT (p=0.05)

ตารางที่ 12 ประสิทธิภาพการควบคุมหนอน *D. acalis* ในการปลูกข้าว ครั้งที่ 3

วิธีการ	จำนวน แมลงก่อนพ่น	จำนวนแมลงหลังการฉีดพ่น ¹							
		1	2	3	4	5	6	7	8
ไม่พ่นสาร	5.40a	5.20b	4.30c	3.10c	2.90d	2.10c	1.10d	1.20c	0.90c
สะก้าน	4.00a	4.40ab	4.00bc	2.90c	2.40cd	1.90bc	0.70cd	0.90c	0.70b
สะเดา	4.20a	4.20ab	3.90bc	2.10bc	1.80bc	1.00ab	0.50bc	0.70bc	0.40ab
Bt	4.20a	3.10a	1.30a	1.00a	0.30a	0.00a	0.00a	0.00a	0.00a
IPM	4.80a	3.60a	2.00ab	1.60ab	1.00ab	0.60a	0.10ab	0.20ab	0.00a
%CV	64.39	36.52	73.10	53.55	58.18	96.16	109.36	117.06	101.37

¹ค่าเฉลี่ยจำนวนแมลงหลังการฉีดพ่นที่มีตัวอักษรเหมือนกันในแนวดิ่ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT (p=0.05)