

ตารางที่ 13 ผลของปริมาณน้ำและกลูโคสไซรัปต่อค่าเนื้อสัมผัสของพลับแผ่นดิน

สิ่งทดลอง ที่	น้ำ (%)	กลูโคส ไซรัป (%)	Tensile force (N)	Hardness (N)	Cohesiveness	Chewiness (N-mm)	Adhesiveness (N-mm)
1	5	0	16.84±3.11a	199.21±29.66a	0.70±0.11a	180.95±61.68a	0.88±1.37a
2		5	15.66±4.36ab	167.85±34.19b	0.59±0.10b	144.59±43.53b	0.98±1.54 a
3		10	13.19±4.02c	167.19±26.68b	0.60±0.09b	135.06±36.90bc	1.66±1.76 a
4	10	0	17.49±3.89a	166.67±29.43b	0.69±0.14a	154.10±53.37b	0.91±1.88 a
5		5	13.85±3.34c	184.61±30.76ab	0.55±0.12c	151.04±42.02b	1.03±1.21 a
6		10	10.91±1.77d	170.87±34.17b	0.57±0.05c	133.26±30.57bc	1.28±1.55 a
7	15	0	17.19±1.92a	162.48±36.77bc	0.65±0.09ab	137.78±47.31bc	0.87±1.44 a
8		5	14.49±1.54bc	174.97±36.31b	0.61±0.07b	147.67±34.20b	0.46±0.44 a
9		10	10.18±1.01d	143.73±26.33c	0.60±0.11b	113.73±28.86c	1.23±1.23 a

หมายเหตุ ตัวอักษร a-c ในแนวดิ่งหมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95