


ภาคผนวก




ภาคผนวก ก

กราฟเปรียบเทียบผลของการใช้สารโคโคซานที่อัตราต่าง ๆ







กราฟเปรียบเทียบผลของการใช้สารไคโตซานที่อัตราต่าง ๆ ต่อความสูงของผักคะน้าในช่วงอายุ 7, 14, 21, 28, 35, 42 และ 49 วัน (ในกระถาง)




กราฟเปรียบเทียบผลของการใช้สารไคโตซานที่อัตราต่าง ๆ ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของผักคะน้าที่ ช่วงอายุ 7, 14, 21, 28, 35, 42 และ 49 วัน (ในกระถาง)




กราฟเปรียบเทียบผลของการไม่พ่นสารไลโคโตซานต่อการป้องกันกำจัดด้วงหมัดผัก หนอนใยผัก และหนอนกระทู้ผัก ของผักคะน้าที่ช่วงอายุ 3 - 45 วัน




กราฟเปรียบเทียบผลของการใช้สารไลโคโตซานที่อัตราการใช้ 5 มิลลิตรต่อการป้องกันกำจัดด้วงหมัดผัก หนอนใยผัก และหนอนกระทู้ผัก ของผักคะน้าที่ช่วงอายุ 3 - 45 วัน




กราฟเปรียบเทียบผลของการใช้สารไคโตซานที่อัตราการใช้ 10 มิลลิกรัมต่อการป้องกันกำจัดด้วงหมัดฝัก หนอนใยฝัก และหนอนกระทุ้งฝัก ของฝักกะน้าในช่วงอายุ 3 - 45 วัน




กราฟเปรียบเทียบผลของการใช้สารไคโตซานที่อัตราการใช้ 15 มิลลิกรัมต่อการป้องกันกำจัดด้วงหมัดฝัก หนอนใยฝัก และหนอนกระทุ้งฝัก ของฝักกะน้าในช่วงอายุ 3 - 45 วัน



กราฟเปรียบเทียบผลของการใช้สารไคโตซานที่อัตราการใช้ 20 มิลลิกรัมต่อการป้องกันกำจัดด้วงหมัดฝัก หนอนใยฝัก และหนอนกระทุ้งฝัก ของฝักกะน้ำที่ช่วงอายุ 3 - 45 วัน




กราฟเปรียบเทียบผลของการใช้สารไคโตซานที่อัตราต่างๆ ต่อความสูงของฝักกะน้ำที่ช่วงอายุ 7, 14, 21, 28, 35, 42 และ 49 วัน (ในแปลง)





กราฟเปรียบเทียบผลของการใช้สารเคโตซานที่อัตราต่าง ๆ ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของผักกระเฉดในช่วงอายุ อายุ 3 - 45 วัน (ในแปลง)

ภาคผนวก ข
ภาพการทดลองปลูกผักคะน้า





ภาพการทดลองปลูกผักคะน้าในกระถางทดลอง (T1 - T3)



ภาพการทดลองปลูกผักคะน้าในกระถางทดลอง (T4 - T5)



ภาพการทดลองปลูกผักคะน้าในแปลงทดลอง

