

## APPENDIX G

ID.....

## Attitudes toward the optimal use of analgesics for cancer pain management

**ส่วนที่ 2** ความเห็นเรื่องการบริหารบำบัดความปวดจากมะเร็งใน ศูนย์มะเร็ง / หน่วยระงับปวดกรุณาทำเครื่องหมาย  $\surd$  ในช่อง [ ] หน้าข้อความที่ท่านเลือกเพียงข้อเดียว

1. ผู้ป่วยมะเร็งที่มีความปวดร่วมด้วยใน ศูนย์มะเร็ง/ หน่วยระงับปวด
  - [ ]<sub>1</sub> ส่วนใหญ่ได้รับการรักษาความปวดที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว
  - [ ]<sub>2</sub> ส่วนใหญ่ได้รับ ยารักษาความปวด มากเกินความจำเป็น
  - [ ]<sub>3</sub> ส่วนใหญ่ได้รับ ยารักษาความปวด น้อยกว่าที่ควรจะได้
  
2. การบำบัดความปวดในผู้ป่วยมะเร็งในศูนย์มะเร็ง / หน่วยระงับปวด คือ
  - [ ]<sub>1</sub> หายปวดโดยสิ้นเชิง
  - [ ]<sub>2</sub> ความปวดลดน้อยลง แต่อยู่ในระดับที่ไม่เป็นทุกข์
  - [ ]<sub>3</sub> ความปวดลดน้อยลงต่อเมื่อผู้ป่วยเป็นผู้ร้องขอยา
  
3. ในประสบการณ์ของท่าน ยาแก้ปวดกลุ่ม opioids สามารถลดความปวดจากมะเร็งได้เท่าใด
  - [ ]<sub>1</sub> 20%    [ ]<sub>2</sub> 40%    [ ]<sub>3</sub> 60%    [ ]<sub>4</sub> 80%    [ ]<sub>5</sub> 100%
  
4. ท่านคิดว่า ผู้ป่วยมะเร็งที่มีความปวดรุนแรงระยะใดจึงสมควรได้ยาแก้ปวดกลุ่ม opioid ใน ขนาดสูงสุด (maximum dose) โดยไม่ต้องคำนึงเรื่องการติดยาหรือติดยา
 

[ ] <sub>1</sub> survival < 1 เดือน	[ ] <sub>2</sub> survival < 3 เดือน
[ ] <sub>3</sub> survival < 6 เดือน	[ ] <sub>4</sub> survival < 12 เดือน
[ ] <sub>5</sub> survival < 24 เดือน	[ ] <sub>6</sub> ไม่ได้คำนึงเรื่องเวลา
  
5. อุบัติการณ์ติดยาแก้ปวดกลุ่ม opioids (Psychological dependence) ในการความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง คือ
 

[ ] <sub>1</sub> < 0.1 %	[ ] <sub>2</sub> 0.1 - 1%
[ ] <sub>3</sub> 1 - 10 %	[ ] <sub>4</sub> > 10%

6. หากผู้ป่วยมะเร็งร้องขอเพิ่มขนาดยาแก้ปวดกลุ่ม opioids ท่านคิดว่า ส่วนใหญ่เกิดจาก
- [ ]<sub>1</sub> ผู้ป่วยติดยาทางจิตใจ ((psychological dependence)
  - [ ]<sub>2</sub> ผู้ป่วยรู้สึกปวดมากขึ้นจริง
  - [ ]<sub>3</sub> ผู้ป่วยเริ่มดื้อยา (tolerance)
  - [ ]<sub>4</sub> ถูกทุกข้อ
7. ท่านคิดว่า ผู้ที่ประเมินระดับความปวดได้ถูกต้องมากที่สุด คือ
- [ ]<sub>1</sub> ผู้ป่วย      [ ]<sub>2</sub> ญาติผู้ป่วย      [ ]<sub>3</sub> แพทย์      [ ]<sub>4</sub> พยาบาล
8. ใน ศูนย์มะเร็ง / หน่วยระงับปวด ส่วนใหญ่ประเมินความปวดโดย
- [ ]<sub>1</sub> ไม่มีการประเมิน
  - [ ]<sub>2</sub> Visual analog scale
  - [ ]<sub>3</sub> Numerical rating scale
  - [ ]<sub>4</sub> Verbal description
  - [ ]<sub>5</sub> อื่นๆ (ระบุ).....