

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.1.1 จากการสำรวจยางพารา 36 แปลง เขตอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พบ โรคใบจุดตาดำ โรคใบไหม้ โรคราแป้ง โรคใบร่วง โรคใบจุดก้ำปลา โรคเส้นดำ โรคหนำียงแห้ง และโรครากเน่า

5.1.2 พบการเกิดโรคเส้นดำสาเหตุจากเชื้อรา *Phytophthora* sp. ทุกตำบลของอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยตำบลสะพลีมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคสูงที่สุด และตำบลทะเลทรัพย์มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคน้อยที่สุด ส่วนระดับความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างกันทางสถิติ

5.1.3 เชื้อรา *Phytophthora* sp. ความสามารถก่อโรคกับสายพันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 ทดสอบโดยวิธี detached leaf

5.1.4 ระดับความรุนแรงและเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเส้นดำของยางพาราสายพันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ควรศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกร

5.2.2 ควรศึกษาผลของการต่อสู้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา