

บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุป

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของหอยทะเลจิ๋ว โดยวิธีการวางทุ่นดักหอยทะเลจิ๋ว (lumun-lumun) บริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี พบหอยทะเลจิ๋วทั้งสิ้น จำนวน 10 อันดับ (orders), 29 วงศ์ (families), 62 สกุล (genera) และ 176 ชนิด (Species) โดยมีหอยในวงศ์ Cerithiidae, Triphoridae, Rissoidae, Pyramidellidae เป็นวงศ์เด่น ระยะเวลาที่เหมาะสมในการวางทุ่นดักหอยทะเลจิ๋ว คือ 4 เดือน และความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในทุ่นดักหอยจิ๋วกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางกายภาพไม่พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการเก็บข้อมูลแบบต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี เพื่อให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของประชาคมหอยทะเลจิ๋วได้ชัดเจนยิ่งขึ้น