

ภาคผนวก

ตารางภาคผนวกที่ 1 น้ำหนักตัวณลี่ย (กรัมต่อตัว) ในแต่ละชุดการทดลอง

| ชุดการทดลอง | 2 สัปดาห์ | 4 สัปดาห์ | 6 สัปดาห์ | 8 สัปดาห์ |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| T_1R_1 | 3.93 | 7.21 | 11.02 | 15.84 |
| T_1R_2 | 4.37 | 7.19 | 11.47 | 16.99 |
| T_1R_3 | 4.27 | 7.51 | 11.84 | 18.37 |
| T_2R_1 | 3.65 | 5.88 | 10.11 | 15.57 |
| T_2R_2 | 3.32 | 5.54 | 8.32 | 12.03 |
| T_2R_3 | 4.56 | 8.25 | 13.21 | 19.71 |
| T_3R_1 | 3.13 | 5.95 | 9.78 | 16.31 |
| T_3R_2 | 4.43 | 7.85 | 11.53 | 17.79 |
| T_3R_3 | 3.96 | 6.25 | 10.15 | 16.55 |
| T_4R_1 | 4.76 | 8.29 | 12.54 | 18.13 |
| T_4R_2 | 4.04 | 6.68 | 10.26 | 15.07 |
| T_4R_3 | 3.80 | 6.75 | 9.59 | 14.09 |
| T_5R_1 | 3.56 | 6.01 | 9.85 | 15.39 |
| T_5R_2 | 3.23 | 6.64 | 9.07 | 12.57 |
| T_5R_3 | 4.10 | 6.81 | 11.49 | 17.08 |

ตารางภาคผนวกที่ 2 น้ำหนักเพิ่มเฉลี่ย (กรัมต่อตัว) ในแต่ละชุดการทดลอง

| ชุดการทดลอง | 2 สัปดาห์ | 4 สัปดาห์ | 6 สัปดาห์ | 8 สัปดาห์ |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| T_1R_1 | 2.39 | 3.28 | 3.81 | 4.82 |
| T_1R_2 | 2.83 | 2.82 | 4.28 | 5.52 |
| T_1R_3 | 2.73 | 3.24 | 4.33 | 6.35 |
| T_2R_1 | 2.11 | 2.23 | 4.23 | 5.46 |
| T_2R_2 | 1.78 | 2.22 | 2.78 | 3.71 |
| T_2R_3 | 3.02 | 3.69 | 4.96 | 6.49 |
| T_3R_1 | 1.59 | 2.82 | 3.83 | 6.53 |
| T_3R_2 | 2.89 | 3.42 | 3.68 | 6.25 |
| T_3R_3 | 2.42 | 2.29 | 3.90 | 6.40 |
| T_4R_1 | 3.22 | 3.53 | 4.25 | 5.59 |
| T_4R_2 | 2.50 | 2.64 | 3.58 | 4.81 |
| T_4R_3 | 2.26 | 2.95 | 2.84 | 4.50 |
| T_5R_1 | 2.02 | 2.45 | 3.84 | 5.54 |
| T_5R_2 | 1.69 | 3.41 | 2.43 | 3.50 |
| T_5R_3 | 2.56 | 2.71 | 4.68 | 5.59 |

ตารางภาคผนวกที่ 3 น้ำหนักตัวเพิ่มต่อวัน ในแต่ละชุดการทดลอง

| ชุดการทดลอง | 2 สัปดาห์ | 4 สัปดาห์ | 6 สัปดาห์ | 8 สัปดาห์ |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| T_1R_1 | 0.28 | 0.51 | 0.78 | 1.13 |
| T_1R_2 | 0.31 | 0.51 | 0.81 | 1.21 |
| T_1R_3 | 0.30 | 0.53 | 0.84 | 1.31 |
| T_2R_1 | 0.26 | 0.42 | 0.72 | 1.11 |
| T_2R_2 | 0.23 | 0.39 | 0.59 | 0.85 |
| T_2R_3 | 0.32 | 0.58 | 0.94 | 1.40 |
| T_3R_1 | 0.22 | 0.42 | 0.69 | 1.16 |
| T_3R_2 | 0.31 | 0.56 | 0.82 | 1.27 |
| T_3R_3 | 0.28 | 0.44 | 0.72 | 1.18 |
| T_4R_1 | 0.34 | 0.59 | 0.89 | 1.29 |
| T_4R_2 | 0.28 | 0.47 | 0.73 | 1.07 |
| T_4R_3 | 0.27 | 0.48 | 0.68 | 1.01 |
| T_5R_1 | 0.25 | 0.42 | 0.7 | 1.09 |
| T_5R_2 | 0.23 | 0.47 | 0.64 | 0.89 |
| T_5R_3 | 0.29 | 0.48 | 0.82 | 1.22 |

ตารางภาคผนวกที่ 4 อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์) ในแต่ละชุดการทดลอง

| ชุดการทดลอง | 2 สัปดาห์ | 4 สัปดาห์ | 6 สัปดาห์ | 8 สัปดาห์ |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| T_1R_1 | 100 | 95 | 95 | 95 |
| T_1R_2 | 100 | 90 | 85 | 85 |
| T_1R_3 | 100 | 95 | 95 | 95 |
| T_2R_1 | 100 | 100 | 95 | 95 |
| T_2R_2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| T_2R_3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| T_3R_1 | 100 | 100 | 100 | 85 |
| T_3R_2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| T_3R_3 | 100 | 95 | 95 | 95 |
| T_4R_1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| T_4R_2 | 100 | 95 | 95 | 95 |
| T_4R_3 | 100 | 95 | 95 | 90 |
| T_5R_1 | 100 | 95 | 90 | 90 |
| T_5R_2 | 100 | 100 | 100 | 95 |
| T_5R_3 | 100 | 100 | 95 | 95 |

ตารางภาคผนวกที่ 5 อัตราการแลกเปลี่ยน ในแต่ละชุดการทดลอง

| ชุดการทดลอง | 2 สัปดาห์ | 4 สัปดาห์ | 6 สัปดาห์ | 8 สัปดาห์ |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| T_1R_1 | 1.84 | 2.30 | 2.53 | 2.39 |
| T_1R_2 | 1.18 | 2.99 | 2.47 | 2.31 |
| T_1R_3 | 1.21 | 1.69 | 1.95 | 1.71 |
| T_2R_1 | 1.92 | 2.84 | 2.76 | 2.51 |
| T_2R_2 | 2.38 | 3.28 | 3.84 | 3.27 |
| T_2R_3 | 1.51 | 2.03 | 2.21 | 1.73 |
| T_3R_1 | 2.26 | 2.13 | 2.32 | 2.58 |
| T_3R_2 | 1.18 | 2.01 | 2.92 | 2.10 |
| T_3R_3 | 1.63 | 3.32 | 2.45 | 2.06 |
| T_4R_1 | 1.22 | 2.05 | 2.49 | 1.95 |
| T_4R_2 | 1.39 | 2.82 | 2.65 | 2.43 |
| T_4R_3 | 1.64 | 2.58 | 3.58 | 3.50 |
| T_5R_1 | 2.09 | 3.25 | 3.15 | 2.46 |
| T_5R_2 | 2.21 | 2.26 | 2.77 | 4.19 |
| T_5R_3 | 1.55 | 2.19 | 2.38 | 2.38 |