

ผนวก ข

ข้อมูลทางสถิติของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 1

จำนวนและค่าร้อยละ จำแนกตามอายุกับพฤติกรรม
การป้องกันการใช้เข็มฉีดยา

อายุ	ระดับพฤติกรรม				รวม	
	ระดับต่ำ		ระดับสูง			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 30 ปี	24	21.8	21	14.7	45	17.8
31-35 ปี	27	24.5	35	24.5	62	24.5
36-40 ปี	18	16.4	24	16.8	42	16.6
41-45 ปี	10	9.1	14	9.8	24	9.5
46-50 ปี	15	13.6	22	15.4	37	14.6
51 ปี ขึ้นไป	16	14.5	27	18.9	43	17.0
รวม	110	100.0	143	100.0	253	100.0

Chi-Square = 2.634 df =5 Sig.= 0.7561

ตารางที่ 2

จำนวนและค่าร้อยละ จำแนกตามสถานภาพสมรสกับ
พฤติกรรมการป้องกันการใช้เข็มฉีดยา

สถานภาพสมรส	ระดับพฤติกรรม				รวม	
	ระดับต่ำ		ระดับสูง			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โสด	53	48.2	58	40.6	111	43.9
สมรส	38	34.5	64	44.8	102	40.3
หย่า/หม้าย	19	17.3	21	14.7	40	15.8
รวม	110	100.0	143	100.0	253	100.0

Chi-Square = 2.69417 df =2 Sig.= .2600

ตารางที่ 3
จำนวนและค่าร้อยละ จำแนกตามการศึกษา กับ
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์

การศึกษา	ระดับพฤติกรรม				รวม	
	ระดับต่ำ		ระดับสูง			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่าประถมศึกษา	11	10.0	13	9.1	24	9.5
ประถมศึกษา	25	22.7	27	18.9	52	20.6
มัธยมศึกษาตอนต้น	26	23.6	46	32.2	72	28.5
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.ขึ้นไป	48	43.6	57	39.9	105	41.5
รวม	110	100.0	143	100.0	253	100.0

Chi-Square = 2.30545 df = 3 Sig. = 0.5115

ตารางที่ 4
จำนวนและค่าร้อยละ จำแนกตามอาชีพ กับพฤติกรรม
การป้องกันการติดเชื้อเอดส์

อาชีพ	ระดับพฤติกรรม				รวม	
	ระดับต่ำ		ระดับสูง			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ว่างงาน	32	29.1	40	28.0	72	28.0
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว	21	19.1	34	23.8	55	21.7
รับจ้าง	50	45.5	51	35.7	101	39.9
พนักงานบริษัท / ห้างร้าน	6	5.5	14	9.8	20	7.9
รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ	1	0.9	4	2.8	5	2.0
รวม	110	100.0	143	100.0	253	100.0

Chi-Square = 4.74795 df = 4 Sig. = 0.3142

ตารางที่ 5
จำนวนและค่าร้อยละ จำแนกตามประวัติการใช้ยาเสพติดเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่ฉีดยาเสพติด กับพฤติกรรมการป้องกัน
การติดเชื้อเอดส์

ระยะเวลา	ระดับพฤติกรรม				รวม	
	ระดับต่ำ		ระดับสูง			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 5 ปี	16	14.5	25	17.5	41	16.2
6-10 ปี	31	28.2	35	24.5	66	26.1
11-15 ปี	28	25.5	31	21.7	59	23.3
16-20 ปี	17	15.5	28	19.6	45	17.8
21 ปี ขึ้นไป	18	16.4	24	16.8	42	16.6
รวม	110	100.0	143	100.0	253	100.0

Chi-Square = 1.640 df = 4 Sig. = 0.8016

ตารางที่ 6
จำนวนและค่าร้อยละ จำแนกตามประวัติการใช้ยาเสพติดเกี่ยวกับความถี่
ในการฉีดยาเสพติดกับพฤติกรรมการป้องกันการใช้ยาเสพติด

ความถี่ในการฉีดยาเสพติด	ระดับพฤติกรรม				รวม	
	ระดับต่ำ		ระดับสูง			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ทุกวัน	21	19.1	27	18.9	48	19.0
สัปดาห์ละ 4-5 วัน	8	7.3	6	4.2	14	5.5
สัปดาห์ละ 2-3 วัน	7	6.4	19	13.3	26	10.3
สัปดาห์ละ 1 วัน	6	5.5	8	5.6	14	5.5
เดือนละ 2-3 ครั้ง	9	8.2	6	4.2	15	5.9
เดือนละ 1 ครั้ง	12	10.9	14	9.8	26	10.3
ไม่ได้ฉีด	47	42.7	63	44.1	110	43.5
รวม	110	100.0	143	100.0	253	100.0

Chi-Square = 5.734 df = 6 Sig. = 0.4536

ตารางที่ 7

จำนวน และค่าร้อยละ จำแนกตามประวัติการรักษาเย็บแผลติดเกี่ยวกับ
การเคยเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ที่อื่นนอกจากสถานบำบัดของกรุงเทพมหานครกับ
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์

การเคยบำบัดที่อื่น	ระดับพฤติกรรม				รวม	
	ระดับต่ำ		ระดับสูง			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคย	50	45.5	85	59.4	135	53.4
เคย	60	54.5	58	40.6	118	46.6
รวม	110	100.0	143	100.0	253	100.0

Chi-Square = 4.340 df = 1 Sig. = 0.0372*

ตารางที่ 8

จำนวนและค่าร้อยละ จำแนกตามเครือข่ายทางสังคมจากครอบครัว
กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์

เครือข่ายทางสังคมจากครอบครัว	ระดับพฤติกรรม				รวม	
	ระดับต่ำ		ระดับสูง			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
น้อย (เครือข่าย 1 คน)	66	60.0	75	52.4	141	55.7
ปานกลาง (เครือข่าย 2 คน)	29	26.4	45	31.5	74	29.2
มาก (เครือข่าย 3 คน ขึ้นไป)	15	13.6	23	16.1	38	15.0
รวม	110	100.0	143	100.0	253	100.0

Chi-Square = 1.438 df = 2 Sig. = 0.4872

ตารางที่ 9

จำนวนและค่าร้อยละ จำแนกตามเครือข่ายทางสังคมจากเพื่อน
กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์

เครือข่ายทางสังคมจากเพื่อน	ระดับพฤติกรรม				รวม	
	ระดับต่ำ		ระดับสูง			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
น้อย (เครือข่าย 1 คน)	78	70.9	102	71.3	180	71.1
ปานกลาง (เครือข่าย 2 คน)	25	22.7	37	25.9	62	24.5
มาก (เครือข่าย 3 คน ขึ้นไป)	7	6.4	4	2.8	11	4.3
รวม	110	100.0	143	100.0	253	100.0

Chi-Square = 2.071 df =2 Sig.= 0.3549

ตารางที่ 10

จำนวนและค่าร้อยละ จำแนกตามเครือข่ายทางสังคมจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับพฤติกรรมการป้องกันการ
ติดเชื้อเอดส์

เครือข่ายทางสังคมจากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข	ระดับพฤติกรรม				รวม	
	ระดับต่ำ		ระดับสูง			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
น้อย (เครือข่าย 1 คน)	26	23.6	32	22.4	58	22.9
ปานกลาง (เครือข่าย 2 คน)	49	44.5	58	40.6	107	42.3
มาก (เครือข่าย 3 คน ขึ้นไป)	35	31.8	53	37.1	88	34.8
รวม	110	100.0	143	100.0	253	100.0

Chi-Square = 0.768 df =2 Sig.= 0.6811

ตารางที่ 11

จำนวนและค่าร้อยละ จำแนกตามการได้รับการสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัวกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

การได้รับการสนับสนุนทางสังคม จากครอบครัว	ระดับพฤติกรรม				รวม	
	ระดับต่ำ		ระดับสูง			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
น้อย	44	40.0	42	29.4	86	34.0
ปานกลาง	30	27.3	47	32.9	77	30.4
มาก	36	32.7	54	37.8	90	35.6
รวม	110	100.0	143	100.0	253	100.0

Chi-Square = 3.14899 df = 2 Sig.= 0.2071

ตารางที่ 12

จำนวนและค่าร้อยละ จำแนกตามการได้รับการสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อนกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

การได้รับการสนับสนุนทางสังคม จากเพื่อน	ระดับพฤติกรรม				รวม	
	ระดับต่ำ		ระดับสูง			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
น้อย	50	45.5	69	48.3	119	47.0
ปานกลาง	11	10.0	22	15.4	33	13.0
มาก	49	44.5	52	36.4	101	39.9
รวม	110	100.0	143	100.0	253	100.0

Chi-Square = 2.52805 df = 2 Sig.= 0.2825

ตารางที่ 13

จำนวนและค่าร้อยละ จำแนกตามการได้รับการสนับสนุนทางสังคม
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับพฤติกรรมการป้องกัน
การติดเชื้อเอดส์

การได้รับการสนับสนุนทางสังคม จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	ระดับพฤติกรรม				รวม	
	ระดับต่ำ		ระดับสูง			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
น้อย	41	37.3	51	35.7	92	36.4
ปานกลาง	38	34.5	28	19.6	66	26.1
มาก	31	28.2	64	44.8	95	37.5
รวม	110	100.0	143	100.0	253	100.0

Chi-Square = 9.92986 df = 2 Sig. = 0.007**