

ผลการวิเคราะห์รายข้อ

ตารางที่ 1 จำนวน และร้อยละของข้อมูลด้านความรู้ในการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ

คำถาม	ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ	
	ตอบถูก	ตอบผิด	ตอบถูก	ตอบผิด
1. การที่จะทราบว่าเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับนั้นต้องนำอะไรไปให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจ	908 (87.31%)	132 (12.69%)	973 (93.56%)	67 (6.44%)
2. การตรวจในข้อ 1 เจ้าหน้าที่ตรวจหาอะไร	688 (66.15%)	352 (33.85%)	860 (82.69%)	180 (17.31%)
3. ผู้ที่มีพยาธิใบไม้ตับในร่างกายแต่ยังไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรงมีแนวทางรักษาอย่างไร	936 (90.00%)	104 (10.00%)	1002 (96.35%)	38 (3.65%)
4. เมื่อกินยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับที่หมอจ่ายให้จะมีผลต่อพยาธิใบไม้ตับอย่างไร	657 (63.17%)	383 (36.83%)	877 (84.33%)	163 (15.67%)
5. ผู้ที่มีพยาธิใบไม้ตับและมีอาการรุนแรง ดับโต ตาเหลือง ตัวเหลือง จะมีแนวทางรักษาอย่างไร	510 (49.04%)	530 (50.96%)	855 (82.21%)	185 (17.79%)
6. ปลาในข้อใดถ้ากินดิบหรือสุกๆ ดิบๆ จะทำให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ	641 (61.63%)	399 (38.37%)	917 (88.17%)	123 (11.83%)
7. อาหารในข้อใดที่มีโอกาสทำให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับได้	252 (24.23%)	788 (75.77%)	803 (77.21%)	237 (22.79%)
8. คนที่ไม่ถ่ายอุจจาระลงในส้วมและไม่ขูดหลุมฝัง ชอบถ่ายเรี่ยราดตามพื้นดินพยาธิใบไม้ตับอาจติดต่อมาสู่คนได้โดยวิธีใด	436 (41.92%)	604 (58.08%)	872 (83.85%)	168 (16.15%)
9. การถ่ายอุจจาระในส้วมถูกสุขลักษณะส่งผลดีต่อการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับข้อใด	711 (68.37%)	329 (31.63%)	946 (90.96%)	94 (9.04%)
10. คนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับนานๆ จะทำให้เป็นโรคอะไรต่อไปได้	306 (29.42%)	734 (70.58%)	797 (76.63%)	243 (23.37%)
11. พยาธิตัวดีเกิดจากอะไร	229	811	814	226

	(22.02%)	(77.98%)	(78.27%)	(21.73%)
12. ข้อใดไม่ใช่การป้องกันพยาธิต่างๆ	287 (27.60%)	753 (72.40%)	831 (79.90%)	209 (20.10%)
13. ยารักษาพยาธิใบไม้ตับคืออะไร	150 (14.42%)	890 (85.58%)	719 (69.13%)	321 (30.87%)

ตารางที่ 2 จำนวน และร้อยละของข้อมูลด้านทัศนคติต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ

ข้อความ	ก่อนดำเนินการ			หลังดำเนินการ		
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ
1. การตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิใบไม้ตับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์	771 (74.13%)	176 (16.92%)	93 (8.94%)	919 (88.37%)	108 (10.38%)	13 (1.25%)
2. ข้าพเจ้ารู้สึกพอใจถ้าส่งอุจจาระตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับ	553 (53.17%)	353 (33.94%)	134 (12.88%)	858 (82.50%)	173 (16.63%)	9 (0.87%)
3. ข้าพเจ้าไม่อยากจะนำอุจจาระไปให้หมอตรวจ	92 (8.85%)	347 (33.37%)	601 (57.79%)	3 (0.29%)	141 (13.56%)	896 (86.15%)
4. ถ้าอุจจาระของข้าพเจ้ามีไข่พยาธิใบไม้ตับและหมอจ่ายยาให้ ข้าพเจ้าจะกินยาฆ่าพยาธิทันที	657 (63.17%)	300 (28.85%)	83 (7.98%)	890 (85.58%)	142 (13.65%)	8 (0.77)
5. ข้าพเจ้าจะไม่กินยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับ ถึงแม้จะตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระ	102 (9.81%)	184 (17.67%)	754 (72.50%)	7 (0.67%)	132 (12.69%)	901 (86.63%)
6. การกินอาหารสุกๆ ดิบๆ ที่ทำจากปลาขามีโอกาสเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับได้	656 (63.08%)	306 (29.42%)	78 (7.50%)	869 (83.56%)	166 (15.96%)	5 (0.48%)
7. การกินก้อยปลาดิบๆ	73	182	785	5	113	922

ดีกว่ากินสุกๆ	(7.02%)	(17.50%)	(75.48%)	(0.48%)	(10.87%)	(88.65%)
8. ข้าพเจ้าชอบกินอาหาร พวกก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยว ชีว ส้มปลาขาว จ่อมปลาชีว ดิบๆ	77 (7.40%)	203 (19.52%)	760 (73.08%)	15 (1.44%)	112 (10.77%)	913 (87.79%)
9. ข้าพเจ้าไม่ชอบการกิน ก๋วยเตี๋ยว ปลาต้ม ปลาจ่อม ดิบๆ	714 (68.65%)	197 (18.94%)	129 (12.40%)	893 (85.87%)	130 (12.50%)	17 (1.63%)
10. ถ้าพ่อแม่หรือญาติทำ ก๋วยเตี๋ยว ปลาต้ม ปลาจ่อม ข้าพเจ้าจะกินทันทีเพราะ เป็นเรื่องธรรมดาของชาว อีสาน	234 (22.50%)	363 (34.90%)	443 (42.60%)	26 (2.50%)	194 (18.65%)	820 (78.85%)
11. ข้าพเจ้าชอบที่จะถ่าย อุจจาระลงในส้วมหรือชุก หลุมฝังอุจจาระเสมอ	665 (63.94%)	221 (21.25%)	154 (14.81%)	897 (86.25%)	135 (12.98%)	8 (0.77%)
12. ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจถ้า ได้ถ่ายอุจจาระลงในส้วมเพราะ จะป้องกันเชื้อโรคร้าย ใบไม้ดับได้	731 (70.29%)	181 (17.40%)	128 (12.31%)	923 (88.75%)	100 (9.62%)	17 (1.63%)


ตารางที่ 3 จำนวน และร้อยละของข้อมูลด้านการรับรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ

ข้อความ	ก่อนดำเนินการ			หลังดำเนินการ		
	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย
1. โรคพยาธิใบไม้ตับก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้	666 (64.04%)	310 (29.81%)	64 (6.15%)	933 (89.71%)	104 (10.00%)	3 (0.29%)
2. โรคพยาธิใบไม้ตับมียารักษาให้หายขาดได้	478 (45.96%)	508 (48.85%)	54 (5.19%)	898 (86.35%)	137 (13.17%)	5 (0.48%)
3. โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นแล้วก็ทำงานตามปกติได้	304 (29.23%)	476 (45.77%)	260 (25.00%)	32 (3.08%)	287 (27.60%)	721 (69.33%)
4. โรคพยาธิใบไม้ตับทำให้เป็นมะเร็งได้	506 (48.65%)	371 (35.67%)	163 (15.67%)	879 (84.52%)	149 (14.33%)	12 (1.15%)
5. นักเรียนคิดว่ามีโอกาสเป็นพยาธิใบไม้ตับเพราะว่ากินปลาสุกๆ ดิบๆ	639 (61.44%)	247 (23.75%)	154 (14.81%)	906 (87.12%)	126 (12.12%)	8 (0.77%)
6. บ้านนักเรียนอยู่ใกล้แหล่งน้ำมีพยาธิจึงมีโอกาสเป็นพยาธิใบไม้ตับ	374 (35.96%)	505 (48.56%)	161 (15.48%)	861 (82.79%)	158 (15.19%)	21 (2.02%)
7. นักเรียนมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิใบไม้ตับเพราะไม่ถ่ายอุจจาระลงในส้วม	463 (44.52%)	345 (33.17%)	232 (22.31%)	832 (80.00%)	173 (16.63%)	35 (3.37%)
8. นักเรียนมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับเพราะไม่ใส่รองเท้า	559 (53.75%)	334 (32.12%)	147 (14.13%)	896 (86.15%)	131 (12.60%)	13 (1.25%)
9. ถ้านักเรียนไม่รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ นักเรียนก็ไม่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ	620 (59.62%)	284 (27.31%)	136 (13.08%)	900 (86.54%)	134 (12.88%)	6 (0.58%)
10. ถ้านักเรียนสวมใส่รองเท้าเสมอก็ป้องกันพยาธิ	683 (65.67%)	292 (28.08%)	65 (6.25%)	969 (93.17%)	69 (6.63%)	2 (0.19%)

ได้						
11. ถ้านักเรียนออกจากระเบียงห้องสี่มุมเสมอจะสามารถป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับได้	655 (62.98%)	310 (29.81%)	75 (7.21%)	934 (89.81%)	98 (9.42%)	8 (0.77%)
12. นักเรียนต้องรับประทานอาหารดิบๆ สุกๆ เพราะพ่อแม่หรือผู้ปกครองทำให้รับประทาน	220 (21.15%)	298 (28.65%)	522 (50.19%)	23 (2.21%)	179 (17.21%)	838 (80.58%)
13. นักเรียนไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันพยาธิใบไม้ตับ	401 (38.56%)	402 (38.65%)	237 (22.79%)	32 (3.08%)	303 (29.13%)	705 (67.79%)
14. นักเรียนไม่มีผิวหนังใช้	115 (11.06%)	244 (23.46%)	681 (65.48%)	11 (1.06%)	87 (8.37%)	942 (90.58%)
15. นักเรียนไม่มีรองเท้าใช้ตลอดเวลาที่เดินไปมาในที่ต่างๆ	217 (20.87%)	159 (15.29%)	664 (63.85%)	12 (1.15%)	141 (13.56%)	887 (85.29%)

ตารางที่ 3 จำนวน และร้อยละของข้อมูลด้านการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ

ข้อความ	ก่อนดำเนินการ				หลังดำเนินการ			
	บ่อยมาก	บ่อย	นานๆครั้ง	ไม่เคยเลย	บ่อยมาก	บ่อย	นานๆครั้ง	ไม่เคยเลย
1. นักเรียนกินก้อยปลาดิบๆ เช่น ก้อยปลาขาว ก้อยปลาขาว บ่อยเพียงใด	66 (6.35)	73 (7.02)	303 (29.13)	598 (57.50)	1 (0.10)	35 (3.37)	242 (23.27)	762 (73.27)
2. นักเรียนกินพวกปลาขาว โดยไม่ทำให้สุกบ่อยเพียงใด	64 (6.15)	125 (12.02)	273 (26.25)	578 (55.58)	9 (0.87)	41 (3.94)	232 (22.31)	758 (72.88)
3. นักเรียนกินหมี่ปลา โดยไม่ทำให้สุกบ่อยเพียงใด	63 (6.06)	121 (11.63)	309 (29.71)	547 (52.60)	4 (0.38)	59 (5.67)	232 (22.31)	745 (71.63)



4. นักเรียนเคยกินปลา จ๋อมที่ทำจากปลาฉวี โดยไม่ทำให้สุนัขบ่อบ เพียงใด	57 (5.48)	99 (9.52)	245 (23.56)	639 (61.44)	5 (0.48)	37 (3.56)	206 (19.81)	792 (76.15)
5. นักเรียนเคยถ่าย อุจจาระลงในส้วมที่ถูก สุขลักษณะบ่อบเพียงใด	679 (65.29)	167 (16.06)	116 (11.15)	78 (7.50)	804 (77.31)	175 (16.83)	48 (4.62)	13 (1.25)
6. นักเรียนเคยชุดหลุม ถ่ายอุจจาระฝังดิน กรณี ที่ไม่ได้ถ่ายอุจจาระลง ส้วม	141 (13.56)	248 (23.85)	287 (27.60)	364 (35.00)	382 (36.73)	436 (41.92)	160 (15.38)	62 (5.96)
7. นักเรียนเคยถ่าย เรื้อราตามพื้นดิน ตาม ทุ่งนา ตามสวนบ่อบ เพียงใด	88 (8.496)	75 (7.21)	159 (15.29)	718 (69.04)	12 (1.15)	44 (4.23)	157 (15.10)	827 (79.52)

