


ภาคผนวก ข


ลักษณะยางพาราแผ่นแห้งที่ผลิตด้วยกรดฟอร์มิก
กรดอะซีติก และน้ำส้มควันไม้




ภาพที่ ข.1 อัตราส่วนกรดฟอร์มิก : น้ำยาง : น้ำ เท่ากับ 195 : 3000 : 2000




ภาพที่ ข.2 อัตราส่วนกรดฟอร์มิก : น้ำยาง : น้ำ เท่ากับ 390 : 3000 : 2000




ภาพที่ ข.3 อัตราส่วนกรดฟอร์มิก : น้ำยาง : น้ำ เท่ากับ 585 : 3000 : 2000



ภาพที่ ข.4 อัตราส่วนกรดอะซีติก : น้ำยาง : น้ำ เท่ากับ 195 : 3000 : 2000




ภาพที่ ข.5 อัตราส่วนกรดอะซีติก : น้ำยาง : น้ำ เท่ากับ 390 : 3000 : 2000



ภาพที่ ข.6 อัตราส่วนกรดอะซีติก : น้ำยาง : น้ำ เท่ากับ 585 : 3000 : 2000



ภาพที่ ข.7 อัตราส่วนน้ำส้มควั่นไม้ : น้ำยาง : น้ำ เท่ากับ 195 : 3000 : 2000



ภาพที่ ข.8 อัตราส่วนน้ำส้มควั่นไม้ : น้ำยาง : น้ำ เท่ากับ 390 : 3000 : 2000



ภาพที่ ข.9 อัตราส่วนน้ำส้มควั่นไม้ : น้ำยาง : น้ำ เท่ากับ 585 : 3000 : 2000