

รหัสโครงการ SUT3-302-56-12-31



รายงานการวิจัย

โครงการผลของการให้น้ำแบบประหยัด และการให้ปุ๋ยในระบบ
น้ำต่อผลผลิต และคุณภาพขององุ่น ระยะที่ 2

Effect of Micro-Irrigation and Fertigation on Yield
and Quality of Grapevine Phase 2

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการแต่เพียงผู้เดียว



รายงานการวิจัย

โครงการผลของการให้น้ำแบบประหยัด และการให้ปุ๋ยในระบบน้ำ
ต่อผลผลิต และคุณภาพขององุ่น ระยะที่ 2
Effect of Micro-Irrigation and Fertigation on Yield
and Quality of Grapevine Phase 2

คณะผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุตชล วุ่นประเสริฐ

ผู้ร่วมวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญัฐธิญา เปือนสัณเฑียร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ 2556

ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการแต่เพียงผู้เดียว

กันยายน 2558

บทคัดย่อ

องุ่นเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญ ได้รับความนิยมนปลูกในประเทศไทยเพราะผลองุ่นมีคุณค่าทางโภชนาการ และสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้หลายชนิด เป็นพืชที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิต และมีมูลค่าของผลผลิตสูง ส่งผลให้มีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันยังขาดคำแนะนำถึงเทคโนโลยีการปลูกที่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย โดยเฉพาะการจัดการน้ำและปุ๋ยที่ถูกต้อง องุ่นเหมือนกับพืชชนิดอื่น ที่ต้องการธาตุอาหารที่จำเป็นทั้ง 16 ชนิดในสัดส่วนที่เหมาะสม หากได้รับธาตุอาหารไม่สมดุลจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และผลผลิต อาหารขาดธาตุอาหารสามารถวินิจฉัยได้โดยการวิเคราะห์เนื้อเยื่อพืชด้วยวิธีเคมี ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบความผิดปกติของธาตุอาหารในพืช ปัจจุบันได้มีการนำเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอน (XRF) มาใช้ในการตรวจหาธาตุบางชนิดในวัสดุต่าง ๆ เทคนิคนี้สามารถใช้กับตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก และวิเคราะห์ได้เร็วกว่าวิธีเคมี ดังนั้นเทคนิคนี้อาจนำมาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยระดับธาตุอาหารในพืชได้ หากผลการวิเคราะห์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับวิธีเคมี การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลของการให้น้ำ และการจัดการธาตุอาหารพืชในระบบน้ำหยดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพขององุ่นพันธุ์มาร์รู ซีดเลส 2) ศึกษาปริมาณ และการกระจายตัวของธาตุอาหารพืชในใบองุ่น และ 3) ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอนสำหรับการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในใบองุ่น โดยได้ทำการทดลอง 2 การทดลองประกอบด้วย การทดลองที่ 1 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยด ต่อการเจริญเติบโตขององุ่น วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จำนวน 7 ทรีตเมนต์ 3 ซ้ำ ประกอบด้วย T1) ขุดควบคุม (ให้น้ำทางผิวดิน และไม่ให้ปุ๋ย) T2) ให้น้ำทางผิวดิน และให้ปุ๋ยทางดิน สูตร 12-24-12, T3) ให้น้ำหยด และให้ปุ๋ยทางดิน สูตร 12-24-12, T4) ให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยด สูตร 12-24-12, T5) ให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยด สูตร 10.2-4.2-17.9 T6) ให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยด สูตร 10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง และ T7) ให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยด สูตร 10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง+ธาตุอาหารเสริม ทุกทรีตเมนต์ ยกเว้นในชุดควบคุมให้ปุ๋ยธาตุอาหารหลักปริมาณเท่ากันคือ 83 กรัม/ต้น

ผลการทดลองพบว่า การให้ปุ๋ยทุกทรีตเมนต์มีการเจริญเติบโตมากกว่าการไม่ให้ปุ๋ย และการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยดมีแนวโน้มการเจริญเติบโตขององุ่นดีกว่าการให้ปุ๋ยทางดิน ส่วนการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยด สูตร 10.2-4.2-17.9 (T5) มีแนวโน้มส่งเสริมให้องุ่นมีการเจริญเติบโตทางด้านความยาวกิ่ง จำนวนใบ เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบกลางสูงที่สุด ส่วนของผลผลิตให้ผลไปในทิศทางเดียวกับการเจริญเติบโต แต่มีความแตกต่างระหว่างทรีตเมนต์ที่ชัดเจนกว่า โดยการไม่ให้ปุ๋ยมีผลผลิตต่ำที่สุด การให้ปุ๋ยสูตร 10.2-4.2-17.9 ได้ผลผลิตสูงกว่าสูตร 12-24-12 และการให้ธาตุอาหารที่ครบทุกธาตุ (T7) ได้ผลผลิตสูงที่สุด แต่การให้ปุ๋ยในทุกทรีตเมนต์ไม่มีผลต่อความแน่นเนื้อขององุ่น สำหรับปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ (TSS) ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (TA) และ TSS/TA พบว่าการให้ปุ๋ยในทุกวิธีมีแนวโน้มทำให้มีปริมาณ TSS และ TSS/TA สูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ย และวิธีการไม่ใส่ปุ๋ยมีปริมาณ TA สูงที่สุด ส่วนการทดลองที่ 2 เป็นการวินิจฉัยการสะสมฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียม ในใบองุ่น โดยเทคนิค XRF และวิธีทางเคมี โดยนำตัวอย่างใบ

จากการทดลองที่ 1 มาวิเคราะห์ ธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียมด้วยวิธีการทั้งสอง ผลการทดลองพบว่าจากการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบด้วยวิธีเคมี ทุกพรีตเมนต์มีการสะสมธาตุฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอยู่ในความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นองุ่น แต่ธาตุแคลเซียมส่วนใหญ่มีปริมาณต่ำกว่าระดับที่เหมาะสมยกเว้นใน T6 และ T7 ซึ่งมีการใส่ธาตุแคลเซียมร่วมด้วยจะมีธาตุแคลเซียมในใบที่พอเพียง ส่วนการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชด้วยวิธีเคมี กับวิธี XRF พบว่าทั้งสองวิธีการให้ผลไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสหสัมพันธ์ (R^2) ระหว่างวิธีการวิเคราะห์ ธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และธาตุแคลเซียม ที่ 0.764, 0.774 และ 0.898 ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นวิธี XRF อาจนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และตรวจวินิจฉัยสถานะของธาตุอาหารในใบองุ่นได้

คำสำคัญ : องุ่น, ธาตุอาหารพืช, การให้ปุ๋ยทางระบบน้ำ, การเรืองรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอน

Abstract

Grapevine is one of the important fruit crops in Thailand because of grape berries have high nutritional values and can be processed into several products. It also has high yield potential and good product prices which lead to the expansion of its growing areas. However, the suitable technologies for grape production under hot and humid conditions in Thailand are still limited, especially on nutrient and water management. Grape requires 16 essential mineral nutrients in suitable ratios for optimum growth. Its growth and yield will be limited if it receives an imbalance of mineral nutrients. Diagnosis of nutrients status in plant tissues can be achieved by chemical analysis. Currently, the Synchrotron X-ray Fluorescence technique (XRF) is successfully adopted for analyzing mineral elements in various materials. It is a fast technique and requires small amount of sample materials. It could be applied to analyze mineral nutrients in plant tissues if its analysis results are well correlated to the standard chemical method. The objectives of this research are: 1) to study the effects of water application and plant nutrient management via drip irrigation system on grape vegetative growth, yield and quality of Marroo Seedless grape, 2) to study plant nutrient content and distribution in grape leaves and 3) to study the possibility of using the synchrotron XRF technique for plant nutrient analysis in grape leaves. There were two experiments in this research. In the first experiment, the effects of drip irrigation and fertigation on vegetative growth of grape were evaluated. Seven treatments of irrigation and fertilizer application were arranged in a Randomized Complete Block Design with 3 replications. Treatments consisted of T1) control, T2) surface irrigation+soil fertilizer application of 12-24-12 (N-P₂O₅-K₂O), T3) drip irrigation+soil fertilizer application of 12-24-12, T4) drip irrigation+fertigation of 12-24-12, T5) drip irrigation+fertigation of 10.2-4.2-17.9, T6) drip irrigation+fertigation of 10.2-4.2-17.9+ secondary nutrients, and T7) drip irrigation fertigation of 10.2-4.2-17.9+secondary and micro nutrients. Total primary nutrient fertilizer applications in all treatments except control were 83 g/plant.

The results showed that all fertilizer treatments produced greater growth than control treatment. Grape growth under fertigation was greater than those under surface soil fertilizer application. The treatments of drip irrigation+fertigation of 10.2-4.2-17.9 (N-P₂O₅-K₂O) (T5) tended to produce the highest vegetative growth. Grape yield also significantly responded to fertilizer application. Control treatment the produced lowest yield. Application of 10.2-4.2-17.9 fertilizer resulted higher yield than

the application of 12-24-12 fertilizer. The fertigation of 10.2-4.2-17.9+secondary and micro nutrients tended to produce the highest yield. Firmness was not significantly different between treatments. Total soluble solids (TSS) was higher in all fertilizer application treatments than in the control treatment. Titratable acidity (TA) was highest, while the TSS/TA ratio was lowest in the control. In the second experiment, the leaf tissues in all treatments of experiment 1 were analyzed for mineral nutrients (P, K and Ca) by chemical and the synchrotron XRF techniques. The results showed that, with the chemical analysis, P and K contents in the leaves of all treatments except control were in the sufficient range. Leaf Ca content in most treatments were in the deficient range except T6 and T7. The regression and correlation analysis showed the significant positive correlation of the nutrient analysis results (P, K and Ca) between the synchrotron XRF technique and the chemical method ($R^2 = 0.764, 0.774$ and 0.898). The results implied that the synchrotron XRF technique could be applied for nutrient analysis and the diagnosis of nutrient status in grape.

Key words: Grape, Plant nutrients, Fertigation, XRF

กิตติกรรมประกาศ

โครงการผลของการให้น้ำแบบประหยัด และการให้ปุ๋ยในระบบน้ำต่อผลผลิต และคุณภาพขององุ่น ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การดำเนินงานวิจัยนี้สำเร็จได้ด้วยดีต้องขอขอบคุณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่ทำการทดลองตลอดและ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ช่วยอำนวยความสะดวกทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จนเกิดผลสำเร็จที่ดี

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ (ภาษาไทย).....	ก
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)	ค
กิตติกรรมประกาศ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ซ
สารบัญรูป.....	ณ

บทที่

1 บทนำ

1.1 ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย	2
1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2

2 ปรัชญ์วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับงุ่น.....	3
2.2 การให้น้ำ และปุ๋ยในงุ่น.....	5
2.3 การจัดการธาตุอาหารในงุ่น.....	8
2.4 การวินิจฉัยการขาดธาตุอาหารในงุ่น	11
2.5 เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ (X-ray Fluorescence, XRF).....	13

3 วิธีดำเนินงานวิจัย

3.1 การทดลองที่ 1 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของงุ่น.....	15
3.2 การทดลองที่ 2 การวินิจฉัยการสะสม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียมใน ใบงุ่น โดยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอน กับวิธีทางเคมี ในการให้ปุ๋ย ในระบบน้ำหยดของงุ่น	19

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผล

4.1 การทดลองที่ 1 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของงุ่น.....	22
4.2 การทดลองที่ 2 การวินิจฉัยการสะสม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียมใน ใบงุ่น โดยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอน กับวิธีทางเคมีในการให้ปุ๋ยใน ระบบน้ำหยดของงุ่น.....	36

5 สรุป และข้อเสนอแนะ	44
----------------------------	----

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

เอกสารอ้างอิง	45
ภาคผนวก	50
ประวัติผู้วิจัย.....	57

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ระดับปริมาณที่เหมาะสมของคุณสมบัติ และธาตุอาหารในดินที่ใช้ปลูกองุ่น.....	8
2.2 ระดับความเข้มข้นของธาตุอาหารพืชในก้านใบองุ่น.....	9
2.3 ระดับความเข้มข้นของธาตุอาหารพืชในใบองุ่น.....	9
2.4 ปริมาณการดูดยืดธาตุอาหารพืชในผลองุ่น.....	10
3.1 ปริมาณความต้องการน้ำขององุ่นในช่วงที่ทำการทดลอง ($ET_c = ET_p \times K_c$).....	16
3.2 ความถี่การให้น้ำ และปริมาณการให้น้ำรวมขององุ่นในช่วงที่ทำการทดลอง.....	16
3.3 คุณสมบัติของดินปลูกก่อนการทดลอง และค่าที่เหมาะสมของดินสำหรับปลูกองุ่น.....	18
3.4 คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์.....	18
4.1 ผลของการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยด ต่อความยาวกิ่งขององุ่น.....	23
4.2 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อจำนวนใบขององุ่น.....	24
4.3 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นองุ่น.....	25
4.4 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบองุ่น ส่วนใบล่าง.....	26
4.5 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบองุ่น ส่วนใบกลาง.....	28
4.6 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบองุ่น ส่วนใบยอด.....	29
4.7 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อปริมาณไนโตรเจนในใบองุ่นที่ อายุ 120 วัน.....	30
4.8 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อปริมาณผลผลิต และความแน่นเนื้อ ขององุ่น.....	31
4.9 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อปริมาณ TSS ปริมาณ TA และสัดส่วน TSS/TA ของน้ำองุ่น.....	32
4.10 ผลการวิเคราะห์ปริมาณ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียมด้วยวิธีทางเคมี.....	38
4.11 ผลการวิเคราะห์ปริมาณ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียมด้วยวิธี XRF.....	40

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
3.1	การกำหนดจุดสำหรับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRF บนตัวอย่างใบองุ่น.....20
3.2	การแบ่งส่วนของใบสำหรับใช้ตรวจวัดธาตุอาหาร.....20
3.3	ส่วนพื้นที่ของใบ ที่ใช้ในการตรวจวัดธาตุอาหารด้วยวิธีเคมี และเทคนิค XRF.....21
4.1	ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อความยาวกิ่งขององุ่น.....23
4.2	ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อจำนวนใบขององุ่น.....24
4.3	ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นองุ่น.....25
4.4	ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบองุ่น ส่วนใบล่าง.....27
4.5	ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบองุ่น ส่วนใบกลาง.....28
4.6	ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบองุ่น ส่วนใบยอด.....29
4.7	สเปกตรัมของการวิเคราะห์ธาตุ P, K และ Ca ในใบองุ่นด้วยวิธี XRF.....39
4.8	ผลการวิเคราะห์เกรซัน และสหสัมพันธ์ของธาตุฟอสฟอรัสระหว่างวิธีทางเคมี และวิธี XRF.....41
4.9	ผลการวิเคราะห์เกรซัน และสหสัมพันธ์ของธาตุโพแทสเซียมระหว่างวิธีทางเคมี และวิธี XRF.....41
4.10	ผลการวิเคราะห์เกรซัน และสหสัมพันธ์ของธาตุแคลเซียมระหว่างวิธีทางเคมี และวิธี XRF.....42

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา

องุ่น เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง มีถิ่นกำเนิดในเอเชีย บริเวณที่มีสภาพอากาศอบอุ่น (10-20 องศาเซลเซียส) มีความสำคัญด้านคุณประโยชน์ทางโภชนาการ เพราะมีวิตามิน และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมารับประทานทั้งแบบผลสด น้ำองุ่นเข้มข้น แยม องุ่นอบแห้ง (ลูกเกด) ไวน์องุ่น และในปัจจุบันได้มีการศึกษาถึงประโยชน์ของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จึงถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในยารักษาโรค อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และเนื่องจากองุ่นเป็นพืชที่มีศักยภาพ สามารถให้ผลผลิตได้ในปริมาณมาก มีมูลค่าของผลผลิตสูง เมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่น ทำให้มีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกเป็นเชิงการค้า และอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยได้มีการนำองุ่นมาปลูกกันอย่างกว้างขวาง เกือบทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และผู้บริโภคที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการเพาะปลูกองุ่นของประเทศยังประสบปัญหาด้านการผลิต ทั้งปริมาณ และคุณภาพ ผลผลิตที่ตกต่ำ อันเนื่องมาจากการจัดการ ตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ตลอดจนกระบวนการควบคุมคุณภาพของผลผลิต อีกทั้งองุ่นเป็นพืชที่นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยซึ่งมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น จึงทำให้ไม่สามารถใช้วิธีการ และเทคโนโลยีการจัดการได้เหมือนกับการปลูกในประเทศที่มีสภาพอากาศอบอุ่น ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งของการปลูกองุ่นให้มีผลผลิตสูง และคุณภาพที่ดีตามต้องการ คือการจัดการดิน น้ำ และปุ๋ย ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกยังไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทำให้มีการปลูกองุ่นเหมือนกับการปลูกไม้ผลทั่วไป โดยลืมนำถึงความต้องการน้ำของพืช ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่แล้วในดิน ปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการ ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำ การสูญเสียปุ๋ยอันเนื่องมาจากการชะล้างของดิน ตลอดจนเกิดการสะสมของธาตุบางชนิดสูงมากในดิน เช่น ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ซึ่งเป็นปุ๋ยที่เกษตรกรนิยมนำมาใช้ในแปลงไม้ผล และในปัจจุบันการปลูกองุ่นมีการให้น้ำด้วยระบบน้ำหยด แต่การให้ปุ๋ยยังคงเป็นการให้ทางดินซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพต่ำ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสาเหตุบางประการ เช่น ระบบการให้น้ำยังไม่มีประสิทธิภาพ และผู้ปลูกองุ่นส่วนใหญ่ยังไม่มีข้อมูลที่แนะนำถึง วิธีการให้ปุ๋ยในระบบน้ำที่ดี โดยการให้ปุ๋ยที่ถูกต้อง จำเป็นต้องรู้ถึงความต้องการธาตุอาหารของต้นองุ่น และปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน ซึ่งจะสามารถกำหนดอัตราการให้ปุ๋ยเหมาะสมได้

องุ่นเป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารที่ครบถ้วนทั้ง ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม เพื่อใช้ในการเจริญเติบโต การพัฒนา และการให้ผลผลิตขององุ่น ซึ่งการได้รับธาตุอาหารที่ไม่สมดุล และไม่เพียงพอต่อระยะการเจริญเติบโตจะทำให้ต้นองุ่นแสดงลักษณะผิดปกติส่งผลต่อปริมาณ และคุณภาพผลผลิตที่ลดลง โดยเกษตรกรผู้ปลูกจะสามารถตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติได้ 3 วิธีการ คือ การวินิจฉัยด้วยสายตา การวิเคราะห์ดินปลูก และการวิเคราะห์เนื้อเยื่อพืช วิธีการดังกล่าว

เป็นวิธีหนึ่งของการใช้ระดับที่เพียงพอของธาตุอาหารแต่ละตัวที่องุ่นต้องการ และในปัจจุบันได้มีวิธีการที่เรียกว่า เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอน มีความสามารถในการตรวจวัดธาตุอาหารบางชนิดในใบพืชได้ จึงเป็นที่น่าสนใจว่าเทคนิคนี้จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยระดับธาตุอาหารในพืชได้ และผลการวินิจฉัยจะสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดการธาตุอาหาร การใช้ปุ๋ยของเกษตรกรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามความต้องการ และแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารในองุ่นได้

ดังนั้นในการวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาวิธีการจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และคุณภาพขององุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ปุ๋ย ประสิทธิภาพการใช้น้ำ รวมทั้งได้ข้อมูลในเรื่องการจัดการดิน น้ำ และปุ๋ย เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง ตลอดจนศึกษาวิธีการใหม่ สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณ และการกระจายตัวของธาตุอาหารในเนื้อเยื่อพืชด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอน เพื่อใช้ในการตรวจวัดธาตุอาหารในองุ่น

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาการให้น้ำ การใช้ปุ๋ยในระบบน้ำหยดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพขององุ่น
2. เพื่อศึกษาปริมาณ และการกระจายตัวของธาตุอาหารในใบองุ่น
3. เพื่อเปรียบเทียบผล และประสิทธิภาพการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบองุ่นด้วยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอนกับวิธีทางเคมี

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

1. ทำการทดลองภายในฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับต้นองุ่นรับประทานผลสดพันธุ์ มาร์รู ซีดเลส (Marroo Seedless)
2. ศึกษาวิธีการให้น้ำโดยใช้ระบบน้ำหยดบนดิน และการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยด
3. ทำการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบองุ่น ระหว่างวิธีการเรืองรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอนกับวิธีการทางเคมี

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้วิธีการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยดที่มีประสิทธิภาพ และได้อัตราการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และคุณภาพขององุ่น
2. สามารถจัดการปริมาณธาตุอาหารพืชให้เหมาะสมกับผลการวิเคราะห์ดิน และความต้องการขององุ่น
3. ได้ผลการกระจายตัวของธาตุอาหารพืชบนใบองุ่น
4. ได้ทราบความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอนวิเคราะห์ธาตุอาหารในเนื้อเยื่อพืช ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่รวดเร็ว สามารถศึกษาการกระจายตัว และการสะสมของธาตุที่สำคัญบนใบองุ่นได้

บทที่ 2

ปฐพีพันธุกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับองุ่น

องุ่น (*Vitis spp.*) เป็นไม้ผลยืนต้นที่มีเถาเลื้อย จัดอยู่ในวงศ์ Vitaceae สกุล *Vitis* มีจำนวนสปีชีส์ (species) อยู่ 60 ชนิด หรือประมาณ 10,000 สายพันธุ์ (variety) สปีชีส์ที่รู้จัก และนิยมปลูกกันมากที่สุดคือ *Vitis vinifera* L. ทั่วโลกมีอยู่มากกว่า 7,000 สายพันธุ์ องุ่นเป็นพืชที่ได้รับความนิยมตั้งแต่เมื่อ 5,000 ปี ก่อนคริสตกาล มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชีย และแพร่กระจายเข้าสู่พื้นที่ในแถบเอเชียไมเนอร์ และเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งมีสภาพอากาศอบอุ่น (10-20 องศาเซลเซียส) หรืออยู่ระหว่างละติจูดที่ 20° - 51° เหนือ และ 20° - 40° ใต้ (นันทกร บุญเกิด, 2546) องุ่นจัดเป็นไม้ผลัดใบ เพราะจะผลัดใบในฤดูใบไม้ร่วง มีการพักตัวในฤดูหนาว สามารถแตกตาข้าง และใบอ่อนได้ในฤดูใบไม้ผลิ และเจริญเติบโตจนถึงผลผลิตสุกแก่ในฤดูร้อน ส่วนการนำเข้ากิ่งพันธุ์องุ่นมาปลูกในประเทศไทย ซึ่งเป็นเขตร้อน จะทำให้ต้นองุ่นมีการเจริญเติบโตได้ตลอดทั้งปี ไม่มีระยะพักตัว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ต้นได้มีการพักตัว และเริ่มแตกตายอดได้ใหม่ (วัฒนา สวรรยาธิปิติ, 2531) นอกจากนี้ องุ่นยังเป็นพืชที่สามารถปรับตัวได้ค่อนข้างดี เพราะสามารถเติบโตได้ดีในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงถึงต่ำ (วสันต์ บุญเติม, 2547) ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าองุ่นเป็นไม้ผลยืนต้นที่มีเถาเลื้อยชนิดหนึ่ง ดังนั้นจึงเป็นพืชที่มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ทั่วไปที่แตกต่างจากไม้ผลชนิดอื่น โดยนันทกร บุญเกิด (2546) ได้อธิบายไว้ดังนี้

ราก (root) เป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินทำหน้าที่หาธาตุอาหาร และน้ำ ประกอบด้วยรากแขนง รากฝอย

ลำต้น (trunk) เป็นส่วนของเนื้อไม้มีความแข็ง มีลักษณะเป็นเถาเลื้อยอยู่เหนือพื้นดิน สามารถแตกกิ่งได้

กิ่งหลัก (cordon) เป็นกิ่งที่แตกออกมาจากลำต้น อาจจะมีหนึ่ง สอง หรือสี่กิ่ง

ตอกิ่ง (arms) เป็นกิ่งที่แตกออกมาจากลำต้น (ในระบบการจัดค้ำแบบ head training) หรือแตกมาจากกิ่งหลัก (ในระบบการจัดค้ำแบบ cordon training)

กิ่งแก่ (cane) เป็นส่วนของกิ่งแก่ที่มีข้อปล้อง และเป็นส่วนที่สามารถนำไปขยายพันธุ์โดยวิธีไม่อาศัยเพศได้

เดือย (spur) เป็นส่วนของกิ่งแก่ที่ติดอยู่บนตอกิ่ง หลังจากส่วนยอดถูกตัดออกไป

กิ่งอ่อน (shoot) เป็นกิ่งอ่อนที่แตกออกมาจากตอกิ่งที่อยู่บนเดือย

ตา (bud) เป็นส่วนที่อยู่บริเวณโคนใบ เมื่อแตกออกมาจะกลายเป็นตาข้าง ซึ่งเป็นชนิดตา รวมประกอบด้วยตาเอก (primary bud) จำนวน 1 ตา มีตำแหน่งอยู่ตรงกลางเป็นส่วนของตายอด กลุ่มดอก และมือจับ และอีก 2 ตาเป็นตารอง (secondary bud) มีตำแหน่งอยู่ที่ด้านข้างของตาเอก

มือจับ (tendrils) เป็นส่วนที่แตกออกมาจากข้อที่อยู่ตรงกันข้ามกับก้านใบ ทำหน้าที่คล้ายมือเพื่อจับ และพยุงลำต้นหรือเถาให้เกาะไปกับค้าง และเลื้อยขึ้นไปได้ มือจับอาจจะมี 2 หรือ 3 แฉก มีสีแตกต่างกันตามสายพันธุ์ขององุ่น

ใบ (leaf) มีลักษณะแบนคล้ายฝ่ามือโดยติดอยู่กับก้านใบ (petiole) มีเส้นใบ 5 เส้นที่ออกมาจากก้านใบ ขอบใบจะหยักคล้ายฟันเลื่อย และมีส่วนเว้าแบ่งออกเป็น 5 ลูป (loop) ส่วนที่อยู่ติดกับก้านใบเรียกว่ามุมใบ (sinus) ลักษณะของผิวใบมีทั้งชนิดเรียบ ขรุขระ หนา และบาง รูปร่างของใบมีลักษณะที่ต่างกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ขององุ่น ซึ่งสามารถนำใบองุ่นมาใช้ในการจำแนกสายพันธุ์ได้

ขน (hair) เห็นได้ชัดที่บริเวณใต้ใบ และปลายยอด มีหน้าที่ช่วยปกป้องใบ และยอด

พวงองุ่น (clusters) เป็นส่วนของช่อผลที่ติดอยู่กับกิ่ง ประกอบด้วยก้านช่อ (peduncle) และพัฒนาไปเป็นแกนกลางของพวงเรียกว่า ราคิส (rachis) มีส่วนของก้านผล (pedicel) ติดอยู่

ช่อดอก และดอกย่อย (inflorescence and floret) ช่อดอกจะเกิดจากกิ่งใหม่ที่เพิ่งแตกออกมา ในแต่ละกิ่งจะมีช่อดอกได้ประมาณ 1-3 ช่อ ตำแหน่งการเกิดช่อดอกจะอยู่ตรงข้ามกับใบ เหมือนกับมือเกาะ ดอกขององุ่นแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ ดอกเพศผู้ (staminate flower) ดอกสมบูรณ์เพศ (hermaphrodite flower) และดอกเพศเมีย (pistillate flower) ดอกขององุ่น จะออกบนกิ่งระหว่างตาที่ 3-6 นับจากโคนกิ่ง ลักษณะของดอกจะแตกต่างกันตามพันธุ์

ผล (fruit) ผลองุ่นเกิดขึ้นเมื่อดอกได้รับการผสมแล้ว ดอกที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์จะหยุดการเจริญเติบโตแล้วจะร่วงหล่น ผลองุ่นจะโตเร็วมากในระยะแรก ระยะหลังจะโตช้า ผลอ่อนจะมีสีเขียว ผลองุ่นเป็นผลแบบเบอร์รี่ (berry) มีรูปร่างที่ต่างกันตั้งแต่กลมถึงยาว การเจริญเติบโตของผลเป็นแบบ double sigmoid curve โดยในระยะแรกจะเจริญเติบโตเร็วมาก จนถึงผลใกล้เปลี่ยนสี ซึ่งในระยะนี้ผลจะมีสีเขียวเหมือนกันทุกพันธุ์ มีรสเปรี้ยว และเมื่อผลเริ่มสุกแก่สีผลจะเปลี่ยนไปตามพันธุ์ และมีความหวานมากขึ้น ผลขององุ่นจะประกอบด้วยเปลือก เนื้อ และเมล็ด

เมล็ด (seed) เมล็ดขององุ่นจะมีรูปร่างแบบ pyriform หรือรูปผลแพร์ บริเวณตรงกลางจะมีลักษณะเป็นร่อง ในหนึ่งผลอาจมีเมล็ดได้มากกว่าหนึ่งเมล็ด

ประวัติการปลูกองุ่นเพื่อเป็นการค้าเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีสายพันธุ์องุ่นป่าเป็นจำนวนมาก และต่อมาได้มีการแพร่กระจายเทคโนโลยีการปลูกองุ่นไปในประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก ในปัจจุบันองค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) รายงานว่าทั่วโลกมีพื้นที่ปลูกองุ่นรวม 75,866 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ปลูกองุ่นประมาณร้อยละ 71 เป็นพื้นที่ผลิตองุ่นสำหรับทำไวน์ ร้อยละ 27 เป็นพื้นที่ปลูกองุ่นรับประทานผลสด และร้อยละ 2 เป็นพื้นที่ผลิตองุ่นสำหรับทำผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น ๆ สำหรับประเทศที่มีพื้นที่ปลูกองุ่นมากที่สุดคือประเทศสเปน รองลงมาคือฝรั่งเศส และอิตาลี ในปี 2009-2010 ทั่วโลกมีปริมาณผลผลิตรวม 67.9 และ 68.3 ล้านตัน (Wikipedia, 2012)

การปลูกองุ่นในประเทศไทย

ในประเทศไทยมีการปลูกองุ่นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ที่ได้นำองุ่นสายพันธุ์ติมาจากทวีปยุโรป และเริ่มมีการปลูกกันอย่างจริงจังในสมัยรัชกาลที่ 7 แต่ยังไม่แพร่หลายมาก จนถึงในปี พ.ศ.

2493 หลวงสมานวนกิจ ได้นำองุ่นจากแคลิฟอร์เนีย เช่น พันธุ์ christmas มีผลสีแดง พันธุ์ golden muscat ซึ่งมีผลสีเหลือง มาทดลองปลูก แต่ปรากฏว่ามีรสชาติเปรี้ยว เมล็ดใหญ่ เปลือกเหนียว ไม่เหมาะสมกับการรับประทานสด จนเมื่อปี พ.ศ. 2506 ปวิณ ปุณศรี ได้นำองุ่นจากยุโรปมาปลูก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองุ่นที่ใช้ทานผลสด และสามารถให้ผลผลิตได้ดี จึงมีการส่งเสริมให้เกษตรกรในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมปลูกกันมากขึ้น (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2542) ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการปลูกองุ่นเกือบทุกภูมิภาค มีพื้นที่เพาะปลูกอยู่มากกว่า 28,000 ไร่ มีผลผลิตต่อปีประมาณ 60,960 ตัน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2548 อ้างถึงใน สุรทิน ใจดี, 2553, หน้า 1) โดยมีแหล่งปลูกที่สำคัญอยู่ในแถบ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ เชียงราย เลย นครราชสีมา และสระบุรี เป็นต้น นอกจากนี้ ถึงแม้จะมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มมากขึ้นผลผลิตที่ได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้มีการนำเข้าองุ่นสด ไวน์องุ่น และผลิตภัณฑ์แปรรูป จากต่างประเทศ โดยมีรายงานการนำเข้าในปี 2554 และปี 2555 คิดเป็นมูลค่า 2,842 และ 4,067 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนรายงานการส่งออกในปี 2554 และปี 2555 คิดเป็นมูลค่า 42.90 และ 105 ล้านบาท ตามลำดับ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) จากข้อมูลจะเห็นว่าการนำเข้าองุ่นมีมูลค่าสูงมากเมื่อเทียบกับการส่งออก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองุ่นเป็นพืชที่มีอนาคตไกลมีความสำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาด ดังนั้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองุ่นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพขององุ่นให้สูงขึ้น ลดการนำเข้า เพิ่มการส่งออก ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตองุ่นในเขตร้อนขึ้นให้มีประสิทธิภาพเหมือนกับประเทศในเขตอบอุ่นที่เป็นถิ่นกำเนิดขององุ่น และมีการเพาะปลูกกันมานาน

2.2 การจัดการน้ำ และปุ๋ยในองุ่น

ความสำเร็จของการปลูกองุ่นให้มีผลผลิต และคุณภาพสูงส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพของ พันธุ์ สภาพแวดล้อมในการปลูก และอีกส่วนขึ้นอยู่กับการจัดการของเกษตรกร โดยเฉพาะการจัดการดิน น้ำ และปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการขององุ่น น้ำเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต ทั้งในกระบวนการทางสรีรวิทยา และชีวเคมีของพืชทุกชนิด การขาดน้ำหรือได้รับน้ำเกินความต้องการอาจทำให้กระบวนการดังกล่าวไม่เป็นไปตามปกติ ซึ่งจะส่งผลต่อขนาด รสชาติ และสารประกอบของผลผลิตได้ ในงานวิจัยทางด้านการผลิตพืชได้มีการทดลอง และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้น้ำของพืช (crop evapotranspiration; ETC) ที่เป็นปริมาณน้ำที่พืชต้องการใช้จริง รวมถึงปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากแปลงปลูก ทั้งโดยกระบวนการคายน้ำของพืช และการระเหย มีหน่วยเป็นความลึกของน้ำต่อหน่วยเวลา หรือปริมาตรของน้ำต่อหน่วยเวลาต่อหน่วยพื้นที่ เช่น มิลลิเมตรต่อวัน นำมาเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (reference crop evapotranspiration; ETo) และจากนั้นจะสามารถนำข้อมูลมาหาสัมประสิทธิ์การใช้น้ำ (crop coefficient; Kc) ซึ่งหมายถึงค่าคงที่ของพืชที่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้น้ำของพืช (ETc) ที่ทำการทดลอง และสามารถตรวจวัดได้จากเครื่อง lysimeter กับผลการคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง โดยในการปลูกพืชแต่ละชนิดเกษตรกรควรรู้ถึงปริมาณน้ำที่พืชต้องการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนรูปแบบการชลประทานในแปลงปลูกพืชได้ (กรมชลประทาน, 2554) จากรายงานของ วราวุธ วุฒิวิชัย และ พีระชาติ อุดการ (2545) ได้ศึกษาปริมาตรการใช้น้ำ และ

ประสิทธิภาพการใช้น้ำขององุ่นพันธุ์ป็อบดำ (black ribier) ที่จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเมษายน 2542-พฤศจิกายน 2543 ตั้งแต่ช่วงตัดแต่งกิ่งจนถึงช่วงเก็บผลผลิต พบว่าองุ่นมีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย 2.7 มิลลิเมตรต่อวัน มีสัมประสิทธิ์การใช้น้ำในช่วงตั้งตัว เจริญเติบโตทางลำต้น ตัดแต่งกิ่ง ออกดอก ผลแก่ เก็บเกี่ยวผลผลิต มีค่าเท่ากับ 0.48 0.70 0.81 1.06 และ 1.03 ตามลำดับ จะเห็นว่ามีค่าเพิ่มขึ้นแล้วจะลดลงเมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต และมีสัมประสิทธิ์การใช้น้ำเฉลี่ยตลอดฤดูกาลเท่ากับ 0.85 ส่วนในต่างประเทศได้มีการใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อประมาณค่า และจัดทำตารางการให้น้ำตามความต้องการ และประสิทธิภาพการให้น้ำในแปลงปลูกองุ่นไวน์ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย และมีแม่นยำมากขึ้น (Isidro, Neale, Calera, Balbontin and Piqueras, 2010)

การให้น้ำในระบบน้ำหยด

ในอดีตเกษตรกรไทยไม่ได้คำนึงถึงการให้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะมีฝนตกตามฤดูกาล ไม่มีความแปรปรวนของสภาพอากาศเหมือนปัจจุบันที่เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง เกิดความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้ทรัพยากรน้ำมีอยู่จำกัด และมีความสำคัญมากต่อภาคการเกษตร ดังนั้นจึงได้มีการบริหารจัดการน้ำในแปลงปลูกพืชให้มีประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุดตามความต้องการของพืช มีรายงานว่าการควบคุมการให้น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผลิตองุ่นให้มีคุณภาพสูงได้ (Pellegrino, Lebon, Simonneau and Wery, 2005) และในการสังเกตลักษณะทางสรีระของต้นองุ่นในช่วงเวลากลางวันจะสามารถใช้เป็นตัวกำหนดการให้น้ำได้ เพราะเป็นลักษณะที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน น้ำ และบรรยากาศในขณะนั้นที่บอกถึงสภาวะการขาดน้ำขององุ่น (Opazo, Farias and Fuentes, 2010) สำหรับการปลูกพืชในปัจจุบันได้มีการแนะนำการให้น้ำด้วยระบบน้ำหยด (drip or trickle irrigation) ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นยอมรับ และนิยมใช้กันมาก เพราะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพการใช้น้ำสูง น้ำจะลงสู่ดินบริเวณเขตรากที่ละน้อยอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ความชื้นแก่ดินในรูปของกรวยตัด และรักษาความชื้นของดินให้อยู่ในระดับความชื้นชลประทาน (field capacity) ได้ตลอดเวลา (ดิเรก ทองอร่าม, วิทยา ตั้งก่อสกุล, นาวิ จิระชีวี และอิทธิสุนทร นันทกิจ, 2545) การให้น้ำในระบบน้ำหยดสามารถให้ได้ 2 วิธี คือ

1. วิธีที่ให้น้ำหยดบนผิวดิน (surface drip irrigation) เป็นการวางท่อ และหัวน้ำหยดอยู่บนผิวดินสามารถถอดเก็บอุปกรณ์หัวน้ำหยดได้เมื่อหมดอายุการใช้งาน และสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้ในพื้นที่ใหม่ได้

2. วิธีให้น้ำหยดใต้ผิวดิน (sub-surface drip irrigation) ซึ่งเป็นการฝังสายน้ำหยดให้อยู่ใต้ผิวดิน สามารถช่วยลดการสูญเสียน้ำจากการระเหยได้ดีกว่าการให้น้ำหยดบนผิวดิน และการให้น้ำหยดใต้ผิวดินมีข้อด้อยคือ เป็นการติดตั้งอุปกรณ์แบบถาวรเคลื่อนย้ายไม่ได้ (บุญลือ เอื้อวพาณิช, 2542) อาจเกิดการอุดตันของรูน้ำหยด ซึ่งจะสังเกตได้ยากเพราะอยู่ใต้ดิน ดังนั้นจึงต้องมีการล้างทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอด้วยการติดตั้งวาล์วเปิดล้างปลายท่อน้ำหยด (flushing valve) ไว้เพื่อการแก้ปัญหา (จักรกฤษณ์ มีใย, 2551)

จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ข้อดีของการให้น้ำแบบน้ำหยดมีหลายประการเช่น ประหยัดน้ำมากกว่าวิธีการให้น้ำแบบท่วมเป็นผืน (flooding) และแบบร่องคู (furrow) สามารถประหยัดต้นทุนในการบริหารจัดการคือ ลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่ให้ผลคุ้มค่าในระยะยาว การติดตั้งอุปกรณ์ไม่ยุ่งยาก

ติดตั้งครั้งเดียว และใช้งานได้ตลอดอายุ สามารถควบคุมการเปิด ปิดน้ำได้ ทำให้ประหยัดค่าแรงงาน สามารถใช้ได้กับพื้นที่ทุกชนิดเช่นในดินร่วน ดินทราย ดินเหนียว ดินเค็ม และดินต่าง การให้น้ำในระบบน้ำหยดจะไม่ละลายเกลือมาตกค้างอยู่ที่ผิวดินด้านบนสามารถใช้กับการปลูกพืชได้เกือบทุกชนิด ยกเว้นพืชที่ต้องการน้ำขัง เหมาะสำหรับพื้นที่ขาดแคลนน้ำ และต้องการใช้น้ำอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพในการใช้น้ำสูง 75-95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทำให้การสูญเสียให้น้ำน้อยที่สุด และระบบน้ำหยดสามารถจัดการให้ปุ๋ยไปพร้อมกับการให้น้ำได้ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการใส่ปุ๋ย ส่วนข้อด้อยของระบบนี้คือ การติดตั้งระบบครั้งแรกต้องลงทุนสูง เกิดปัญหาการอุดตันของหัวจ่ายน้ำ ปัญหาสัตว์ฟันแทะกัดทำลายสายน้ำหยด การติดตั้งระบบต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ และเกษตรกรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับปริมาณการใช้น้ำของพืชแต่ละชนิดที่ปลูกจึงจะสามารถคำนวณปริมาณการให้น้ำในแต่ละครั้งได้

การให้ปุ๋ยในระบบน้ำ

การให้ปุ๋ยในระบบน้ำ (fertigation) เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่เกษตรกรให้ความยอมรับกันมากขึ้นโดย ดิเรก ทองอร่าม และคณะ (2545) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการให้ปุ๋ยแก่พืชในรูปของสารละลาย ปุ๋ยที่ให้ไปพร้อมกับการให้น้ำ มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช เมื่อพืชดูดน้ำก็จะได้ธาตุอาหารด้วย สามารถลดจำนวนแรงงาน และค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ย มีการกระจายของน้ำ และธาตุอาหารในบริเวณรากพืชได้สม่ำเสมอ ลดการสูญเสียไปกับการชะล้างออกนอกเขตรากพืช ลดการสะสมปุ๋ยที่มีมากเกินไปในดิน ส่วน ยงยุทธ โอสดสภา, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และ ชวลิต ฮงประยูร (2554) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยในระบบชลประทานว่าเป็นการใส่ปุ๋ยในรูปที่ละลายน้ำง่าย ให้เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นของธาตุอาหารเหมาะสม เป็นการให้น้ำ และปุ๋ยเฉพาะบริเวณสามารถปรับสูตร และอัตราปุ๋ย ให้พืชได้รับธาตุอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละช่วงอายุของการเจริญเติบโต ดังนั้นการให้ปุ๋ยในระบบน้ำจึงมีข้อดี และข้อด้อย โดยสรุปได้ดังนี้

ข้อดี

1. พืชได้รับปุ๋ยอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอตลอดแปลงเพาะปลูก
2. สามารถปรับสูตร และความเข้มข้นของปุ๋ยได้ตามความต้องการของพืช และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น และพืชจะตอบสนองต่อการให้ปุ๋ยได้อย่างรวดเร็ว
3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้ปุ๋ยของพืชได้ร้อยละ 10-50 มากกว่าการให้ทางดิน สามารถประหยัดปุ๋ย ลดการสูญเสียเนื่องจากการตกค้างในดิน และการสูญเสียเนื่องจากการชะล้างปุ๋ยออกไปเลยเขตรากพืช
4. ลดจำนวนแรงงาน ค่าจ้างแรงงาน และเวลาในการให้ปุ๋ย
5. พืชได้น้ำ และปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอจะสามารถเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพสูงขึ้น
6. สามารถผสมปุ๋ยให้ทางระบบน้ำขึ้นใช้เอง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ยลง โดยแหล่งปุ๋ยในโตรเจนได้จาก ปุ๋ยยูเรีย เป็นแม่ปุ๋ย ปุ๋ยโพแทสเซียมได้จากโพแทสเซียมคลอไรด์ ส่วนปุ๋ยฟอสฟอรัสแบ่งให้ทางดินปีละครั้ง หรือเมื่อพืชแสดงอาการขาด

ข้อด้อย

1. ปุ๋ยที่ใช้ต้องละลายน้ำได้ทั้งหมด และต้องมีความบริสุทธิ์สูง ส่งผลให้ปุ๋ยที่ใช้มีราคาแพง

2. ปุ๋ยฟอสเฟต เช่น ซุปเปอร์ฟอสเฟต หรือแคลเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ยากจึงไม่เหมาะสมกับการให้ในระบบน้ำ
3. อาจเกิดการฟุ้งร่อนของท่อ และชิ้นส่วนของระบบน้ำ เนื่องจากสารเคมี ดังนั้นจึงควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
4. เกษตรกรต้องมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของดิน ปุ๋ย และน้ำที่ใช้ เนื่องจากปุ๋ยบางชนิดไม่สามารถผสมด้วยกันได้ มีผลต่อการตกตะกอนของปุ๋ย และเกิดการอุดตันในหัวจ่ายน้ำ (พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, 2544; มนตรี คำชู, 2553)

2.3 การจัดการธาตุอาหารในอ่งน

อ่งนที่ปลูกในประเทศไทย มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จึงมีความต้องการธาตุอาหารค่อนข้างสูง ดินที่ใช้ปลูกจึงควรมีความอุดมสมบูรณ์มากเพียงพอ โดย Paul (n.d.) ได้ให้คำแนะนำสำหรับพื้นที่ที่มีการเริ่มปลูกอ่งนไว้ว่า ดินที่ใช้ปลูกอ่งนควรมีความอุดมสมบูรณ์ และปริมาณธาตุอาหารบางชนิดที่เหมาะสมดังแสดงในตารางที่ 2.1 ดังนี้

ตารางที่ 2.1 ระดับปริมาณที่เหมาะสมของคุณสมบัติ และธาตุอาหารในดินที่ใช้ปลูกอ่งน

คุณสมบัติ	ระดับที่เหมาะสม
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	5.50-6.50
อินทรีย์วัตถุ (OM, %)	2-3
ฟอสฟอรัส (P, mgkg ⁻¹)	20-50
โพแทสเซียม (K, mgkg ⁻¹)	125-150
แมกนีเซียม (Mg, mgkg ⁻¹)	100-125
โบรอน (B, mgkg ⁻¹)	0.75-1.00
สังกะสี (Zn, mgkg ⁻¹)	4-5

ดังนั้นในการปลูกอ่งนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจึงควรมีการนำดินมาวิเคราะห์ก่อนการปลูกเพื่อหาปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่แล้ว จากนั้นจึงจะทำการปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ที่เหมาะสมสำหรับต้นอ่งนที่ปลูกใหม่ ส่วนต้นอ่งนที่ปลูกแล้วจะมีความต้องการธาตุอาหารที่สำคัญหลายชนิด โดยจะทราบความต้องการได้จากผลการวิเคราะห์หาระดับธาตุอาหารในก้านใบ และในใบอ่งน ซึ่งแสดงในตารางที่ 2.2 และตารางที่ 2.3 ดังนี้

ตารางที่ 2.2 ระดับความเข้มข้นของธาตุอาหารพืชในก้นใบองุ่น

ธาตุอาหาร	ระดับความเข้มข้นของธาตุอาหารพืช				
	ต่ำมาก	ต่ำ	เหมาะสม	สูง	สูงมาก
ไนโตรเจน (%)	0.30-0.70	0.70-0.90	0.90-1.30	1.40-2.00	>2.10
ฟอสฟอรัส (%)	0.12	0.13-0.15	0.16-0.29	0.30-0.50	>0.51
โพแทสเซียม (%)	0.50-1.00	1.10-1.40	1.50-2.50	2.60-4.50	>4.60
แคลเซียม (%)	0.50-0.80	0.80-1.10	1.20-1.80	1.90-3.00	>3.10
แมกนีเซียม (%)	0.14	0.15-0.25	0.26-0.45	0.46-0.80	>0.81
เหล็ก (mgkg^{-1})	10-20	21-30	31-50	51-200	>200
สังกะสี (mgkg^{-1})	15	16-29	30-50	51-80	>80
แมงกานีส (mgkg^{-1})	10-24	25-30	31-150	151-200	>200
ทองแดง (mgkg^{-1})	2	3-4	5-15	15-30	>31
โบรอน (mgkg^{-1})	14-19	20-25	25-30	51-100	>100

ดัดแปลงจาก นันทกร บุญเกิด, 2546

ตารางที่ 2.3 ระดับความเข้มข้นของธาตุอาหารพืชในใบองุ่น

ธาตุอาหาร	ระดับความเข้มข้นของธาตุอาหารพืช				
	ต่ำมาก	ต่ำ	เหมาะสม	สูง	สูงมาก
ไนโตรเจน (%)	<2.00	2.00-2.40	2.41-2.60	2.61-2.80	>2.80
ฟอสฟอรัส (%)	<0.15	0.15-0.20	0.21-0.24	0.25-0.26	>0.26
โพแทสเซียม (%)	<1.00	1.01-1.20	1.21-1.40	1.41-1.60	>1.60
แคลเซียม (%)	<0.20	0.20-0.25	0.25-0.35	0.35-0.37	>0.37
แมกนีเซียม (%)	<0.20	0.21-0.23	0.24-0.27	0.28-0.50	>0.50
เหล็ก (mgkg^{-1})	<50	50-100	101-250	251-300	>300
สังกะสี (mgkg^{-1})	<20	20- 30	31-150	151-400	>400
แมงกานีส mgkg^{-1})	<20	20- 30	31-200	201-500	>500
ทองแดง (mgkg^{-1})	<4	4-5	6-20	21-40	>40
โบรอน (mgkg^{-1})	<15	15-25	26-40	41-60	>60

ดัดแปลงจาก นันทกร บุญเกิด, 2546

จากตารางที่ 2.2 และ 2.3 จะเห็นว่าองุ่นมีความต้องการธาตุอาหารแต่ละชนิดในระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมแตกต่างกัน ดังนั้นในช่วงของการปลูกจึงควรมีการจัดการปุ๋ยให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นองุ่น เพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่เหมาะสม และมีปริมาณผลผลิตที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ในการปลูกองุ่นจะมีการดูดซับธาตุอาหารจากดินไปเก็บสะสมไว้ที่ลำต้น และจะมีบางส่วนที่ถูกเคลื่อนย้ายไปสะสมที่ผลองุ่น และเมื่อมีการเก็บเกี่ยวก็จะมีธาตุอาหารติดไปกับผลผลิตด้วย ดังแสดงในตารางที่ 2.4 (International Fertilizer Industry Association [IFA], 1992; Quoted in

Spectrum Analytic Inc, n.d.) ดังนั้น การเก็บเกี่ยวผลผลิตจึงเป็นการนำเอาธาตุอาหารออกไปด้วย ส่งผลให้ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินนั้นค่อย ๆ ลดลงไปด้วย

ตารางที่ 2.4 ปริมาณการดูดใช้ธาตุอาหารพืชในผลองุ่น

ผลผลิต (T/a)	ปริมาณการดูดใช้ธาตุอาหาร (Lb./acre)									
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Ca	Mg	B	Cu	Mn	Zn	Fe
1	6.8	2.8	12	11.8	1.2	0.003	0.005	0.004	0.009	0.200
11	75	31	132	130	13	0.033	0.057	0.044	0.098	0.216

ดัดแปลงจาก IFA, 1992

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า องุ่นเป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารที่ครบถ้วน ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม เพื่อการเจริญเติบโต การพัฒนา และการให้ผลผลิต ดังนั้นในการจัดการธาตุอาหารพืช จึงควรจัดการธาตุทุกตัวให้อยู่ในระดับที่สมดุล แต่การปลูกองุ่นในประเทศไทย เกษตรกรส่วนใหญ่จะรู้จักเฉพาะธาตุอาหารพืชบางชนิด เช่น ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม ทำให้เกิดการใส่ปุ๋ยที่มีเพียงธาตุทั้ง 3 ชนิดนี้เท่านั้น และในปัจจุบันพบว่า มีคำแนะนำการให้ปุ๋ยของบริษัทเอกชน บริษัทผู้ผลิตปุ๋ย และรายงานการศึกษาการใช้ปุ๋ยในองุ่นเป็นปุ๋ยสูตรคงที่ เช่น รายงานของ ยศพล ผลาผล, สุรศักดิ์ นิลนนท์, ลพ ภาณุตานนท์ และ สุเทพ ทองแพ (2545ก) ได้กล่าวไว้ว่าการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นในจังหวัดทางตะวันตกของประเทศไทย มีการใช้ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดด้วยวิธีการให้ทางดิน โดยใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ในช่วงตัดแต่งกิ่งถึงดอกบาน แบ่งใส่ 2 ครั้ง อัตราครั้งละ 125 กรัมต่อต้น สูตร 12-24-12 ในช่วงดอกบานถึงผลเปลี่ยนสี แบ่งใส่ 4 ครั้ง อัตราครั้งละ 125 กรัมต่อต้น และปุ๋ยสูตร 8-24-24 ในช่วงเปลี่ยนสีผลถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต แบ่งใส่ 2 ครั้ง อัตราครั้งละ 125 กรัมต่อต้น

จากรายงานข้างต้น พบว่ามีคำแนะนำการใช้ปุ๋ยชนิดเม็ด ให้ทางดิน โดยมีสูตร และอัตราการใช้เหมือนกันในทุกพื้นที่ ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่แล้วในดิน และปริมาณธาตุอาหารที่องุ่นต้องการ เพราะความต้องการธาตุอาหารขององุ่นจะขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินในแต่ละพื้นที่ด้วย เป็นผลให้มีการใส่ปุ๋ยที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และระยะการเจริญเติบโต เกิดการสูญเสียปุ๋ยอันเนื่องมาจากการชะล้างของดิน มีประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของพืชต่ำ และเกิดการสะสมของธาตุบางชนิดสูงมากในดิน เช่น ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เป็นต้น

จากการใส่ปุ๋ยโดยวิธีการให้ทางดินของเกษตรกรที่เป็นวิธีการแบบดั้งเดิมจะมีประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยต่ำ และส่งผลต่อคุณภาพผลผลิต จึงทำให้มีการทดลองให้ปุ๋ยในระบบน้ำในการปลูกองุ่น และมีรายงานว่า การใส่ปุ๋ยในระบบน้ำหดยมีประสิทธิภาพ และประหยัดปุ๋ยมากกว่าการให้ทางดิน โดยการให้ปุ๋ยสูตร 44-34-43 จะมีผลต่อการสะสมโพแทสเซียมที่ก้นมากที่สุด สามารถชักนำให้มีการสะสมคาร์โบไฮเดรตได้สูงในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต และได้ผลผลิตต่อต้นสูงสุด (ยศพล ผลาผล และคณะ, 2545ข) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ นพพร สุรโชติ, สุรศักดิ์ นิลนนท์, ลพ ภาณุตานนท์, สุเทพ ทองแพ และ จรัส เห็นพิทักษ์ (2546) ว่าการให้ปุ๋ยในระบบน้ำสูตร 28-23-54 และ 34-36-32 อัตรา 200 กรัมต่อต้น มีแนวโน้มทำให้ปริมาณผลผลิต ขนาดช่อ และน้ำหนักผลเพิ่มขึ้น

กว่าการใส่ปุ๋ยทางดินที่มีสูตร และอัตราปุ๋ยเดียวกัน ดังนั้นการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยดจึงเป็นอีกวิธีการที่จะทำให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น แต่ในการผลิตองุ่นเกษตรกรหรือผู้ปลูกองุ่นจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความต้องการธาตุอาหารของพืช ชนิดอัตราการใช้ คุณสมบัติของปุ๋ย และการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยด ตลอดจนวิธีการจัดการที่เหมาะสม เพื่อการผลิให้อุ่นให้ได้ปริมาณ และคุณภาพที่เพิ่มขึ้น

2.4 การวินิจฉัยการขาดธาตุอาหารในองุ่น

การวินิจฉัยอาการขาดธาตุอาหาร และความต้องการปุ๋ยของพืชสามารถทราบได้ด้วย 3 วิธีการ (Imed, n.d.) คือ

2.4.1 การวินิจฉัยอาการของพืช ด้วยการสังเกตลักษณะภายนอก

เป็นการดูอาการที่พืชแสดงออกบนส่วนต่าง ๆ ของต้น และจะสามารถเห็นลักษณะที่ผิดปกติได้ชัดเจนที่สุดจากอาการที่เกิดขึ้นบนใบ โดยธาตุอาหารแต่ละชนิดจะมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน ดังนั้นอาการผิดปกติอันเนื่องมาจากธาตุอาหารจึงมีความแตกต่างกันไปตามชนิดของธาตุแต่ละตัว ดังต่อไปนี้ (นันทกร บุญเกิด, 2546)

ไนโตรเจน (N): เป็นธาตุที่เป็นส่วนประกอบของ โปรตีน กรดอะมิโน ฮอร์โมนพืช กรดนิวคลีอิก และสารอื่น ๆ ในพืช ส่วนอาการขาดไนโตรเจนในองุ่น ยอด และก้านใบจะมีสีออกชมพู ใบมีขนาดเล็ก บาง และมีสีเหลือง องุ่นต้องการไนโตรเจนในปริมาณสูง คือ 1-2 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักต้น

ฟอสฟอรัส (P): องุ่นมีความต้องการฟอสฟอรัสไม่มาก แต่ถ้ามีปริมาณไม่เพียงพอ ใบ และยอดจะมีขนาดเล็ก เพราะมีการเจริญเติบโตได้ช้า และใบจะมีสีเขียวเข้ม แต่ถ้ามีฟอสฟอรัสอยู่ในดินสูงพืชจะเกิดอาการขาดเหล็ก และสังกะสี

โพแทสเซียม (K): องุ่นมีความต้องการโพแทสเซียมมาก และต้องการแตกต่างกันตามสายพันธุ์ อาการขาดจะเห็นว่าใบแก่มีลักษณะขอบใบไหม้ และลุกลามถึงเนื้อใบ แต่เส้นใบยังเขียวอยู่ แต่ถ้าในดินมีปริมาณโพแทสเซียมมากเกินไปพืชจะแสดงอาการขาดแมกนีเซียม

แคลเซียม (Ca): อาการขาดแคลเซียมจะเกิดในพื้นที่ปลูกที่มี pH ต่ำ และเป็นดินทราย โดยจะเห็นว่าขอบใบมีลักษณะไหม้แล้วลุกลามเข้าสู่เนื้อใบ แต่ถ้าในดินมีปริมาณมีแคลเซียมสูงจะทำให้พืชแสดงอาการขาดโพแทสเซียม และแมกนีเซียม

แมกนีเซียม (Mg): อาการขาดจะเกิดในพื้นที่ปลูกที่มี pH ต่ำ โดยจะเห็นว่าใบมีสีเหลืองระหว่างเส้นใบ หากรุนแรงจะมีอาการใบไหม้

กำมะถัน (S): ส่วนใหญ่องุ่นไม่ค่อยแสดงอาการขาด แต่ถ้าขาดใบจะมีสีเหลืองเหมือนกับอาการขาดธาตุไนโตรเจน

เหล็ก (Fe): จะเกิดอาการขาดในดินที่เป็นด่างหรือมี pH สูงกว่า 7.2 โดยใบอ่อนจะมีสีเหลืองตรงพื้นที่ระหว่างเส้นใบ หากมีอาการรุนแรงใบอ่อนจะเหลือง และหลุดร่วงลง

สังกะสี (Zn): องุ่นที่ขาดสังกะสี ใบจะมีขนาดเล็ก จมูกใบกว้าง ใบเบี้ยวไม่เท่ากัน ขอบใบหยักคล้ายใบเลื่อย ใบมีสีเหลืองไม่สม่ำเสมอตรงพื้นที่ระหว่างเส้นใบ ถ้าเกิดการขาดในช่วงติดผลจะทำให้ผลมีขนาดไม่เท่ากัน

แมงกานีส (Mn): จะเกิดอาการขาดในดินที่เป็นดินต่าง ใบล่างจะมีสีซีด ขนาดใบเล็ก มีจุดประสีเหลืองระหว่างเส้นใบ

ทองแดง (Cu): อาการขาดจะทำให้รากง่อนอ่อนแอ ใบจะแคบเล็ก ขอบปล้องสั้นลง

โบรอน (B): ทุ่งที่มีการขาดโบรอนจะแสดงอาการที่รุนแรง พบมากในดินที่เป็นกรดจัด มีอาการกลายเป็นโรคที่มือจับในส่วนยอด ระหว่างข้อเกิดเป็นปมูนสีเขียว ใบมีสีน้ำตาล บริเวณระหว่างเส้นใบ ช่อดอกแห้ง แต่ถ้าหากมีโบรอนมากเกินไป ขอบใบจะไหม้ ใบไม่หยัก ปลายใบม้วนลง

โมลิบดีนัม (Mo): ปกติจะไม่แสดงอาการขาด

การสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดจากการขาดธาตุ ผู้สังเกตจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ และมีความแม่นยำในการบ่งชี้ว่าลักษณะที่เห็นเป็นอาการขาดธาตุอาหารชนิดใด เพราะการขาดธาตุหลายชนิดแสดงอาการคล้ายกัน หรือมีการแสดงอาการขาดธาตุหลายตัวร่วมกันด้วย ดังนั้นถ้าหากการวินิจฉัยด้วยสายตาไม่มีความแม่นยำจะส่งผลต่อการจัดการธาตุอาหารพืชที่ผิดพลาด และไม่สามารถแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารในพืชได้

2.4.2 การวิเคราะห์ดิน

เป็นวิธีการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ พืชสามารถนำมาใช้ได้ง่าย ส่วนใหญ่แล้วจะมีวิธีการวิเคราะห์โดยการใช้สารเคมีสกัดธาตุให้ออกมาอยู่ในรูปของสารละลายแล้วคำนวณเป็นความเข้มข้นของธาตุอาหารต่อน้ำหนักดิน ซึ่งเป็นวิธีการยืนยันระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนการปลูกพืช และเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุง และบำรุงดินให้มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชแต่ละชนิด แต่การวิเคราะห์ดินมีข้อจำกัดบางประการที่ทำให้เกษตรกรไม่นิยมนำดินมาวิเคราะห์คือ ต้องส่งตัวอย่างดินให้ผู้เชี่ยวชาญในการทำวิเคราะห์ เกษตรกรไม่สามารถทำเองได้ ต้องมีการเตรียมตัวอย่าง มีการเตรียมสารเคมีหลายชนิด บางชนิดมีความอันตรายต่อผู้ใช้สูง และขั้นตอนการวิเคราะห์มีความยุ่งยาก ต้องใช้จำนวนตัวอย่างปริมาณมาก ใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน หากมีตัวอย่างจำนวนมากจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ในครั้งเดียวกัน เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี มีราคาแพง และไม่สามารถแปรผลที่ได้จากการวิเคราะห์ดินได้

2.4.3 การวิเคราะห์เนื้อเยื่อ

การวิเคราะห์เนื้อเยื่อพืช เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ทราบถึงปริมาณความเข้มข้นของธาตุอาหารพืชได้ และเป็นวิธีการดั้งเดิมที่นิยมนำมาใช้ประเมินความต้องการธาตุอาหารของต้นพืชได้ การวิเคราะห์พืชด้วยวิธีทางเคมีเป็นการวัดปริมาณธาตุอาหารแต่ละธาตุที่มีทั้งหมดหรือบางส่วนที่สกัดได้จากเนื้อเยื่อพืช ณ ระยะเวลาหนึ่งของการเจริญเติบโตหรือเมื่อต้องการทดสอบ เพื่อประเมินระดับความเพียงพอของธาตุต่อการเจริญเติบโตของพืช (Grapevine nutrition, 2006 and Bunch Grape Nutrition Management, 2012) โดยแนวคิดของการวิเคราะห์มีอยู่ว่า พืชที่ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงย่อมดูดธาตุอาหารแต่ละธาตุได้มาก ทำให้ความเข้มข้นของธาตุดังกล่าวในเนื้อเยื่อพืชสูงถึงระดับที่เหมาะสม ทำให้พืชเจริญเติบโตดี มีผลผลิตสูง และในทางตรงกันข้ามพืชที่ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ รูปที่เป็นประโยชน์ของบางธาตุบางธาตุมีอยู่น้อย พืชย่อมดูดธาตุอาหารนั้นได้น้อย ทำให้ความเข้มข้นของธาตุดังกล่าวในเนื้อเยื่อพืชต่ำกว่าระดับที่เหมาะสม เป็นเหตุให้พืชมีการเจริญ และพัฒนาน้อย การวิเคราะห์พืชด้วยวิธีทางเคมีมีข้อดีในหลายด้าน เช่น ได้ข้อมูลเป็นปริมาณธาตุอาหารที่

แน่นอน แม่นยำ ใช้ตรวจวินิจฉัย (diagnosis) ความขาดแคลน ความเป็นพิษ และความไม่สมดุลของธาตุอาหารในพืช ใช้วัดปริมาณธาตุอาหารแต่ละธาตุที่พืชดูดไปใช้ และถูกนำออกไปจากดิน เป็นวิธีหนึ่งของการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน ใช้ประเมินประสิทธิภาพการใส่ปุ๋ย และใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลผลิตพืช (ยงยุทธ โอสดสภา, 2555) ส่วนข้อจำกัดของการวิเคราะห์ เช่น ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการเท่านั้น เกษตรกรไม่สามารถทำได้ ต้องมีการเตรียมตัวอย่าง มีการเตรียมสารเคมีหลายชนิด บางชนิดมีความอันตรายต่อผู้ใช้สูง และขั้นตอนการวิเคราะห์มีความยุ่งยาก ต้องใช้จำนวนตัวอย่างปริมาณมาก ใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน หากมีตัวอย่างจำนวนมากจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ในครั้งเดียวกัน เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี มีราคาแพง เป็นต้น

การศึกษาปริมาณ และความเข้มข้นของธาตุอาหารในพืชส่วนใหญ่ได้ใช้ส่วนของใบเป็นตัวแทนของชิ้นส่วนพืช แต่ในองุ่นสามารถใช้ส่วนของก้านใบ (petiole) เป็นตัวแทน เพราะมีรายงานการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบเปรียบเทียบกับก้านใบว่ามีความแตกต่างกัน คือในก้านใบจะมีความเข้มข้นของธาตุอาหารสูงกว่าในใบ ซึ่งแสดงได้ว่าก้านใบเป็นบริเวณที่มีการสะสมธาตุอาหาร (นันทกร บุญเกิด, อดิสรณ์ สุขธำรง และ เรณู ขำเลิศ, 2544) การวิเคราะห์ก้านใบเป็นสิ่งที่ใช้ในการประเมินปริมาณธาตุอาหารเฉพาะในองุ่นเท่านั้น สามารถทำได้ในทุกอายุการเติบโต เพื่อใช้กำหนดการใส่ปุ๋ยให้เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการของต้นองุ่น และสามารถใช้นิพจน์ความผิดปกติที่แสดงอาการออกมาได้โดยเปรียบเทียบกับลักษณะองุ่นที่มีความปกติ โดยระดับความเข้มข้นของธาตุอาหารที่เหมาะสมในก้านใบ และในใบองุ่นแสดงในตารางที่ 2.2 และ 2.3

2.5 เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ (X-ray Fluorescence, XRF)

เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุภายในตัวอย่าง การเรืองรังสีเอกซ์เกิดจากการที่อิเล็กตรอนชั้นนอกเข้าไปแทนที่อิเล็กตรอนชั้นในที่หลุดออกไป การหลุดออกไปของอิเล็กตรอนชั้นในเกิดจากการที่อะตอมถูกกระตุ้นด้วยพลังงานชนิดต่าง ๆ เช่น อนุภาคพลังงานสูง รังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ ซึ่งพลังงานดังกล่าวจะต้องมีค่ามากกว่าพลังงานยึดเหนี่ยว (binding energy) ของอิเล็กตรอนในชั้นนั้น ๆ เมื่ออิเล็กตรอนหลุดออกจากชั้นพลังงานนั้น ทำให้เกิดเป็นที่ว่าง อิเล็กตรอนในชั้นพลังงานที่สูงกว่าก็จะตกลงมาแทนที่ และคายพลังงานออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ พลังงานที่อะตอมคายออกมาจะมีค่าเท่ากับความแตกต่างของชั้นพลังงานของอิเล็กตรอนเดิมกับชั้นพลังงานที่อิเล็กตรอนเข้าไปแทนที่ เนื่องจากอะตอมชนิดต่าง ๆ ก็จะมีการจัดเรียงตัวของชั้นพลังงานแตกต่างกัน ทำให้ค่าพลังงานมีความแตกต่างกันตามชนิดของอะตอม ถ้าสามารถตรวจจับพลังงานที่คายออกมาจากอะตอมได้ก็สามารถบ่งบอกชนิดของอะตอมที่อยู่ในตัวอย่างได้เช่นกัน

เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ที่ได้จากแสงซินโครตรอน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้จากเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนขนาด 1.2 GeV ซึ่งให้แสงซินโครตรอนที่มีความเข้มแสงมากกว่าเครื่อง XRF ที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการทั่วไปกว่า 10,000 เท่า และมีพลังงานต่อเนื่องตั้งแต่รังสีอินฟราเรดจนถึงรังสีเอกซ์ จึงสามารถโฟกัสขนาดลำแสงเอกซ์เรย์ให้มีขนาดเล็กในระดับ 100 ไมโครเมตร (micro-XRF) โดยยังมีค่าความเข้มแสงที่นำไปใช้ได้ แสงที่มีขนาดเล็กทำให้สามารถทำการศึกษาการกระจายตัวของธาตุบนตัวอย่างได้ แสงยังมีขนาดเล็กก็จะยังให้ความละเอียดของภาพการกระจายตัวได้ละเอียดเท่านั้น ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบของแสงซินโครตรอนต่อเครื่องกำเนิดรังสี

เอกซ์ท้าวไป นอกจากนั้นแล้วเทคนิคนี้ยังเป็นเทคนิคที่ไม่ทำลายตัวอย่าง (non-destructive method) และมีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างที่ไม่ยุ่งยาก สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้เกือบทุกรูปแบบ (โลหะ ผง เซรามิกซ์ ยาง พลาสติก ของเหลว น้ำมัน ของหนืด หรือตัวอย่างมีชีวิต เช่น ชิ้นส่วนพืช เป็นต้น) อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้ยังมีข้อจำกัดบางประการ คือ ไม่สามารถวิเคราะห์ธาตุที่มีเลขอะตอมต่ำ เช่น ไฮโดรเจน คาร์บอน ออกซิเจน หรือไนโตรเจนได้

สำหรับเทคนิค micro-XRF ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยามได้เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 โดยใช้แสงซินโครตรอนในย่านรังสีเอกซ์จากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน โดยมีขนาดลำรังสีเอกซ์ที่ประมาณ 100 ไมโครเมตร ใช้หัววัดแบบ Si-PIN ซึ่งมี energy resolution ที่ 160 eV ที่พลังงานของแมงกานีส K_{α} (Tancharakorn et al., 2012) และจากการสืบค้นข้อมูลพบว่าได้มีตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ เช่น การศึกษาคุณสมบัติของแร่ และการบดแร่ เพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของแร่เฟลด์สปาร์ และสามารถตรวจพบ ซิลิกา โทเทเนียมไดออกไซด์ อะลูมินา เพอริกออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ โซเดียมออกไซด์ และโปแทสเซียมออกไซด์ (เบญจพล ถาคำ, 2551) การศึกษาธาตุหลัก และธาตุอาหารเสริมในดินที่พัฒนามาจากหินบะซอลต์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ด้วยเครื่อง XRF และพบการกระจายตัวของธาตุ อะลูมิเนียม ซิลิคอน และ เหล็ก (ศุภิมา ธนะจิตต์, อัญชลี สุทธิประการ, เอิบ เขียวรัตน์ และ Gilkes, 2549) ส่วนการวิจัยในตัวอย่างสิ่งมีชีวิต เช่น ใบพืชซึ่งได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ซินโครตรอน XRF เพื่อตรวจสอบการกระจายตัวของแร่ธาตุในส่วนต่าง ๆ ของผักโขมในโรงเรือนกระจก โดยใช้ใบ ลำต้น และรากสด มากำหนดจุดในระยะห่างทุก 0.5 เซนติเมตร เพื่อนำไปวัดความหนาแน่นของธาตุ จากการตรวจวัดพบว่าความเข้มข้นของธาตุในรากมีสูงกว่าในใบ และลำต้น ปริมาณธาตุบริเวณโคนรากมีมากที่สุดแล้วลดลงจนถึงปลายราก ในลำต้นปริมาณของโพแทสเซียม แคลเซียม เหล็ก นิกเกิล และสังกะสีจะมีมากบริเวณโคนต้น และในใบส่วนใหญ่จะมีการสะสมธาตุอยู่มากบริเวณรอบเส้นกลางใบ และส่วนกลางใบ (Xin et al., 2009) ในปีค.ศ. 2001 มีการทดลองใช้เทคนิค XRF ตรวจสอบธาตุที่เป็นโลหะหนักในท่อลำเลียงของพืชที่ขึ้นอยู่ในอ่างเก็บน้ำ เปรียบเทียบกับการใช้เครื่อง atomic absorption spectroscopy (AAS) ที่เป็นวิธีการดั้งเดิม พบว่าผลการวิเคราะห์ทองแดง และโคบอลต์ด้วย XRF มีความสอดคล้องกับ AAS แต่จะแตกต่างกันสำหรับผลการวิเคราะห์ธาตุสังกะสี และนิกเกิล (Kipriyanova, Dvurechenskaya, Sokolovskaya, Trunova and Anoshin, 2001)

จากงานวิจัยข้างต้นจะเห็นว่า เริ่มมีการใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอนเพื่อศึกษาปริมาณธาตุในส่วนประกอบของพืช จึงมีแนวโน้มว่าน่าจะนำมาใช้ในการตรวจวัดปริมาณ การกระจายตัว และการสะสมของธาตุอาหารพืชบางชนิดในเนื้อเยื่อพืชได้

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 การทดลองที่ 1 ผลของการให้น้ำ และปุ๋ยในระบบน้ำหยดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพขององุ่น

ทำการทดลองปลูกต้นองุ่น ในกระถางพลาสติก ด้วยกิ่งตอนติดตาองุ่นพันธุ์ มาร์รู ซีดเลส ในโรงเรือนแบบเปิด ภายใต้หลังคาพลาสติกใส ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1. แผนการทดลอง

วางแผนการทดลอง แบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (Randomized Complete Block Design, RCBD) จำนวน 7 ทรีตเมนต์ 3 ซ้ำ ดังต่อไปนี้

- T1. ควบคุมให้น้ำทางผิวดิน และไม่ให้ปุ๋ย
- T2. ให้น้ำทางผิวดิน และให้ปุ๋ยทางดิน สูตร 12-24-12
- T3. ให้น้ำด้วยระบบน้ำหยด และให้ปุ๋ยทางดิน สูตร 12-24-12
- T4. การให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยด สูตร 12-24-12
- T5. การให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยด สูตร 10.2-4.2-17.9
- T6. การให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยด สูตร 10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง
- T7. การให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยด สูตร 10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง+ธาตุอาหารเสริม

*** หมายเหตุ

- ทรีตเมนต์ที่ 1-2 ให้น้ำทุก 3 วัน โดยการให้แต่ละครั้งจะให้จนกระทั่งมีน้ำไหลออกจากกันกระถางจึงหยุดให้
- ทรีตเมนต์ที่ 3-7 ควบคุมการให้น้ำ ตามความต้องการน้ำของพืช $ET_c = ET_p \times K_c$
- ทรีตเมนต์ที่ 2 และ 3 เป็นการให้ปุ๋ยตามสูตรของเกษตรกร 12-24-12 (ยศพล ผลาผล และคณะ, 2545ก) อัตรา 83 กรัม/ต้น แบ่งใส่ทั้งหมด 4 ครั้ง (ทุก 30 วัน)
- ทรีตเมนต์ที่ 4 เป็นการให้ปุ๋ยตามสูตรของเกษตรกร 12-24-12 ในระบบน้ำหยด อัตรา 83 กรัม/ต้น แบ่งใส่ทั้งหมด 8 ครั้ง (ทุก 15 วัน)
- ทรีตเมนต์ที่ 5, 6 และ 7 สูตรปุ๋ยตามค่า total nutrient uptake 10.2-4.2-17.9 (IFA, 1992) ในระบบน้ำหยด อัตรา 83 กรัม/ต้น แบ่งใส่ทั้งหมด 8 ครั้ง (ทุก 15 วัน)
- ทรีตเมนต์ที่ 6 ใส่ธาตุอาหารรองที่ประกอบด้วย $CaNO_3$ 22 กรัม/ต้น $MgSO_4$ 7.5 กรัม/ต้น โดยใส่พร้อมธาตุอาหารหลัก แบ่งใส่ทั้งหมด 8 ครั้ง (ทุก 15 วัน)
- ทรีตเมนต์ที่ 7 ใส่ปุ๋ยเหมือนทรีตเมนต์ที่ 6 และใส่ปุ๋ยรวมธาตุอาหารเสริมที่ประกอบด้วย Fe 1.90%, Mn 1.94%, Cu 2.08%, Zn 1.90%, B 2.17% และ Mo 0.024% จำนวน 0.16 กรัมต่อต้น ผสมน้ำ 100 มิลลิลิตร ฉีดพ่นทั้งหมด 8 ครั้ง (ทุก 15 วัน)

2. วิธีการทดลอง

2.1 ผสมวัสดุปลูก โดยใช้ดิน ขุยมะพร้าว และปุ๋ยอินทรีย์ อัตราส่วน 3:1:1 ผสมให้เข้ากัน แล้วแบ่งใส่กระถางพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 นิ้ว จำนวน 35 กิโลกรัม/กระถาง

2.2 ทำการวางระบบน้ำหยด โดยใช้ท่อ PE (polyethylene) ขนาด 16 มิลลิเมตร ใช้หัวน้ำหยด อัตราการไหล 2 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 2 หัวต่อกระถาง และทำการให้น้ำตามแผนการให้น้ำในอุ้ง (ตารางที่ 3.1 และ 3.2)

2.3 ทำการปลูกอุ้ง โดยใช้กิ่งตอนพันธุ์ 1617 ติดต่อด้วยพันธุ์ มารู ซีดเลส 1 ต้นต่อกระถาง และเริ่มให้ปุ๋ยตามวิธีที่ 3.1 เมื่ออายุ 15 วันหลังปลูก

ตารางที่ 3.1 ปริมาณความต้องการน้ำของอุ้งในช่วงที่ทำการทดลอง ($ET_c = ET_p \times K_c$)

ข้อมูล	เดือน				
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์
ET _p	4.1	4.05	3.62	3.86	4.96
K _c	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
ET _c (มม./วัน)	3.49	3.44	3.08	3.28	4.22
ความถี่การให้น้ำ (วัน)	3	3	3	3	3
เวลาการให้น้ำ (นาท./ครั้ง)	20	19	17	18	24

ตารางที่ 3.2 ความถี่การให้น้ำ และปริมาณการให้น้ำรวมของอุ้งในช่วงที่ทำการทดลอง

ข้อมูล	เดือน					รวม
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	
ความถี่การให้น้ำ (ครั้ง)	10	10	11	10	9	50
ทางผิวดิน (ลิตร/ต้น)	20	20	20	20	22.5	102.5
ระบบน้ำหยด (ลิตร/ต้น)	13.4	12.6	12.54	12	14.4	64.94

3. การเก็บข้อมูล

3.1. วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินปลูกอุ้งก่อนการทดลองโดยทำการวิเคราะห์เนื้อดิน ด้วยวิธีการสัมผัส (Thien, 1979) วิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์วัตถุด้วยวิธี Welkley and Black (Black, 1965) วิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินโดยใช้ดินต่อน้ำ อัตราส่วน 1:1 แล้ววัดด้วยเครื่อง pH meter วิเคราะห์ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (EC) โดยใช้ดินต่อน้ำ อัตราส่วน 1:5 วัดด้วยเครื่อง Electrical Conductivity Meter วิเคราะห์ฟอสฟอรัส ด้วยวิธี Bray II (Bray and Kurtz, 1945) วิเคราะห์ exchangeable K, Ca, Na และ Mg โดยสกัดด้วยสาร NH_4OAc 1.0 M แล้ววัดด้วยเครื่อง atomic absorption spectrophotometer; AAS (Jones, 2001) วิเคราะห์ Fe และ Mn สกัดด้วย สาร DTPA แล้ววัดด้วยเครื่อง AAS (Lindsay and Norvell, 1978) ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน ปลูกก่อนการทดลองแสดงในตารางที่ 3.3

3.2 วัดการเจริญเติบโตของต้นองุ่นก่อนการให้ปุ๋ย และหลังการให้ปุ๋ยทุก 30 วัน (รวม 120 วัน)

1. วัดปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบยอด ใบกลาง และใบล่าง โดยการแบ่งส่วนของใบออกเป็น 3 ส่วน (แสดงในรูปที่ 1) ด้วยเครื่องวัดคลอโรฟิลล์ Konica Minolta รุ่น SPAD 502 plus
2. วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นของกิ่งที่ติดตาด้วยองุ่นพันธุ์ มารู ซีดเลส โดยวัดที่ความสูง 20 เซนติเมตรจากระดับผิวดิน ด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
3. วัดความยาวของกิ่ง จากโคนถึงปลายกิ่ง
4. นับจำนวนใบจากโคนต้นจนถึงใบยอดที่แผ่ขยายเต็มที่
5. วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในใบ หลังการทดลอง ด้วยวิธี Kjeldahl วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนด้วยวิธี Steam Distillation (Bremner, 1996)

3.3 วัดปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต (เนื่องจากต้นองุ่นที่ทำการทดลองยังมีขนาดลำต้นเล็ก จึงทำการไว้ช่อองุ่น 1 ช่อต่อต้นเท่านั้น และทำการเก็บข้อมูลผลผลิต และคุณภาพขององุ่นที่ระยะสุกแก่ หรือที่อายุ 120 วัน หลังจากตัดแต่งกิ่ง) โดยมีการเก็บข้อมูลดังนี้

1. น้ำหนักของผลผลิต (กรัม)
2. วัดความแน่นเนื้อ ด้วยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส TA-XT2i หัววัดแบบ needle (P/2N) สุ่มวัดช่อละ 5 ผล
3. วัดปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ (total soluble solids; TSS) ด้วยเครื่อง hand refractometer มีหน่วยเป็น °Brix
4. วัดปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ (titratable acidity; TA) โดยใช้น้ำคั้นองุ่นปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใช้ 1% phenolphthalein เป็นอินดิเคเตอร์ จำนวน 2-3 หยด แล้วนำมาไตเตรทกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 0.1 N แล้วหาปริมาณ TA ตามสูตรคำนวณดังต่อไปนี้

$$TA (\%) = \frac{(N \text{ NaOH}) (ml \text{ NaOH}) (meq.wt.tartaric acid) \times 100}{\text{ปริมาณน้ำคั้นที่ใช้}}$$

	โดยที่	N NaOH	=	normality ของ NaOH
		ml NaOH	=	ปริมาณของ NaOH ที่ใช้ในไตเตรท
		meq.wt.tartaric acid	=	0.075

5. สัดส่วนของน้ำตาลต่อกรด (TSS/TA)

ตารางที่ 3.3 คุณสมบัติของดินปลูกก่อนการทดลอง และค่าที่เหมาะสมของดินสำหรับปลูกองุ่น

คุณสมบัติของดิน	ค่าวิเคราะห์	การแปลผล	ค่าที่เหมาะสม (Paul, n.d.)
เนื้อดิน	ทราย	-	-
ค่าการนำไฟฟ้า (ds/m)	0.14	ไม่เค็ม	-
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	6.5	กรดปานกลาง	5.5 - 6.5
อินทรีย์วัตถุ (OM, %)	0.16	ต่ำมาก	2 - 3 %
ฟอสฟอรัส (P, mgkg ⁻¹)	24.5	ปานกลาง	20 - 50
โพแทสเซียม (K, mgkg ⁻¹)	35.3	ต่ำมาก	125 - 150
แคลเซียม (Ca, mgkg ⁻¹)	49.6	ต่ำมาก	-
โซเดียม (Na, mgkg ⁻¹)	9.0	ต่ำมาก	-
แมกนีเซียม (Mg, mgkg ⁻¹)	47.5	ต่ำ	100 - 125
เหล็ก (Fe, mgkg ⁻¹)	1.4	ต่ำ	-
แมงกานีส (Mn, mgkg ⁻¹)	32.8	สูง	-

ตารางที่ 3.4 คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์

คุณสมบัติ	ค่าวิเคราะห์
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	7.84
ไนโตรเจน (N, %)	2.78
ฟอสฟอรัส (P, %)	7.65
โพแทสเซียม (K, %)	0.78
แคลเซียม (Ca, %)	2.65
แมกนีเซียม (Mg, %)	0.29
เหล็ก (Fe, mgkg ⁻¹)	43.80
แมงกานีส (Mn, mgkg ⁻¹)	9.73
สังกะสี (Zn, mgkg ⁻¹)	2.80
ทองแดง (Cu, mgkg ⁻¹)	0.62

4. การวิเคราะห์ผลการทดลอง

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS for Windows V.14 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปริมาณคลอโรฟิลล์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น ความยาวของกิ่ง จำนวนใบ ปริมาณไนโตรเจนในใบ น้ำหนักของผลผลิต ความแน่นเนื้อ TSS TA และ TSS/TA ด้วยวิธี Duncan 'New Multiple Range Test (DMRT)

3.2 การทดลองที่ 2 การวิเคราะห์การสะสม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียม ในใบองุ่น โดยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอน กับวิธีทางเคมี

1. แผนการทดลอง

เป็นการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบพืช ระหว่างวิธีการทางด้านฟิสิกส์ กับวิธีการทางด้านเคมี โดยใช้ตัวอย่างใบองุ่นจากการทดลองที่ 1 ซึ่งวางแผนการทดลอง แบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (Randomized Complete Block Design, RCBD) จำนวน 7 ทรีตเมนต์ 3 ซ้ำ ดังต่อไปนี้


- T1. ชุดควบคุม ให้น้ำเต็มที่ทางผิวดิน และไม่ให้น้ำปุ๋ย
- T2. ให้น้ำเต็มที่ทางผิวดิน และให้น้ำปุ๋ยทางดิน สูตร 12-24-12
- T3. ให้น้ำด้วยระบบน้ำหยด และให้น้ำปุ๋ยทางดิน สูตร 12-24-12
- T4. การให้น้ำปุ๋ยในระบบน้ำหยด สูตร 12-24-12
- T5. การให้น้ำปุ๋ยในระบบน้ำหยด สูตร 10.2-4.2-17.9
- T6. การให้น้ำปุ๋ยในระบบน้ำหยด สูตร 10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง
- T7. การให้น้ำปุ๋ยในระบบน้ำหยด สูตร 10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง+ธาตุอาหารเสริม

2. วิธีการทดลอง

2.1 เก็บใบองุ่นที่อายุ 30 วันหลังการให้น้ำปุ๋ย ทำการเก็บใบในช่วงเช้ามืดก่อนเวลา 9.00 นาฬิกา เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่พืชมีการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารในใบน้อยที่สุด แล้วเก็บรวบรวมใส่ถุงกระดาษ โดยเก็บใบทั้ง 3 ส่วนแยกใส่คนละถุง ประกอบด้วย ใบยอด ใบกลาง และใบล่าง (รูปที่ 1) และแบ่งตัวอย่างใบองุ่นที่รวบรวมได้ออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน

2.2 ตัวอย่างใบองุ่นส่วนที่ 1 นำมาแยกใบ และก้านใบออกจากกัน ล้างสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับใบด้วยน้ำปราศจากไอออน (deionized water) จากนั้นตากใบองุ่นที่อุณหภูมิห้องจนกว่าน้ำที่ติดอยู่ที่ใบแห้งลง แล้วนำไปอบในตู้อบ (hot air oven) ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำใบองุ่นแต่ละใบที่แห้งแล้วมาตัดออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยเนื้อใบด้านข้างของเส้นกลางใบ และเนื้อใบส่วนบนของใบ (รูปที่ 2) บดในแต่ส่วนให้ละเอียดด้วยโกร่งบดยา แล้วนำมาวิเคราะห์การกระจายตัวของ P, K และ Ca ด้วยวิธีเคมี

2.3 นำใบองุ่นที่ได้จากข้อ 2.1 เป็นตัวอย่างใบองุ่นส่วนที่ 2 ใช้ใบองุ่นสดสำหรับวิเคราะห์ P, K และ Ca ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอน (XRF) โดยแยกใบ และก้านใบออกจากกัน แล้วล้างสิ่งปนเปื้อนด้วยน้ำปราศจากไอออน (deionized water) และใช้กระดาษทิชชูชุบน้ำที่ติดบนใบองุ่นให้แห้ง จากนั้นติดตัวอย่างใบองุ่นที่ใช้วิเคราะห์บนแผ่นเตรียมตัวอย่าง (sample holder) แล้วนำไปยิงด้วยรังสีเอกซ์จากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน โดยทำการทดลองบนตำแหน่งเนื้อใบด้านข้างของเส้นกลางใบ และเนื้อใบส่วนบนของใบ (รูปที่ 2) เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ด้วยวิธีเคมี กำหนดจุดในการวิเคราะห์แต่ละส่วนบนตัวอย่างจำนวน 7 แถว ๆ ละ 7 จุด รวม 49 จุด มีระยะห่างระหว่างจุด 0.5 มิลลิเมตร ใช้เวลาวิเคราะห์สะสม 30 วินาทีต่อจุด รวมระยะเวลาในการวิเคราะห์ต่อหนึ่งตัวอย่างเท่ากับ 24 นาที 5 วินาที ดังแสดงในรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 การกำหนดจุดสำหรับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRF บนตัวอย่างใบองุ่น

3. วิธีการวิเคราะห์ธาตุอาหาร

3.1 วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบองุ่นด้วยวิธีทางเคมี โดยทำการย่อยด้วยกรด $\text{HNO}_3 + \text{HClO}_4$ อัตราส่วน 5:3 วิเคราะห์ปริมาณ P ด้วยวิธี Vanadomolybdate (Hesse, 1971) และวิเคราะห์ปริมาณ K และ Ca ด้วยเครื่อง AAS (Jones, 2001)




ใบยอด

ใบกลาง

ใบล่าง

รูปที่ 3.2 การแบ่งส่วนของใบสำหรับใช้ตรวจวัดธาตุอาหาร



รูปที่ 3.3 ส่วนพื้นที่ของใบ ที่ใช้ในการตรวจวัดธาตุอาหารด้วยวิธีเคมี และเทคนิค XRF

3.2 วิเคราะห์การกระจายตัวของ P, K และ Ca ในใบองุ่นด้วยเทคนิค XRF ในสถานีทดลอง BL6b: micro-XRF ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) แปลผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม pyMCA (Sole, 2007)

4. การวิเคราะห์ผลการทดลอง

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS for Window V.14 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปริมาณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียม ด้วยวิธี Duncan 'New Multiple Range Test (DMRT)

ทำการวิเคราะห์รีเกรชัน (regression) และสหสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างวิธีทางเคมี กับเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอน

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผล

4.1 การทดลองที่ 1 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพขององุ่น

4.1.1 ความยาวกิ่งขององุ่น

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติความยาวของกิ่งองุ่นที่อายุ 0, 30, 60, 90 และ 120 วัน ภายหลังการให้ปุ๋ย (ตารางที่ 4.1 และรูปที่ 4.1) พบว่าที่อายุ 0, 30 และ 60 วัน ทุกทรีตเมนต์ที่มีการใส่ปุ๋ยมีความยาวของกิ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่การให้ปุ๋ยมีความยาวกิ่งมากกว่า เมื่อทำการเปรียบเทียบกับทรีตเมนต์ที่ 1 คือการไม่ใส่ปุ๋ย ส่วนที่อายุ 90 และ 120 วัน พบว่าแต่ละทรีตเมนต์มีความยาวกิ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยที่อายุ 90 วัน การให้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 ทางผิวดินร่วมกับการให้น้ำหยด และการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำสูตรเดียวกัน มีความยาวของกิ่งมากที่สุด (150 เซนติเมตร) และในทรีตเมนต์ที่ไม่ใส่ปุ๋ยมีความยาวกิ่งน้อยที่สุดคือ 109 เซนติเมตร ส่วนที่อายุ 120 วัน ภายหลังการให้ปุ๋ย พบว่าการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยด สูตร 10.2-4.2-17.9 และสูตร 12-24-12 ให้ความยาวของกิ่งองุ่นมากที่สุดคือ 187 และ 186 เซนติเมตร ตามลำดับ ส่วนทรีตเมนต์ที่ไม่ใส่จะมีความยาวกิ่งน้อยที่สุดคือ 142 เซนติเมตร


4.1.2 จำนวนใบขององุ่น

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติของจำนวนใบขององุ่น (ตารางที่ 4.2 และรูปที่ 4.2) พบว่าที่อายุ 0, 30, 60 และ 90 วัน ภายหลังการให้ปุ๋ย ทุกทรีตเมนต์มีจำนวนของใบไม่แตกต่างกัน แต่ที่อายุ 90 วัน จะเห็นว่าทรีตเมนต์ที่มีการใส่ปุ๋ยมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนใบมากกว่าทรีตเมนต์ที่ไม่ใส่ปุ๋ย ส่วนที่อายุ 120 วัน พบว่า การให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยดทุกทรีตเมนต์ ให้ผลการทดลองแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเทียบกับการไม่ใส่ปุ๋ย และการให้ปุ๋ยทางดิน โดยการให้ปุ๋ยสูตร 10.2-4.2-17.9 ทางระบบน้ำหยด มีจำนวนใบมากที่สุด (50 ใบ) และทรีตเมนต์ที่ไม่ใส่ปุ๋ยมีจำนวนใบน้อยที่สุด (34 ใบ)

ตารางที่ 4.1 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อความยาวกิ่งขององุ่น

ทรีตเมนต์	ความยาวกิ่ง (เซนติเมตร)				
	0 วัน	30 วัน	60 วัน	90 วัน	120 วัน
T1, Control (ไม่ใส่ปุ๋ย)	52	56	81	109b ¹	142b
T2, Surface Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	56	76	91	131ab	155ab
T3, Drip Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	52	77	94	150a	176ab
T4, Fertigation+12-24-12	55	75	103	150a	186a
T5, Fertigation+10.2-4.2-17.9	55	76	97	147ab	187a
T6, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง	64	81	102	138ab	168ab
T7, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง +ธาตุอาหารเสริม	59	78	100	130ab	166ab
CV (%)	20.2	24.3	20.4	14.6	11.0

¹ ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT




รูปที่ 4.1 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อความยาวกิ่งขององุ่น

ตารางที่ 4.2 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อจำนวนใบขององุ่น

ทรีตเมนต์	จำนวนใบ				
	0 วัน	30 วัน	60 วัน	90 วัน	120 วัน
T1, Control ไม่ใส่ปุ๋ย	14	22	28	31	34 ^c
T2, Surface Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	15	23	29	33	36 ^c
T3, Drip Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	14	21	28	34	38 ^c
T4, Fertigation+12-24-12	16	22	29	33	43 ^b
T5, Fertigation+10.2-4.2-17.9	15	22	29	36	50 ^a
T6, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง	16	23	31	34	44 ^b
T7, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง +ธาตุอาหารเสริม	16	22	29	32	44 ^b
CV (%)	6.5	6.9	6.1	4.3	2.7

¹ ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT



รูปที่ 4.2 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อจำนวนใบขององุ่น

4.1.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นขององุ่น


ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น (ตารางที่ 4.3 และรูปที่ 4.3) พบว่าในช่วงก่อนการใส่ปุ๋ย (อายุ 0 วัน) ทุกทรีตเมนต์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่อายุ 30 และ 60 วัน โดยในทรีตเมนต์ที่ 7 คือการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยด สูตร 10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง+ธาตุอาหารเสริมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นมากที่สุด และทรีตเมนต์ที่ 1 คือการไม่ใส่ปุ๋ยมีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางลำต้นน้อยที่สุด ส่วนที่อายุ 90 และ 120 วัน จะพบว่าในทุก ทริตเมนต์ที่มีการใส่ปุ๋ย ให้ผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใส่ปุ๋ย โดยทริตเมนต์ที่ไม่ใส่ปุ๋ย มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเฉลี่ยน้อยที่สุด ส่วนการใส่ปุ๋ยทริตเมนต์ที่ 6 คือการให้ปุ๋ยในระบบ น้ำหยด สูตร 10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง ที่อายุ 90 วัน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเฉลี่ย มากที่สุด (7.16 มิลลิเมตร) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับทุกทริตเมนต์ที่มีการใส่ปุ๋ย และที่อายุ 120 วัน ทริตเมนต์ที่ 5 คือการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยด สูตร10.2-4.2-17.9 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น เฉลี่ยมากที่สุด (7.61 มิลลิเมตร) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับทุกทริตเมนต์ที่มีการใส่ปุ๋ยเช่นกัน

ตารางที่ 4.3 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นอ่อน

ทริตเมนต์	เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น (มิลลิเมตร)				
	0 วัน	30 วัน	60 วัน	90 วัน	120 วัน
T1, Control (ไม่ใส่ปุ๋ย)	3.51	3.69c ¹	3.99b	4.54b	5.81b
T2, Surface Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	3.71	3.99bc	4.41ab	6.57a	7.10a
T3, Drip Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	4.20	4.26abc	4.72ab	6.81a	7.23a
T4, Fertigation+12-24-12	4.37	5.23ab	5.48a	6.77a	7.23a
T5, Fertigation+10.2-4.2-17.9	4.68	5.12ab	5.35ab	6.67a	7.61a
T6, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง	4.48	4.83abc	5.18ab	7.16a	7.55a
T7, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง +ธาตุอาหารเสริม	4.82	5.28a	5.73a	6.97a	7.39a
CV (%)	15.5	14.0	14.3	8.2	7.1

¹ ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT



รูปที่ 4.3 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นอ่อน

4.1.4 ปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบอ่อน


ในการทดลอง ได้ทำการวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบอ่อน 3 ส่วน ประกอบด้วย ใบล่าง ใบกลาง และใบยอด ซึ่งได้ผลการทดลองดังนี้

ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบล่าง ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าในช่วงก่อนการใส่ปุ๋ย (อายุ 0 วัน) ส่วนของใบล่างมีปริมาณคลอโรฟิลล์เฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนที่อายุ 30, 60, 90 และ 120 วัน ในทุกวิธีดินที่มีมีการใส่ปุ๋ยมีขึ้นปริมาณคลอโรฟิลล์เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใส่ปุ๋ย (T1) โดยการไม่ใส่ปุ๋ยมีปริมาณคลอโรฟิลล์ต่ำที่สุด (22.7, 22.5, 22.1 และ 21.6 ตามลำดับ) นอกจากนี้จะเห็นว่าการไม่ใส่ปุ๋ยปริมาณคลอโรฟิลล์มีแนวโน้มลดต่ำลงเรื่อย ๆ ในขณะที่ทุกวิธีดินที่มีมีการใส่ปุ๋ยมีปริมาณคลอโรฟิลล์สูงกว่าวิธีดินที่ไม่ใส่ปุ๋ย ซึ่งวิธีการให้ปุ๋ย (ทางดิน และทางระบบน้ำ) กับสูตรปุ๋ยที่ให้ (12-24-12 และ 10.2-4.2-17.9) ไม่ทำให้ใบอ่อนส่วนใบล่างมีปริมาณคลอโรฟิลล์ที่แตกต่างกัน ส่วนในทุกวิธีดินที่มีมีการใส่ปุ๋ยจะมีปริมาณคลอโรฟิลล์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และอาจมีบางช่วงที่มีปริมาณลดลง ซึ่งอาจเกิดจากการปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารในใบล่างได้ แต่อย่างไรก็ตาม การใส่ปุ๋ยสามารถทำให้ใบอ่อนมีปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบล่างสูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ย โดยเฉพาะการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยด สูตร 10.2-4.2-17.9 ร่วมกับการให้ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม สามารถทำให้มีการสะสมคลอโรฟิลล์ในส่วนล่างสูงสุดที่อายุ 120 วัน เท่ากับ 39.7 (ตารางที่ 4.4 และรูปที่ 4.4)

ตารางที่ 4.4 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบอ่อนส่วนใบล่าง

วิธีดิน	ปริมาณคลอโรฟิลล์ (SPAD - unit)				
	0 วัน	30 วัน	60 วัน	90 วัน	120 วัน
T1, Control (ไม่ใส่ปุ๋ย)	26.7	22.7b ¹	22.5b	22.1e	21.6c
T2, Surface Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	24.7	29.9a	30.0a	30.9bcd	34.6b
T3, Drip Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	26.6	28.9a	26.5ab	28.9cd	34.5b
T4, Fertigation+12-24-12	25.4	29.2a	27.7ab	32.5abc	34.5b
T5, Fertigation+10.2-4.2-17.9	24.8	26.6ab	25.5ab	27.5d	33.5b
T6, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง	25.7	26.9a	30.4a	35.7a	35.1b
T7, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง +ธาตุอาหารเสริม	24.8	28.2a	29.6a	33.3ab	39.7a
CV (%)	10.0	8.2	12.5	7.1	5.0

¹ ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT




รูปที่ 4.4 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบงุ่นส่วนใบล่าง

ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบกลาง ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบงุ่นส่วนใบกลาง พบว่าที่อายุ 0 วัน และ 30 วัน ทุกทรีตเมนต์มีปริมาณคลอโรฟิลล์เฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ที่อายุ 60, 90 และ 120 วัน พบว่าการใส่ปุ๋ยในทุกทรีตเมนต์ให้ผลแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับทรีตเมนต์ที่ไม่ใส่ปุ๋ย (T1) ที่มีปริมาณคลอโรฟิลล์น้อยที่สุด (32.5, 32.5 และ 31.7 ตามลำดับ) ซึ่งผลการทดลองนี้คล้ายกับผลของปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบงุ่นส่วนใบล่าง เพราะทรีตเมนต์ที่ไม่ใส่ปุ๋ยจะมีแนวโน้มของปริมาณคลอโรฟิลล์ลดลงในทุกช่วงอายุ ในขณะที่ทุกทรีตเมนต์ที่มีการใส่ปุ๋ยมีปริมาณคลอโรฟิลล์สูงขึ้น โดยผลการทดลองระหว่างวิธีการให้ปุ๋ยทางดิน (T2-T3) กับวิธีการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำหยด (T4-T7) ไม่มีผลต่อการสะสมของปริมาณคลอโรฟิลล์เฉลี่ยที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับการใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 (T2-T4) กับสูตร 10.2-4.2-17.9 (T5-T7) ที่มีปริมาณคลอโรฟิลล์เฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ยกเว้นทรีตเมนต์ที่ 5 คือการใส่ปุ๋ยสูตร 10.2-4.2-17.9 ในระบบน้ำหยดมีปริมาณการสะสมคลอโรฟิลล์ที่อายุ 120 วันสูงสุดเท่ากับ 43.9 (ตารางที่ 4.5 และรูปที่ 4.5)

ตารางที่ 4.5 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบอ่อนส่วนใบกลาง

ทรีตเมนต์	ปริมาณคลอโรฟิลล์ (SPAD-unit)				
	0 วัน	30 วัน	60 วัน	90 วัน	120 วัน
T1, Control (ไม่ใส่ปุ๋ย)	28.6	34.5	32.5c ¹	32.5b	31.7d
T2, Surface Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	24.9	34.8	38.1ab	40.3a	41.4ab
T3, Drip Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	27.0	37.7	41.9a	41.4a	41.6ab
T4, Fertigation+12-24-12	26.1	33.8	35.4bc	38.3a	36.1cd
T5, Fertigation+10.2-4.2-17.9	25.6	33.4	37.8ab	39.6a	43.9a
T6, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง	26.3	33.0	35.7bc	39.7a	38.6bc
T7, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง +ธาตุอาหารเสริม	24.3	32.2	36.2bc	39.0a	37.6bc
CV (%)	9.9	8.0	6.7	5.4	6.4

¹ ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT



รูปที่ 4.5 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบอ่อนส่วนใบกลาง


ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบยอด ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ก่อนการใส่ปุ๋ย (อายุ 0 วัน) ทุกทรีตเมนต์ให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนที่อายุ 30, 60 และ 90 วัน พบว่าปริมาณคลอโรฟิลล์ทุกทรีตเมนต์ที่มีการใส่ปุ๋ยให้ผลการทดลองแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ การไม่ใส่ปุ๋ย โดยการไม่ใส่ปุ๋ยจะมีปริมาณคลอโรฟิลล์เฉลี่ยต่ำที่สุด (23.7, 22.7 และ 21.9 ตามลำดับ) และทุกทรีตเมนต์ที่มีการใส่ปุ๋ยมีปริมาณคลอโรฟิลล์เฉลี่ยในส่วนใบยอดไม่แตกต่างกัน แต่การให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยดสูตร 10.2-4.2-17.9 ร่วมกับการให้ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมสามารถ

ทำให้มีการสะสมปริมาณคลอโรฟิลล์ที่อายุ 60 วันได้สูงสุดเท่ากับ 31.4 สำหรับที่อายุ 120 วันพบว่าในทุก ทริตเมนต์ให้ผลแตกต่างกันทางสถิติ โดยการไม่ใส่ปุ๋ยมีปริมาณคลอโรฟิลล์เฉลี่ยต่ำที่สุด (15.9) ส่วนทริตเมนต์ที่ 3 มีปริมาณคลอโรฟิลล์สูงที่สุด (20.9) แต่ไม่แตกต่างกับทริตเมนต์ที่ 5 และ 7 ที่มีปริมาณคลอโรฟิลล์เฉลี่ยเท่ากับ 18.7 และ 19.7 ตามลำดับ (ตารางที่ 4.6 และรูปที่ 4.6)

ตารางที่ 4.6 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบงุ่นส่วนใบยอด

ทริตเมนต์	ปริมาณคลอโรฟิลล์ (SPAD - unit)				
	0 วัน	30 วัน	60 วัน	90 วัน	120 วัน
T1, Control (ไม่ใส่ปุ๋ย)	21.0	23.7b ¹	22.7b	21.9b	15.9c
T2, Surface Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	23.5	28.4a	29.8a	28.8a	17.2bc
T3, Drip Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	22.7	27.5a	29.8a	28.7a	20.9a
T4, Fertigation+12-24-12	22.9	27.3a	29.2a	28.5a	16.6bc
T5, Fertigation+10.2-4.2-17.9	22.7	30.4a	30.6a	29.6a	18.7abc
T6, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง	21.4	29.0a	31.0a	29.4a	17.2bc
T7, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง + ธาตุอาหารเสริม	22.1	28.6a	31.4a	30.3a	19.7ab
CV (%)	6.4	5.7	5.1	4.8	9.2

¹ ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT



รูปที่ 4.6 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบงุ่นส่วนใบยอด

4.1.5 ปริมาณธาตุไนโตรเจนในใบงุ่น

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติของปริมาณธาตุไนโตรเจนเฉลี่ยในใบงุ่นที่อายุ 120 วัน พบว่าในใบล่างแต่ละทรีตเมนต์ให้ผลการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ยมีปริมาณไนโตรเจนต่ำที่สุด (1.48 %) และทรีตเมนต์ 7 มีปริมาณไนโตรเจนสูงที่สุด (1.97 %) ส่วนผลการวิเคราะห์ใบกลาง และใบยอด พบว่าการให้ปุ๋ยในทุกทรีตเมนต์ให้ผลแตกต่างกันกับการไม่ใส่ปุ๋ย คือ การไม่ใส่ปุ๋ยมีปริมาณไนโตรเจนเฉลี่ยต่ำที่สุด (2.11 % และ 1.54 %) และในใบยอด การให้ปุ๋ยในทรีตเมนต์ที่ 2 และ 4 มีปริมาณไนโตรเจนเฉลี่ยสูงที่สุด (2.33 %) แต่ให้ผลไม่แตกต่างจากการให้ปุ๋ยทรีตเมนต์อื่น ๆ (ตารางที่ 4.7)

ตารางที่ 4.7 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อปริมาณไนโตรเจนในใบงุ่นที่อายุ 120 วัน

ทรีตเมนต์	ปริมาณธาตุไนโตรเจน (%)		
	ใบล่าง	ใบกลาง	ใบยอด
T1, Control (ไม่ใส่ปุ๋ย)	1.48c ¹	2.11b	1.54b
T2, Surface Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	1.67bc	2.71a	2.33a
T3, Drip Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	1.66bc	2.77a	2.20a
T4, Fertigation+12-24-12	1.89ab	2.84a	2.33a
T5, Fertigation+10.2-4.2-17.9	1.75bc	2.49a	2.24a
T6, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง	1.82ab	2.45a	2.19a
T7, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง +ธาตุอาหารเสริม	1.97a	2.66a	2.31a
CV (%)	6.8	12.7	6.4

¹ ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT

4.1.6 ปริมาณผลผลิต และความแน่นเนื้อของงุ่น

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติปริมาณผลผลิตของงุ่นอายุ 1 ปี มีการไว้ข้องุ่นเพียง 1 ข้อต่อต้น ซึ่งพบว่าให้ผลการทดลองที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างทรีตเมนต์ วิธีการไม่ใส่ปุ๋ย (T1) มีปริมาณของผลผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุด (84 กรัม) การให้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 ทางดิน และให้น้ำในระบบน้ำหยด (T3) มีปริมาณผลผลิตไม่แตกต่างกับทรีตเมนต์ที่ 2 ซึ่งเป็นการให้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 ทางดิน และให้น้ำทางผิวดิน (129 กรัม และ 125 กรัม) ส่วนการให้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 ทางระบบน้ำหยดสามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 182 กรัม ส่วนทรีตเมนต์ที่ 7 คือการให้ปุ๋ยสูตร 10.2-4.2-17.9 ทางระบบน้ำหยดรวมกับการให้ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด (211 กรัม) แต่ไม่แตกต่างกันกับทรีตเมนต์ที่ 5 (Fertigation+10.2-4.2-17.9) และทรีตเมนต์ที่ 6 (Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง) ที่มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 206 กรัม และ 205 กรัม ตามลำดับ และสำหรับผลการวิเคราะห์ทางสถิติความแน่นเนื้อของงุ่น พบว่าทุกทรีตเมนต์มีค่าความแน่นเนื้อไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.8)

ตารางที่ 4.8 ผลของการให้ปุ๋ย และน้ำในระบบน้ำหยดต่อปริมาณผลผลิต และความแน่นเนื้อขององุ่น

ทรีตเมนต์	ผลผลิต (กรัม)	ความแน่นเนื้อ (kg/cm ²)
T1, Control (ไม่ใส่ปุ๋ย)	84d ¹	0.82
T2, Surface Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	125c	0.86
T3, Drip Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	129c	0.89
T4, Fertigation+12-24-12	182b	0.84
T5, Fertigation+10.2-4.2-17.9	206a	0.82
T6, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง	205a	0.86
T7, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง +ธาตุอาหารเสริม	211a	0.86
CV (%)	5.69	9.83

¹ ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT

4.1.7 ปริมาณ TSS ปริมาณ TA และสัดส่วน TSS/TA ของน้ำองุ่น

จากผลการทดลองพบว่า ทุกทรีตเมนต์มีปริมาณ TSS เฉลี่ยแตกต่างกันทางสถิติ โดยวิธีการไม่ให้ปุ๋ย (T1) มีปริมาณ TSS ต่ำที่สุด (13.33 °Brix) และการให้ปุ๋ยในทรีตเมนต์ที่ 7 คือการให้ปุ๋ยสูตร 10.2-4.2-17.9 ทางระบบน้ำหยดรวมกับการให้ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม มีปริมาณ TSS สูงที่สุด (15.67 °Brix) ส่วนผลการวิเคราะห์ปริมาณ TA พบว่าทุกทรีตเมนต์ให้ผลแตกต่างกัน โดยวิธีการที่ไม่ให้ปุ๋ย มีปริมาณ TA เฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 0.60% เมื่อเปรียบเทียบกับทรีตเมนต์อื่น ๆ ที่มีการให้ปุ๋ย (T2-T7) ซึ่งมีปริมาณ TA เฉลี่ยต่ำกว่าการไม่ให้ปุ๋ย แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ สำหรับผลการวิเคราะห์สัดส่วน TSS/TA ของน้ำองุ่น พบว่าการให้ปุ๋ยในทุกทรีตเมนต์ให้ผลแตกต่างกันกับการไม่ใส่ปุ๋ย คือ การไม่ใส่ปุ๋ยมีปริมาณสัดส่วน TSS/TA เฉลี่ยต่ำที่สุด (22.35) และวิธีการให้ปุ๋ยในทรีตเมนต์ที่ 6 มีปริมาณสัดส่วน TSS/TA เฉลี่ยสูงที่สุด (28.20) แต่ให้ผลไม่แตกต่างจากการให้ปุ๋ยทรีตเมนต์อื่น (ตารางที่ 4.9)

ตารางที่ 4.9 ผลของการให้น้ำ และน้ำในระบบน้ำหยดต่อปริมาณ TSS ปริมาณ TA และสัดส่วน TSS/TA ของน้ำองุ่น

ทรีตเมนต์	TSS (°Brix)	TA (%)	TSS/TA
T1, Control (ไม่ให้น้ำ)	13.33c ¹	0.60a	22.35b
T2, Surface Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	15.00b	0.55b	27.22a
T3, Drip Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	15.33ab	0.56b	27.69a
T4, Fertigation+12-24-12	15.56ab	0.56b	28.06a
T5, Fertigation+10.2-4.2-17.9	15.56ab	0.55b	28.18a
T6, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง	15.33ab	0.55b	28.20a
T7, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง +ธาตุอาหารเสริม	15.67a	0.54b	29.06a
CV (%)	3.9	5.67	7.18

¹ ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT

วิจารณ์ผลการทดลอง

การทดลองนี้ได้ทำการทดลองในดินปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีการควบคุมปริมาณการให้น้ำไม่ให้สูญเสียออกสู่ภายนอกกระถาง เป็นการศึกษาผลของการให้น้ำ 2 สูตร และการให้น้ำในระบบน้ำหยด ต่อระยะการเจริญเติบโตทางด้านลำต้น (vegetative growth) และการให้ผลผลิต (reproductive growth) ของต้นองุ่น

จากการทดลองจะเห็นได้ว่าการให้น้ำทางผิวดิน และการให้น้ำหยดมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นองุ่นแตกต่างกัน โดยการให้น้ำหยดมีแนวโน้มทำให้ต้นองุ่นมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าการให้น้ำทางผิวดิน แสดงว่าการให้น้ำในระบบน้ำหยดตามปริมาณการใช้น้ำของพืช (ETp x Kc) เป็นการวางแผนการให้น้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อการนำไปใช้ของต้นองุ่น และเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละเดือน (กรมชลประทาน, 2554 และ Ministry of Agriculture, Food and Fisheries, 2001) ส่วนการให้น้ำทางผิวดินพบว่าการสิ้นเปลืองน้ำ (วันชัย คุปวานิชพงษ์, 2555) มากกว่าการให้น้ำหยด เพราะนอกจากการดูดใช้น้ำของรากองุ่นแล้ว ยังเกิดการสูญเสียจากการระเหยที่ผิวดิน น้ำบางส่วนไหลลงไปถึงกว่าระบบราก โดยในการทดลองนี้พบว่าวิธีการให้น้ำทางผิวดินมีการใช้น้ำมากประมาณ 1.5 เท่าของการให้น้ำในระบบน้ำหยด (ตารางที่ 3.2) จากรายงานของ ดิเรก ทองอร่าม และคณะ (2545) กล่าวว่า การให้น้ำแก่พืชบนผิวดินจะมีประสิทธิภาพการให้น้ำอยู่ระหว่าง 40-80 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยการจัดการ นอกจากนี้จากการสังเกตพบว่า การให้น้ำบนผิวดินยังทำให้เกิดการอัดแน่นของหน้าดินได้ง่าย ส่งผลให้ดินปลูกมีลักษณะแน่นทึบกว่าดินที่ให้น้ำหยด ซึ่งอาจมีผลต่อการแพร่กระจายของรากองุ่น ความร่วนซุย และช่องว่างภายในโครงสร้างดินได้ อีกทั้งในช่วงแรกของการให้น้ำ จะมีการรดน้ำในปริมาณมาก ในช่วงนี้ดินจะมีการดูดซับน้ำไว้สูง ซึ่งอาจส่งผลต่อการหายใจของราก เพราะรากแช่อยู่ในดินที่มีความชื้นสูงเป็นเวลานานได้

ผลการทดลองให้ปุ๋ยทางดินกับการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยด พบว่าการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยดมีแนวโน้มทำให้ต้นองุ่นมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าการให้ปุ๋ยทางดิน โดยทริตเมนต์ที่ 4 ซึ่งเป็นการให้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 ในระบบน้ำหยดมีการเจริญเติบโตดีกว่าทริตเมนต์ที่ 3 และ 2 ที่เป็นการให้ปุ๋ยสูตรเดียวกันแต่ให้ทางผิวดิน การให้ปุ๋ยทางระบบน้ำหยดสามารถส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านลำต้น โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของจำนวนใบอ่อนดีกว่าการให้น้ำ และปุ๋ยทางผิวดิน อาจเป็นเพราะปุ๋ยที่ให้อยู่ในรูปของสารละลาย เมื่อรากมีการดูดใช้น้ำก็จะได้อาตุอาหารไปพร้อมกัน พืชสามารถนำไปใช้ในการสังเคราะห์สารอาหารเพื่อการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ส่วนการให้ปุ๋ย และน้ำทางผิวดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นองุ่นน้อยกว่า อาจเป็นเพราะการให้ปุ๋ยชนิดเม็ด และมีการให้น้ำบนผิวดินไม่สามารถละลายปุ๋ยได้หมด การดูดใช้อาตุอาหารจึงเกิดได้ช้า และธาตุบางชนิด เช่น ธาตุไนโตรเจน จากปุ๋ยยูเรีย เมื่อได้รับความชื้นจากน้ำ ปุ๋ยบางส่วนอาจมีการละลายออกมาอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ และถูกดูดใช้โดยรากพืช บางส่วนอาจมีการสูญเสียที่เกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน ที่เปลี่ยนธาตุไนโตรเจนให้อยู่ในรูปของแก๊สที่สามารถระเหยขึ้นสู่บรรยากาศได้ เช่น ไนตรัสออกไซด์ (N_2O) ไนตริกออกไซด์ (NO) และไนโตรเจน (N_2) เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่ากระบวนการดีไนตริฟิเคชัน (denitrification) โดยกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นในสภาวะไร้อากาศ หรือมีปริมาณอากาศต่ำ ซึ่งในการทดลองวิธีการให้น้ำ และปุ๋ยทางผิวดินจะทำให้ดินแน่นทึบ ส่งผลให้ช่องว่างภายในดินมีน้อย และอาจทำให้อากาศที่อยู่ในช่องว่างของดินลดต่ำลงด้วย ส่วนการสูญเสียไนโตรเจนอีกแบบหนึ่ง จะเกิดจากการสลายตัวของแอมโมเนียมไอออน (NH_4^+) และยูเรีย (ยงยุทธ โอสดสภา และคณะ, 2554) สำหรับการเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยตามสูตรของเกษตรกร 12-24-12 และการใส่ปุ๋ยตามปริมาณการดูดใช้อาตุอาหารขององุ่น (total nutrients uptake) สูตร 10.2-4.2-17.9 พบว่าการใส่ปุ๋ยในทริตเมนต์ที่ 5 (สูตร 10.2-4.2-17.9 ให้ในระบบน้ำหยด) มีแนวโน้มทำให้ต้นองุ่นมีการดูดใช้อาตุอาหาร และมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าทริตเมนต์ที่ 4 (ปุ๋ยสูตร 12-24-12 ให้ในระบบน้ำหยด) และการให้ปุ๋ยตามค่า total nutrients uptake ในทริตเมนต์ที่ 5-7 สามารถส่งเสริมให้องุ่นมีจำนวนใบได้มากกว่าการให้ปุ๋ยตามสูตรของเกษตรกร (ทริตเมนต์ที่ 2-4) ซึ่งความแตกต่างของจำนวนใบที่ได้จากการให้ปุ๋ยทั้งสองสูตรมีผลต่อการสังเคราะห์แสง และการสะสมอาหารของต้นองุ่น เพราะการมีจำนวนใบมาก จะทำให้มีพื้นที่ใบที่ใช้ในการรับแสงเพื่อการสังเคราะห์แสง และเปลี่ยนเป็นสารอาหารสะสมไว้ในลำต้นได้มาก เมื่อมีการตัดแต่งกิ่งต้นองุ่นให้ผลผลิตได้ในปริมาณมาก นอกจากนี้การให้ปุ๋ยตามค่า total nutrients uptake เป็นการให้ปุ๋ยตามปริมาณธาตุอาหารที่พืชดูดใช้ และสูญเสียออกไปกับการตัดแต่งกิ่งหรือผลผลิตของพืช มีความเหมาะสมต่อระยะการเจริญเติบโตได้ดีกว่าการให้ปุ๋ยตามสูตรของเกษตรกร โดยการให้ปุ๋ยในลักษณะนี้ ยงยุทธ โอสดสภา และคณะ (2554) ได้อธิบายไว้ว่า การปลูกพืชจะมีการสูญเสียธาตุอาหารออกจากดินในปริมาณมากหรือน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับส่วนที่เก็บเกี่ยวออกไป การขาดเสียปริมาณธาตุอาหารเท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่สูญเสียออกไปจะทำให้ดินมีธาตุอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ซึ่งในการทดลองนี้ได้ทำในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดังนั้นการใส่ปุ๋ยสูตร 10.2-4.2-17.9 จึงเป็นการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตตามที่ IFA (1992) ได้ให้คำแนะนำไว้สำหรับการปลูกองุ่น (ตารางที่ 2.4) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ ดาวยศ นิลนนท์ และคณะ (2548) ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผลของสัดส่วนธาตุอาหารในระบบน้ำหยดที่ประเมินจากปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียต่อผลผลิต และคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Perlette ซึ่งพบว่ามีปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารคิดเป็นสัดส่วนของ $N-P_2O_5-K_2O$ เท่ากับ 30-12-30

กรัม/ตัน ส่วนการใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 ที่มีการเจริญเติบโตน้อยกว่านั้น เมื่อพิจารณาสัดส่วนของธาตุอาหารจะเห็นว่าธาตุฟอสฟอรัสในปริมาณสูง ซึ่งในช่วงระยะแรกของการเจริญเติบโต ต้นอ่อนอาจไม่ต้องการธาตุนี้ในปริมาณมาก โดยการได้รับฟอสฟอรัสในปริมาณสูงอาจมีผลต่อการเคลื่อนย้ายธาตุตัวอื่น ๆ ไปสู่ใบได้ เช่น เหล็ก และสังกะสี ทำให้มีการพัฒนาทางด้านลำต้นได้ช้า ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการใส่ปุ๋ยตามสูตรของเกษตรกร ต้นอ่อนสามารถนำธาตุอาหารพืชที่ได้รับไปใช้ในการเจริญเติบโตได้น้อยหรืออาจกล่าวได้อีกอย่างว่า ปริมาณธาตุอาหารที่ให้ไปยังไม่มีความสมดุลต่อความต้องการของพืช ซึ่งในระยะยาวต้นพืชอาจจะแสดงอาการขาดหรือการเป็นพิษที่เกิดจากธาตุอาหารบางตัวได้

การทดลองให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยดต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อน ในทรีตเมนต์ที่ 6 ได้เพิ่มธาตุอาหารรองที่ประกอบด้วย ปุ๋ยแคลเซียมไนเตรต ($\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$) และปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต ($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) ส่วนทรีตเมนต์ที่ 7 ได้เพิ่มธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมร่วมด้วย จากผลการทดลอง พบว่าการเพิ่มธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมไม่ทำให้ต้นอ่อนมีการเจริญแตกต่างกันหรือมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลการใส่ปุ๋ยในทรีตเมนต์ที่ 5 ที่ให้เฉพาะธาตุอาหารหลักเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นเพราะดินปลูกที่ใช้ในการทดลองนี้มีธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมอยู่แล้วในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการ ถึงแม้ว่าจะมีการเติมธาตุอาหารเหล่านี้ลงไปก็ยังไม่เห็นผลต่อการดูดใช้ของรากพืช อย่างไรก็ตามในการทดลองนี้ ทรีตเมนต์ที่ 1-5 อาจจะพบปัญหาการขาดธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ส่วนทรีตเมนต์ที่ 6 อาจจะพบปัญหาการขาดธาตุอาหารเสริมได้ ในการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อ ๆ ไป เนื่องจากการทดลองในกระถาง รากพืชมีการดูดใช้ธาตุอาหารอยู่ตลอดเวลา เป็นผลให้ปริมาณธาตุอาหารในดินปลูกลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการให้ปุ๋ยทรีตเมนต์ที่ 7 อาจเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในระยะยาวได้ดีกว่าทรีตเมนต์อื่น ๆ

การตรวจวัดปริมาณคลอโรฟิลล์เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของต้นพืช และเป็นการประเมินระดับความเพียงพอ หรือความขาดแคลนของธาตุไนโตรเจนในพืช (Turner and Jund, 1991) เนื่องจากธาตุไนโตรเจนมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต เป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักของคลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็นรงควัตถุที่เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในพืช สำหรับการทดลองนี้ทำการวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบอ่อนด้วยเครื่องคลอโรฟิลล์มิเตอร์ (SPAD-502) โดยมีหลักการทำงานของเครื่องคือ สามารถวัดแสงในช่วงความยาวคลื่นที่จำเพาะ สามารถส่องผ่านแผ่นใบพืชได้ตั้งแต่ 400-500 นาโนเมตร และ 600-700 นาโนเมตร ซึ่งเป็นช่วงแสงที่คลอโรฟิลล์ดูดซับได้ดีที่สุด ค่าที่อ่านได้จากเครื่องเป็นตัวเลข แปรผันตามความเขียวของใบ และมีความสัมพันธ์กับปริมาณคลอโรฟิลล์ มีหน่วยเป็น SPAD-unit (Loh, Grabosky and Bassuk, 2002) และค่าที่วัดได้สามารถบอกถึงปริมาณไนโตรเจนในพืชได้เพราะปริมาณไนโตรเจนในใบสัมพันธ์กับปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบด้วย (Champan and Barreto, 1997) สำหรับผลการทดลองวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบอ่อนทั้งสามส่วนพบว่า ที่ทุกอายุการเจริญเติบโต ภายหลังการใส่ปุ๋ย (อายุ 30, 60, 90 และ 120 วัน) ใบกลางมีปริมาณคลอโรฟิลล์สูงที่สุด รองลงมาคือใบล่าง และใบส่วนยอด ส่วนในทรีตเมนต์ที่ไม่ใส่ปุ๋ยมีปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบอ่อนทั้งสามส่วนน้อยกว่าทุกทรีตเมนต์ที่มีการใส่ปุ๋ย และมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ในทุกอายุการทดลอง สำหรับความแตกต่างของปริมาณคลอโรฟิลล์ที่พบในใบอ่อนทั้งสามส่วนอาจเกิดได้เนื่องจากใบอ่อนแต่ละส่วนมีอายุไม่เท่ากัน โดยใบส่วนล่างจะมีอายุมากกว่า และใบส่วนยอดจะมีอายุน้อยที่สุด ดังนั้นในช่วงที่ต้นพืชมีการเจริญเติบโตจะเกิดกระบวนการหนึ่งเรียกว่า การเคลื่อนที่ได้อินทรีย์ธาตุอาหาร (nutrients translocation) เป็นการเคลื่อนที่ของธาตุจากอวัยวะหนึ่งไปสู่อวัยวะหนึ่ง ซึ่ง

เป็นกลไกการหมุนเวียนใช้ธาตุอาหารสำหรับการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะไนโตรเจนจัดเป็นหนึ่งในธาตุที่สามารถเคลื่อนที่ได้ดี (mobile elements) มีทิศทางการเคลื่อนที่จากใบแก่ไปสู่ใบที่อ่อนกว่า และจะเกิดการเคลื่อนย้ายก่อนที่ใบแก่จะหลุดร่วง (ยงยุทธ โอสธสสา, 2552) ด้วยเหตุนี้ เมื่อทำการวัดปริมาณคลอโรฟิลล์จึงพบว่าใบอ่อนส่วนใบกลางมีปริมาณการสะสมสูงกว่าส่วนอื่น ๆ เพราะเกิดการเคลื่อนย้ายไนโตรเจนจากใบล่างมาสะสมในใบกลางมากขึ้น ซึ่งการสะสมไนโตรเจนในใบจะส่งผลต่อความเขียวของใบพืชด้วย นอกจากนี้ธาตุไนโตรเจนแล้วยังมีธาตุชนิดอื่นที่มีผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ คือ ธาตุแมกนีเซียม และธาตุเหล็กที่มีผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ในพืช โดยหน้าที่ของแมกนีเซียมเป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ มีตำแหน่งอยู่ตรงกลางโมเลกุลของคลอโรฟิลล์เอ และสามารถสังเคราะห์เป็นคลอโรฟิลล์ได้ด้วย นอกจากนี้ในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์อาจมีเอนไซม์บางชนิดที่ต้องการธาตุเหล็กมาเป็นโคแฟกเตอร์ ดังนั้นทั้งธาตุแมกนีเซียมและธาตุเหล็กจึงมีบทบาทสำคัญต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ด้วย Jifon, Syvertsen and whaley (2005) ได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความเขียวของใบ และปริมาณคลอโรฟิลล์ไว้ว่าขึ้นอยู่กับชนิดของพืช สภาพแวดล้อม ปริมาณธาตุอาหารที่ได้รับ อายุของใบ ความหนาของใบ และช่วงเวลาที่ทำารวัด

ส่วนผลการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนรวมในใบอ่อนภายหลังการทดลอง (อายุ 120 วัน) พบว่ามีผลการทดลองสอดคล้องกับปริมาณคลอโรฟิลล์ คือ ทุกทรีตเมนต์ที่มีการใส่ปุ๋ยจะมีปริมาณไนโตรเจนสูงกว่าทรีตเมนต์ที่ไม่ใส่ปุ๋ย และมีการสะสมไนโตรเจนมากที่สุดในส่วนของใบกลาง และเมื่อนำผลการทดลองมาเทียบกับระดับความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบอ่อน (ตารางที่ 2.3) พบว่าในใบล่างทุกทรีตเมนต์มีปริมาณไนโตรเจนอยู่ในระดับต่ำมาก ส่วนใบกลาง ทุกทรีตเมนต์ที่มีการใส่ปุ๋ยมีปริมาณไนโตรเจนอยู่ในระดับที่เหมาะสมถึงระดับสูง และใบยอดมีปริมาณไนโตรเจนอยู่ในระดับต่ำ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนย้ายธาตุไนโตรเจนจากใบล่างขึ้นสู่ใบกลาง ทำให้ใบกลางมีปริมาณความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจนมากกว่าส่วนอื่น และการให้ปุ๋ยทั้งสองสูตรที่มีปริมาณไนโตรเจนต่างกัน ไม่ทำให้ปริมาณความเข้มข้นของไนโตรเจนในใบอ่อนมีความแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการของอ่อน

การศึกษาลผลของการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยดต่อการให้ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตพบว่าต้นอ่อนที่ตัดแต่งให้ออกช่อดอกยังมีขนาดของลำต้นที่เล็ก และเจริญเติบโตไม่เต็มที่ เมื่อออกผลมาแล้วทำให้มีขนาดช่อผลเล็ก และมีน้ำหนักต่อช่อผลไม่มาก โดยผลการวิเคราะห์ทางสถิติปริมาณผลผลิตของอ่อนอายุ 1 ปี พบว่าวิธีการไม่ใส่ปุ๋ย (T1) มีปริมาณของผลผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่า 84 กรัม ส่วนทรีตเมนต์ที่ 7 คือการให้ปุ๋ยสูตร 10.2-4.2-17.9 ทางระบบน้ำหยดรวมกับการให้ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 211 กรัม จากผลการทดลองจะเห็นว่ามีความสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของต้นอ่อนภายใต้การให้น้ำและปุ๋ยด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งทรีตเมนต์ที่ไม่ให้ปุ๋ย แต่ให้น้ำเพียงอย่างเดียว มีปริมาณผลผลิตต่ำที่สุด อาจเกิดจากความไม่เพียงพอของปริมาณธาตุอาหารในดินปลูก และต้นพืชมีการดูดใช้ไปแล้วในช่วงการเจริญเติบโตทางด้านลำต้น ทำให้เมื่อถึงระยะสร้างดอก และช่อผล ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอต่อการนำไปสร้างผลผลิต ส่วนในทุกทรีตเมนต์ที่มีการให้ปุ๋ยมีปริมาณผลผลิตของอ่อนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 125-211 กรัม แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ในทรีตเมนต์ที่มีการให้ปุ๋ยที่เพียงพอต่อความต้องการของต้นอ่อนก็ทำให้ต้นอ่อนมีปริมาณผลผลิตที่ได้ต่ำ ซึ่งอาจเกิดจากต้นอ่อนที่ทำการทดลองมีอายุน้อยในช่วงหนึ่งปีแรก การเจริญเติบโต

และการสะสมสารอาหารในกิ่ง และลำต้น ยังไม่มากพอสำหรับการตัดแต่งต้นองุ่นให้ออกผล ซึ่งสอดคล้องกับ คำกล่าวของ จรัล เห็นพิทักษ์ (2553) ได้อธิบายว่า ปริมาณการสะสมอาหารในต้น และกิ่ง ก่อนการตัดแต่งกิ่ง มีผลต่อการออกดอกขององุ่น โดยเฉพาะสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรต และไนโตรเจน รวมทั้งช่วงเวลาในการตัด แต่งกิ่งก็มีอิทธิพลต่อการสะสม การเคลื่อนย้ายคาร์โบไฮเดรตหรือสารประกอบอื่น ๆ ภายในต้นองุ่นด้วย และ สำหรับผลการวิเคราะห์ความแน่นเนื้อขององุ่น พบว่าทุกทรีตเมนต์มีค่าความแน่นเนื้อไม่แตกต่างกันทาง สถิติ

จากผลการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ (TSS) ทุกทรีตเมนต์มีปริมาณ TSS แตกต่างกันอย่างสถิติ โดยวิธีการไม่ให้ปุ๋ย (T1) มีปริมาณ TSS ต่ำที่สุด (13.33 °Brix) และ ทุกทรีตเมนต์ที่มีการให้ปุ๋ยมีปริมาณ TSS ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นทรีตเมนต์ที่ 7 คือการให้ปุ๋ยสูตร 10.2-4.2-17.9 ทางระบบน้ำหยดรวมกับการให้ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม มีปริมาณ TSS สูง ที่สุด (15.67 °Brix) ส่วนผลการวิเคราะห์ปริมาณ TA พบว่าให้ผลการทดลองตรงข้ามกับปริมาณ TSS คือทุกทรีตเมนต์ให้ผลแตกต่างกัน โดยวิธีการที่ไม่ให้ปุ๋ย มีปริมาณ TA เฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 0.60% เมื่อเปรียบเทียบกับทรีตเมนต์อื่น ๆ ที่มีการให้ปุ๋ย (T2-T7) ซึ่งมีปริมาณ TA เฉลี่ยต่ำกว่าการไม่ให้ปุ๋ย แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ จากข้อมูลแสดงว่าทรีตเมนต์ที่มีการให้ธาตุอาหารพืช มีผลต่อการเพิ่มขึ้น ของค่าความหวาน (TSS) มากกว่าทรีตเมนต์ที่ไม่ให้ปุ๋ย ที่อายุการเก็บเกี่ยวเดียวกัน อาจเป็นเพราะ การให้ปุ๋ยที่มีสัดส่วน และปริมาณของธาตุอาหารเพียงพอต่อความต้องการของต้นองุ่นในระยะออกผล โดยเฉพาะการให้ปุ๋ยสูตร 10.2-4.2-17.9 ที่มีปริมาณธาตุโพแทสเซียมสูง มีแนวโน้มทำให้มีปริมาณ TSS เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการทดลองของ ยศพล พลาผล และคณะ (2545) ได้ให้ปุ๋ยที่มีปริมาณ โพแทสเซียมสูงในระยะองุ่นเริ่มเปลี่ยนสีผลสามารถส่งเสริมให้องุ่นมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงสุดในช่วง เก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งแสดงว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตไปเป็นน้ำตาลได้สูง และสำหรับผล การวิเคราะห์สัดส่วน TSS/TA ของน้ำองุ่น พบว่าวิธีการไม่ใส่ปุ๋ย มีปริมาณสัดส่วน TSS/TA เฉลี่ยต่ำ ที่สุด (22.35) และวิธีการให้ปุ๋ยในทรีตเมนต์ที่ 2-7 มีปริมาณสัดส่วน TSS/TA เฉลี่ยไม่แตกต่างกัน โดยมี ค่าอยู่ระหว่าง 27.22-29.06 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณ TSS และ TA เพราะทรีตเมนต์ที่ไม่ให้ปุ๋ย มี ปริมาณกรดสูงกว่าทรีตเมนต์อื่น ทำให้สัดส่วนของปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ต่อปริมาณ กรดมีค่าต่ำที่สุด

4.2 การทดลองที่ 2 การวิเคราะห์การสะสม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียม ในใบองุ่น โดยวิธีการเร่องรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอนกับวิธีทางเคมี ในการให้ ปุ๋ยในระบบน้ำหยดขององุ่น

4.2.1 การวิเคราะห์การสะสม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียม ในใบองุ่นวิธีทาง เคมี ในการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยด

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติของปริมาณธาตุ P, K และ Ca ในใบองุ่นด้วยวิธีทางเคมี พบว่า ทุกทรีตเมนต์ที่มีการให้ปุ๋ยมีผลการทดลองที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยทรีตเมนต์ที่ 1 (ไม่ ใส่ปุ๋ย) มีปริมาณ P, K และ Ca เฉลี่ยสะสมในใบน้อยที่สุด (0.196 %, 1.431 % และ 0.113 %

ตามลำดับ) ในขณะที่ธาตุ P จะมีปริมาณเฉลี่ยสูงสุดในทริตเมนต์ที่ 3 (0.525 %) สำหรับธาตุ K มีปริมาณเฉลี่ยสูงสุดในทริตเมนต์ที่ 3, 6 และ 7 (1.737 %, 1.715 % และ 1.790 % ตามลำดับ) ส่วนปริมาณการสะสมธาตุ Ca มีปริมาณเฉลี่ยในใบมากที่สุด ในทริตเมนต์ที่ 6 และ 7 (0.266 % และ 0.260)

ผลการวิเคราะห์การสะสมธาตุ P, K และ Ca ในตำแหน่งต่าง ๆ ของใบ พบว่าตำแหน่งของใบให้ผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยการสะสมธาตุ P จะมีปริมาณเฉลี่ยมากที่สุดที่ตำแหน่งใบกลาง (0.398%) รองลงมาคือตำแหน่งใบยอด (0.355%) และน้อยที่สุดคือตำแหน่งใบล่าง (0.321%) สำหรับผลการวิเคราะห์ปริมาณ K เฉลี่ยสะสมมากที่สุดที่ตำแหน่งใบกลาง (1.672%) รองลงมาคือตำแหน่งใบล่าง (1.617%) และน้อยที่สุดที่ตำแหน่งใบยอด (1.518%) และส่วนปริมาณ Ca เฉลี่ยสะสมมากที่สุดในตำแหน่งใบยอด ใบกลาง และใบล่าง ตามลำดับ (0.204%, 0.176% และ 0.132%)

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติการกระจายตัวของปริมาณธาตุอาหารในชิ้นส่วนของใบองุ่น พบว่าพื้นที่ใบส่วนข้าง และพื้นที่ใบส่วนบนมีการกระจายตัวของธาตุ P, K และ Ca ไม่แตกต่างกันทางสถิติ จากการเปรียบเทียบการสะสมปริมาณธาตุอาหารที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมี กับค่าปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมของใบองุ่น พบว่าทุกทริตเมนต์มีปริมาณ P อยู่ในระดับที่เหมาะสม ยกเว้นทริตเมนต์ที่ 1 (ไม่ใส่ปุ๋ย) ที่มีปริมาณต่ำกว่าระดับที่เหมาะสม ส่วนปริมาณธาตุ K ทุกทริตเมนต์มีการสะสมเกินค่าที่เหมาะสมของปริมาณที่กำหนด และสำหรับการสะสมของธาตุ Ca ในทุกทริตเมนต์มีการสะสมอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับที่เหมาะสม ยกเว้นทริตเมนต์ที่ 6 และ 7 มีการสะสมอยู่ในระดับที่เหมาะสม (ตารางที่ 4.10)

ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ปริมาณ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียม ด้วยวิธีทางเคมี

ทรีตเมนต์	Percentage (%)		
	P	K	Ca
T1, Control (ไม่ใส่ปุ๋ย)	0.196f ¹	1.431c	0.113c
T2, Surface Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	0.450b	1.480c	0.116c
T3, Drip Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	0.525a	1.737a	0.133c
T4, Fertigation+12-24-12	0.403c	1.572b	0.133c
T5, Fertigation+10.2-4.2-17.9	0.271e	1.493c	0.172b
T6, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง	0.350d	1.715a	0.266a
T7, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง +ธาตุอาหารเสริม	0.312d	1.790a	0.260a
ตำแหน่งของใบ			
ใบยอด	0.355b	1.518c	0.204a
ใบกลาง	0.398a	1.672a	0.176b
ใบล่าง	0.321c	1.617b	0.132c
ชิ้นส่วนใบที่ใช้วิเคราะห์			
พื้นที่ใบส่วนข้าง	0.355	1.584	0.166
พื้นที่ใบส่วนบน	0.361	1.621	0.175
CV (%)	9.3	7.1	13.6
ปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมในใบองุ่น²	0.210-0.240	1.210-1.400	0.250-0.350

¹ ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี


DMRT

² ดัดแปลงจาก นันทกร บุญเกิด, 2546

4.2.2 การวิเคราะห์การสะสม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียม ในใบองุ่นด้วยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอน ในการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยด

ผลการวิเคราะห์ปริมาณการสะสมธาตุ P, K และ Ca ในใบองุ่น ด้วยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอน (XRF) มีลักษณะเป็นเส้นสเปกตรัมของแต่ละธาตุ (รูปที่ 4.7) ค่าที่อ่านได้เป็นค่านับวัด (count) ของรังสีเอกซ์ โดยค่านี้จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) ไม่สามารถบอกเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) ได้ แต่มีค่าแปรผันตามปริมาณธาตุที่พบในตัวอย่าง และในการทดลองนี้ได้ทำการวิเคราะห์ธาตุเป็นตารางพื้นที่ (square area scan) บนใบองุ่น มีจำนวนจุดที่ใช้วิเคราะห์ทั้งหมด 49 จุด ดังนั้นที่ได้จึงเป็นผลรวมของค่าแต่ละจุด และมีค่าเป็นผลรวมค่านับวัด (net count) สำหรับผลการวิเคราะห์ทางสถิติของการทดลองนี้พบว่าในทุกทรีตเมนต์ให้ผลการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยการวิเคราะห์การสะสม P มีปริมาณเฉลี่ยน้อยที่สุดในทรีตเมนต์ที่ 1 (1,050) และมีปริมาณเฉลี่ยมากที่สุดในทรีตเมนต์ที่ 3 (1,547) ในขณะที่การวิเคราะห์การสะสมธาตุ K มีปริมาณเฉลี่ยน้อยที่สุดในทรีตเมนต์ที่ 5 (121,105) แต่ไม่แตกต่างจากทรีตเมนต์ที่ 1, 2 และ 4 ซึ่งมีค่า

เท่ากับ (123,892, 121,905 และ 124,719 ตามลำดับ) และมีปริมาณเฉลี่ยมากที่สุดในทริตเมนต์ที่ 7 (157,434) ส่วนการวิเคราะห์การสะสมธาตุ Ca มีปริมาณเฉลี่ยน้อยที่สุดในทริตเมนต์ที่ 1 คือการไม่ใส่ปุ๋ย (138,525) และมีปริมาณเฉลี่ยสูงที่สุดในทริตเมนต์ที่ 6 (182,721)



รูปที่ 4.7 สเปกตรัมของการวิเคราะห์ธาตุ P, K และ Ca ในใบองุ่นด้วยวิธี XRF

จากผลการวิเคราะห์การสะสมธาตุ P, K และ Ca บนตำแหน่งของใบ พบว่าการสะสมธาตุ P ในตำแหน่งใบกลาง และใบล่างให้ผลแตกต่างกันทางสถิติกับตำแหน่งใบยอด คือตำแหน่งใบยอดมีปริมาณการสะสมเฉลี่ยน้อยที่สุด (1,083) ส่วนตำแหน่งใบกลาง และใบล่างที่มีปริมาณการสะสมเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (1,395 และ 1,394 ตามลำดับ) สำหรับผลการวิเคราะห์ทางสถิติของปริมาณการสะสมธาตุ K พบว่าในตำแหน่งใบยอด ใบกลาง และใบล่างให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่าในตำแหน่งใบกลางจะมีการสะสมปริมาณธาตุ K เฉลี่ยมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งใบอื่นๆ และส่วนผลการวิเคราะห์ทางสถิติของปริมาณการสะสมธาตุ Ca เฉลี่ยในใบ พบว่าตำแหน่งใบยอด และใบกลางให้ผลแตกต่างกันทางสถิติกับตำแหน่งใบล่าง โดยในตำแหน่งใบล่างมีปริมาณการสะสมเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 119,329 และในตำแหน่งใบยอดมีปริมาณการสะสมเฉลี่ยมากที่สุด 174,773 ซึ่งไม่แตกต่างกันกับตำแหน่งใบล่างที่มีปริมาณการสะสมเฉลี่ยเท่ากับ 170,651 และการวิเคราะห์ทางสถิติของปริมาณการสะสมธาตุ P, K และ Ca บนชิ้นส่วนใบที่ใช้วิเคราะห์ พบว่าพื้นที่ส่วนข้าง และพื้นที่ส่วนบนให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.11)

ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ปริมาณ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียม ด้วยวิธี XRF


ทรีตเมนต์	Net count		
	P	K	Ca
T1, Control (ไม่ใส่ปุ๋ย)	1,050d ¹	123,892b	138,525c
T2, Surface Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	1,469ab	121,905b	141,651c
T3, Drip Irrigation+12-24-12 (ทางดิน)	1,547a	141,522ab	150,039bc
T4, Fertigation+12-24-12	1,363b	124,719b	148,939bc
T5, Fertigation+10.2-4.2-17.9	1,121d	121,105b	150,460bc
T6, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง	1,327bc	140,054ab	182,721a
T7, Fertigation+10.2-4.2-17.9+ธาตุอาหารรอง +ธาตุอาหารเสริม	1,159cd	157,434a	172,089ab
ตำแหน่งของใบ			
ใบยอด	1,083b	136,978	174,773a
ใบกลาง	1,395a	137,692	170,651a
ใบล่าง	1,394a	124,172	119,329b
ชั้นส่วนใบที่ใช้วิเคราะห์			
พื้นที่ใบส่วนข้าง	1,293	130,807	150,857
พื้นที่ใบส่วนบน	1,288	135,087	158,978
CV (%)	10.0	12.6	11.4

¹ ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT


4.2.3 การวิเคราะห์รีเกรชัน และสหสัมพันธ์ของปริมาณธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียม ระหว่างการวิเคราะห์ทางเคมี และวิธี XRF

การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียมในใบ องุ่น ระหว่างวิธีเคมี และวิธี XRF (รูปที่ 4.8, 4.9 และ 4.10) ได้วิเคราะห์สหสัมพันธ์ และรีเกรชัน โดยแปลงค่า net count ด้วยลอการิทึมธรรมชาติ (natural logarithm) ซึ่งเป็นลอการิทึมที่มีฐานเท่ากับ e ($e = 2.71828$) พบว่าการแปลงค่าด้วยลอการิทึมธรรมชาติจะทำให้ข้อมูลมีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงมากที่สุด และผลการวิเคราะห์ธาตุทั้งสามชนิด พบว่ามีความสัมพันธ์แบบเส้นตรง โดยผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส มีค่าสมการรีเกรชันดังแสดงในสมการที่ 1 มีลักษณะความสัมพันธ์เป็นบวก ($R^2 = 0.764$) ส่วนผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุโพแทสเซียม มีสมการรีเกรชันดังแสดงในสมการที่ 2 มีลักษณะความสัมพันธ์เป็นบวก ($R^2 = 0.774$) และสำหรับผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุแคลเซียม มีค่าสมการรีเกรชันดังแสดงในสมการที่ 3 มีลักษณะความสัมพันธ์เป็นบวก ($R^2 = 0.898$)


$$\begin{aligned} \ln \text{ net count} &= 1.556 \times P (\%) + 6.453 && \dots\dots\dots \text{สมการที่ 1} \\ \ln \text{ net count} &= 1.151 \times K (\%) + 9.937 && \dots\dots\dots \text{สมการที่ 2} \\ \ln \text{ net count} &= 20.115 \times Ca (\%) + 9.452 && \dots\dots\dots \text{สมการที่ 3} \end{aligned}$$



รูปที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์หีกรูขี้เหล็ก และสหสัมพันธ์ของธาตุฟอสฟอรัสระหว่างวิธีทางเคมี และวิธี XRF



รูปที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์หีกรูขี้เหล็ก และสหสัมพันธ์ของธาตุโพแทสเซียมระหว่างวิธีทางเคมี และวิธี XRF



รูปที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์หรีเกรซัน และสหสัมพันธ์ของธาตุแคลเซียมระหว่างวิธีทางเคมี และวิธี XRF

วิจารณ์ผลการทดลอง

ผลการทดลองให้ปุ๋ยตามสูตรของเกษตรกร และตามค่าความต้องการของพืช ทั้งวิธีการให้บนผิวดิน และให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยด เมื่อนำผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบองุ่นด้วยวิธีเคมีมาเปรียบเทียบกับระดับปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมในใบองุ่น (ตารางที่ 3) พบว่าทุกทรีตเมนต์มีการสะสมธาตุฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอยู่ในความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นองุ่น ยกเว้นธาตุแคลเซียมมีเฉพาะในทรีตเมนต์ที่ 6 และ 7 ที่มีความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบอยู่ในระดับที่เหมาะสม ความแตกต่างของระดับความเข้มข้นของธาตุอาหารในทรีตเมนต์ต่าง ๆ อาจเกิดได้จากหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูดใช้ธาตุอาหารของพืช เช่น 1) อายุพืช เพราะต้นองุ่นที่ใช้ทดลองเป็นต้นองุ่นปลูกใหม่ ระบบราก และการเกิดราก อาจยังมีไม่มากพอต่อการดูด และการสะสมธาตุอาหาร จึงมีปริมาณที่ไม่แน่นอนได้ 2) ปริมาณความเป็นประโยชน์ของปุ๋ยต่อการดูดใช้ เนื่องจากการให้ปุ๋ยทางผิวดิน และการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยด การให้ปุ๋ยทางดินจะมีความสามารถในการละลายของปุ๋ยได้น้อยกว่าส่งผลให้พืชดูดใช้ปุ๋ยได้ไม่ดีเท่ากับการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำหยด 3) สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสง ฤดูกาล (สังคม เตชะวงศ์เสถียร, ม.ป.ป.) อาจมีผลต่อการสะสมธาตุอาหารในใบองุ่น เพราะว่าในช่วงที่ทำการทดลองตรงกับช่วงฤดูหนาว ต้นองุ่นค่อนข้างมีอาการชะงักการเจริญเติบโต เนื่องจากองุ่นที่ปลูกในประเทศไทยจะเจริญเติบโตทางด้านลำต้น กิ่ง และใบได้ดีในช่วงที่มีสภาพอากาศร้อนชื้น หากได้รับอุณหภูมิต่ำ ต้นองุ่นจะอยู่ในระยะพักตัว ดูดธาตุอาหารได้น้อย และมีการเจริญทางด้านลำต้นได้ช้า 4) ประสิทธิภาพการดูด และการสะสมธาตุอาหาร ซึ่งเป็นกลไกของพืชในการจำกัดปริมาณการดูดใช้ของราก โดยมีองค์ประกอบบางประการมาเกี่ยวข้อง เช่น ในการให้ปุ๋ย และน้ำทางผิวดิน อาจส่งผลให้ดินปลูกมีความแน่นทึบ และทำให้รากมีการกระจายตัวได้น้อย และดูดธาตุอาหารได้ไม่ดี เป็นต้น ดังนั้น

ถึงแม้ว่าองุ่นจะมีปริมาณธาตุอาหารอยู่ในใบเพียงพอ แต่ในทุกทรีตเมนต์ก็ยังมีอาการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันได้ เช่นในผลการทดลองจากการทดลองที่ 1 ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าการให้ปุ๋ยสูตรต่างกัน วิธีการให้ต่างกัน มีผลต่อการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันด้วย

การวิเคราะห์การสะสมธาตุอาหารพืชด้วยวิธีเคมี เป็นวิธีการปัจจุบันที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในเนื้อเยื่อพืช แต่เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการเท่านั้น เกษตรกรไม่สามารถทำเองได้ ต้องมีการเตรียมตัวอย่างที่ซับซ้อน มีการเตรียมสารเคมีหลายชนิด บางชนิดมีความอันตรายต่อผู้ใช้สูง และขั้นตอนการวิเคราะห์มีความยุ่งยาก ต้องใช้จำนวนตัวอย่างปริมาณมาก ใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน หากมีตัวอย่างจำนวนมากจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ในครั้งเดียวกัน เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี มีราคาแพง เป็นต้น และในปัจจุบันมีวิธีการวิเคราะห์อีกวิธีการหนึ่งที่สามารถวิเคราะห์ปริมาณธาตุในวัสดุได้คือ เทคนิค XRF โดยเทคนิคนี้มีข้อดีคือไม่ทำลายตัวอย่าง (non-destructive method) และมีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างที่ไม่ยุ่งยาก สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีชีวิตได้ เช่น ชิ้นส่วนพืช เป็นต้น อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้มีข้อจำกัดบางประการ คือไม่สามารถวิเคราะห์ธาตุที่มีเลขอะตอมต่ำ เช่น ไฮโดรเจน คาร์บอน ออกซิเจน หรือไนโตรเจนได้ สำหรับการทดลองนี้ทำการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียมระหว่างวิธีเคมีกับเทคนิค XRF พบว่าผลการทดลองทั้งสองวิธีการให้ผลไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสหสัมพันธ์ (R^2) ระหว่างวิธีการวิเคราะห์ที่ระดับ 0.764, 0.774 และ 0.898 ตามลำดับ Kipriyanova et al. (2001) ได้ทำการทดลองใช้เทคนิค synchrotron XRF ตรวจสอบธาตุที่เป็นโลหะหนักในท่อลำเลียงของพืชที่ขึ้นอยู่ในอ่างเก็บน้ำ เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง atomic absorption spectroscopy (AAS) พบว่าผลการวิเคราะห์ทองแดง และโคบอลต์ด้วย synchrotron XRF มีความสอดคล้องกับเครื่อง AAS นอกจากนี้ยังมีการทดลองที่สนับสนุนความน่าจะเป็นไปได้สำหรับการนำเทคนิค XRF มาใช้วิเคราะห์ของธาตุอาหารพืช เช่นการทดลองวิเคราะห์ความหลากหลาย (speciation) ของธาตุในตัวอย่างดิน โดยการสกัดธาตุอาหารให้อยู่ในรูปของสารละลายด้วยสารแอมโมเนียมอะซิเตรท แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธี XRF ผลการวิเคราะห์พบว่า การประยุกต์ใช้ XRF มีความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุได้หลายชนิด (multi-elements) อย่างรวดเร็ว และมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ตรวจสอบองค์ประกอบธาตุในรูปของไอออนอิสระ และรูปของคาร์บอนเนต เช่น Mg, Ca, Mn, Zn, Pb, Rb และ Sr (Baranowski, Rybak and Baranowska, 2002) จากการทดลองข้างต้นจะเห็นแนวโน้มว่าวิธีการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในเนื้อเยื่อพืชด้วยวิธี XRF สามารถเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ระดับของธาตุอาหารในชิ้นส่วนของพืชได้

บทที่ 5

สรุป และข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาผลของการจัดการธาตุอาหาร การให้น้ำ และปุ๋ยในระบบน้ำหยดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพขององุ่น และได้มีการวิเคราะห์การสะสมธาตุอาหารพืชในใบองุ่นด้วยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอน สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้

1. การให้น้ำในระบบน้ำหยดมีแนวโน้มให้ผลการเจริญเติบโตขององุ่นดีกว่าการให้น้ำทางผิวดิน และการให้น้ำในระบบน้ำหยดสามารถประหยัดน้ำได้มากกว่าการให้น้ำทางผิวดิน 1.5 เท่า

2. การให้ปุ๋ยทุกวิธีให้ผลการเจริญเติบโตขององุ่นดีกว่าการไม่ให้ปุ๋ย และการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยดมีแนวโน้มทำให้มีการเจริญเติบโตดีกว่าการให้ปุ๋ยทางดิน และเมื่อมีการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยดตามค่า total nutrient uptake มีแนวโน้มว่าต้นองุ่นสามารถเจริญเติบโตทางลำต้น และใบได้ดีกว่าการให้ปุ๋ยตามสูตรของเกษตรกร

3. การให้ปุ๋ยทุกวิธีให้ปริมาณผลผลิตขององุ่นมากกว่าการไม่ให้ปุ๋ย การให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยดมีปริมาณของผลผลิตมากกว่าการให้ปุ๋ยทางดิน การให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยดตามค่า total nutrient uptake มีปริมาณผลผลิตมากกว่าการให้ปุ๋ยตามสูตรของเกษตรกร และค่าความแน่นเนื้อขององุ่นทุกทรีตเมนต์ไม่มีความแตกต่างกัน และคุณภาพผลผลิต ปริมาณ TSS TA และ TSS/TA พบว่าการให้ปุ๋ยในทุกวิธีมีแนวโน้มทำให้มีปริมาณ TSS และ TSS/TA สูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ย และวิธีการไม่ใส่ปุ๋ยมีปริมาณ TA สูงที่สุด

4. การศึกษาปริมาณ และการกระจายตัวของธาตุอาหารในใบองุ่น พบว่าการใส่ปุ๋ยจะทำให้มีการสะสมธาตุฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในใบกลางมากที่สุด ส่วนธาตุแคลเซียมจะสะสมสูงสุดที่ใบยอด และการสะสมธาตุอาหารบนชิ้นส่วนใบไม่มีความแตกต่างกันทั้งพื้นที่ใบส่วนข้าง และพื้นที่ใบส่วนบน

5. จากการเปรียบเทียบผล และประสิทธิภาพการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบองุ่นด้วยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอนกับวิธีทางเคมี พบว่าให้ผลการทดลองที่สอดคล้อง และไปในทิศทางเดียวกันโดยมีค่าสหสัมพันธ์ (R^2) ระหว่างวิธีการวิเคราะห์ธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียม ที่ระดับ 0.764, 0.774 และ 0.898 ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มว่าวิธีการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในเนื้อเยื่อพืชด้วยวิธี XRF อาจเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่น่ามาใช้ในการวิเคราะห์ระดับของธาตุอาหารในเนื้อเยื่อพืชได้

6. ควรมีงานวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของการให้น้ำ และปุ๋ยในระบบน้ำหยด ต่อปริมาณ และคุณภาพผลผลิตของต้นองุ่นที่มีอายุ 2 และ 3 ศึกษาแนวโน้มการให้ผลผลิต ส่วนการวิจัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยธาตุอาหารพืชด้วยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอน โดยใช้ใบที่มีการอบแห้งแล้ว และทำการทดลองในพืชชนิดอื่นด้วย เพื่อเป็นการยืนยันผลการทดลอง และสามารถนำมาใช้เป็นวิธีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในเนื้อเยื่อพืชได้อีกวิธีหนึ่ง

รายการอ้างอิง

- กรมชลประทาน. (2554). **คู่มือการหาปริมาณการใช้น้ำของพืช ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง และค่าสัมประสิทธิ์พืช**. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักอุทกวิทยา และบริหารน้ำ. 130 หน้า. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/iwmd/index_th.htm. 2 พฤศจิกายน 2555.
- กรมส่งเสริมการเกษตร. (2542). **การปลูกองุ่น**. กองส่งเสริมพืชสวน. พิมพ์ครั้งที่ 4. 33 หน้า. [ออนไลน์]. ได้จาก: service.moac.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4062. 20 พฤศจิกายน 2555.
- กรมส่งเสริมการเกษตร. (2548) **สถิติแสดงแหล่งเพาะปลูกปี 2543-2547**. ฝ่ายข้อมูลสำหรับการเกษตร กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. อ้างถึงในสุรทิน ใจดี. (2553). **ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อผลผลิต และคุณภาพขององุ่นรับประทานผลสดในเขตร้อนชื้น**. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
- จักรกฤษณ์ มีโย. (2551). **การจัดการ การผลิต อ้อยระบบน้ำหยดใต้ดิน กรณีศึกษาไร่องุ่นพืชผลตำบล บ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี**. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น. [ออนไลน์]. ได้จาก:http://pikul.lib.ku.ac.th/cgi-bin/sugar.exe?rec_id=001798&database=sugar&search_type=link&table=mona&back_path=/agre/mona&lang=thai&format_name=TFMON#. 2 ธันวาคม 2555.
- ดิเรก ทองอร่าม, วิทยา ตั้งก่อสกุล, นาวิ จิระชีวี และ อิทธิสุนทร นันทกิจ. (2545). **การออกแบบและเทคโนโลยีการให้น้ำแก่พืช**. พิมพ์ครั้งที่ 2. บริษัทฐานการพิมพ์จำกัด, กรุงเทพฯ. 496 หน้า.
- ดาวยศ นิลนนท์, สุรศักดิ์ นิลนนท์, ลพ ภาณุตานนท์ และสุเทพ ทองแพ. (2548). **ผลของสัดส่วนธาตุอาหารในระบบน้ำหยดที่ประเมินจากปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Perlette**. ใน **การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43** (499-506). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- นพพร สุรโชติ, สุรศักดิ์ นิลนนท์, ลพ ภาณุตานนท์, สุเทพ ทองแพ และ จรัส เห็นพิทักษ์. (2546). **ผลของวิธีการใส่และอัตราปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless**. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. [ออนไลน์]. ได้จาก: anchan.lib.ku.ac.th/thaiciard/handle/009/30312. 12 ตุลาคม 2555.
- นันทกร บุญเกิด, อัจฉรย์ สุขธำรง และ เรณู ขำเลิศ. (2544). **การรวบรวมและศึกษาลักษณะพันธุ์ การจัดการธาตุอาหารพืชและการผลิตไวน์องุ่น**. **รายงานการวิจัย**. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 29 หน้า.
- นันทกร บุญเกิด. (2546). **คู่มือการสร้างสวนองุ่น**. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. พิมพ์ครั้งที่ 3. นครราชสีมา: สมบูรณ์พรินติ้ง. 133 หน้า.

- บุญลือ เอี้ยวพาณิชย์. (2542). **เทคโนโลยีการให้น้ำแก่พืช**. หน้า 103-107,145. [ออนไลน์]. ได้จาก: <http://pineapple-eyes.snru.ac.th/stm/index.php?q=node/206>. 4 ธันวาคม 2555.
- เบญจพล ถาคำ. (2551). **การวิเคราะห์เชิงสมบัติและพารามิเตอร์ของการลอยแร่เฟลด์สปาร์โดย เซลลคอลลัมน์**. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2551/enmi0151bt_ch3.pdf. 20 พฤศจิกายน 2555.
- พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์. (2544). **การให้ปุ๋ยพร้อมกับการให้น้ำพืช**. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน. [ออนไลน์]. ได้จาก: <http://www.ku.ac.th/emagazine/march44/agri/water/>. 4 ธันวาคม 2555.
- มนตรี คำชู. (2553). **เทคโนโลยีการให้น้ำแก่พืชแบบองค์กรวม**. ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. [ออนไลน์]. ได้จาก: rdi.csc.ku.ac.th/AcademicServices/.../km/01.pdf. 4 ธันวาคม 2555.
- ยงยุทธ โอสดสภา. (2552). **ธาตุอาหารพืช**. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 529 หน้า.
- ยงยุทธ โอสดสภา, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และ ขวลิต ธงประยูร. (2554). **ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน**. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 519 หน้า.
- ยงยุทธ โอสดสภา. (2555). **หลักการวิเคราะห์ดิน และพืชทางเคมี**. [ออนไลน์]. ได้จาก: www.dryongyuth.com/journal/หลักการวิเคราะห์ดิน-พืช.pdf. 1 ธันวาคม 2555.
- ยศพล ผลาผล, สุรศักดิ์ นิลนนท์, ลพ ภาณุตานนท์ และสุเทพ ทองแพ. (2545ก). ผลของการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยดต่อผลผลิต และคุณภาพในองุ่นพันธุ์ Beauty seedless. **การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 40** (181-185). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- ยศพล ผลาผล, สุรศักดิ์ นิลนนท์, ลพ ภาณุตานนท์ และสุเทพ ทองแพ. (2545ข). ผลของการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยดต่อปริมาณธาตุอาหารและคาร์โบไฮเดรตในองุ่นพันธุ์ Beauty seedless. **การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 40** (186-193). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- วสันต์ บุญเต็ม. (2547). **อิทธิพลของปริมาณธาตุอาหาร N K และจำนวนกิ่งที่ให้ผลผลิตที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพผลองุ่นพันธุ์ CABERNET SAUVIGNON**. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- วรารุณ วุฒิวิชัย และพีระชาติ อุดการ. (2545). การศึกษาหาค่าปริมาณการใช้น้ำ และสัมประสิทธิ์การใช้น้ำขององุ่น. **วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**. ฉบับที่ 48 ประจำปี 2546. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://158.108.46.110/journal_th/show_division.php?division=%C7%D4%C8%C7%A1%C3%C3%1%AA%C5%BB%C3%D0%B7%D2%B9. 18 ธันวาคม 2555.
- วัฒนา สวรรยาธิบัติ. (2531). **การปลูกองุ่น**. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 31 หน้า. [ออนไลน์]. ได้จาก: www.eto.ku.ac.th/neweto/ebook/plant/tree_fruit/grape.pdf. 18 ธันวาคม 2555.

- วันชัย คุปวานิชพงษ์. (2555). การออกแบบระบบให้น้ำผ่านท่อในงานวิจัยเกษตรวิศวกรรม. **เอกสารประกอบคำบรรยาย**. โครงการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม. 26 หน้า.
- ศิริวัลย์ บุญสุข, ไพรัตน์ คงเหล็ก, สรวงธิดา ลิปิยกุล, นพมณี สุวรรณัง, พิชรี แสนจันทร์, วรางคนา สระบัว, สุวรรณีย์ ภูธรธราช และ นงลักษณ์ ปูระนะพงษ์. (2546). **คู่มือวิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ดินและพืช**. โครงการจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช. 117 หน้า.
- ศุภิมา ธนะจิตต์, อัญชลี สุทธิประการ, เอิบ เขียววันมณ และ Gilkes, R. J. (2549). **ธาตุหลักและธาตุอาหารเสริมในดินที่พัฒนามาจากหินบะซอลต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย**. ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. [ออนไลน์]. ได้จาก: <http://anchan.lib.ku.ac.th/kukr/handle/003/18385>. 20 พฤศจิกายน 2555.
- สังคม เตชะวงศ์เสถียร. (ม.ป.ป.). ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของพืช. **เอกสารประกอบการสอนสรีรวิทยาการผลิตพืช**. สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 37 หน้า
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2555). **สถิติการนำเข้า ส่งออกกุ้ง**. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://www.oae.go.th/oae_report/export_import/export_result.php. 20 พฤศจิกายน 2555.
- Baranowski, R., Rybak, A. and Baranowska, I. (2002). Speciation Analysis of Elements in Soil Samples by XRF. **Polish Journal of Environmental Studies**. 11 (5): 473-482.
- Black, C.A. (1965). Method of soil analysis In: the series **Agronomy American Society of Agronomy Inc**, Madison, Wisconsin, USA.
- Bray, R.H. and Kurtz, L.T. (1945). Determination of total organic and available forms of phosphorus in soil. **Soil Sci**. 59: 39-45.
- Bremner, J.B. (1996). Nitrogen-total In: Methods of soil analysis. Part 3. **Chemical methods -SSSA book series on 5**. Chapter 37: 1085-1121.
- Bunch Grape Nutrition Management**. (2012). [On-line]. Available: <http://www.smallfruits.org/BunchGrapes/production/TissueAnalysisforGrapevines.pdf>. November 20, 2012.
- Chapman, S.C. and Barreto, H.J. (1997). Using a chlorophyll meter to estimate specific leaf nitrogen of tropical maize during vegetative growth. **Agron. J**. 89: 557-562.
- Grapevine nutrition**. petiole analysis. vitinotes. (2006). [On-line]. Available: www.crcv.com.au. November 20, 2012.
- Grape**. (2012). [On-line]. Available: <http://en.wikipedia.org/wiki/Grape>. November 20, 2012.
- Hesse, P.R. (1971). Total elemental analysis and some trace elements. **A test book of soil chemical analysis**: 371-475 pp.

- Imed, D. (n.d.). **Grape Petiole Analysis**. Department of Horticulture and Crop Science OARDC, the Ohio State University. [On-line]. Available: www.oardc.ohio-state.edu/grapeweb/. November 20, 2012.
- International Fertilizer Industry Association. (1992). **FERTILIZING GRAPES**. [Online]. Available:<http://www.spectrumanalytic.com>. November 20, 2012.
- Isidro, C., Neale, C. M. U., Calera, A., Balbontin, C. and Piqueras, J. G. (2010). Assessing satellite based basal crop coefficients for irrigated grapes (*Vitis vinifera* L.). **Agric. WaterManage.** 98: 45-54.
- Jifon, J. L., Syvertsen, J. P. and Whaley, E. (2005). Growth environment and leaf anatomy affect nondestructive estimates of chlorophyll and nitrogen in Citrus sp. leaves. **J. Amer. Soc. HortSci.** 130: 152-158.
- Jones, J. B. (2001). **Laboratory guide for conducting soil tests and plant analysis**. CRC Press LLC, Boca Raton, Florida.
- Kipriyanova, L.M., Dvurechenskaya, S.Y., Sokolovskaya, I.P., Trunova, V.A. and Anoshin, G.N. (2001). XRFSA technique in the investigations of elements content in aquatic vascular plants and bottom sediments. **Nucl. Instrum. Methods Phys. Res.** 470: 441-443.
- Lindsay, W.L. and Norvell, W.A. (1978). Development of a DTPA soil test for zinc, manganese and copper. **Soil Sci Soc. Amer.J.** 42: 421-428.
- Loh, F. C. W., Grabosky, J. C. and Bassuk, N. L. (2002). Using the SPAD 502 meter to assess chlorophyll and nitrogen content of Benjamin fig and cottonwood leaves. **Hort Tech.** 12: 682-686
- Ministry of Agriculture, Food and Fisheries. (2001). **CROP COEFFICIENTS FOR USE IN IRRIGATION SCHEDULING**. 6 pp. [On-line]. Available:<http://www.agf.gov.bc.ca/resmgmt/publist/500Series/577100-5.pdf>. January 17, 2015.
- Opazo, C. A., Farias, S. O. and Fuentes, S. (2010). Effects of grapevine (*Vitis vinifera* L.) water status on water consumption, vegetative growth and grape quality: An irrigation scheduling application to achieve regulated deficit irrigation. **Agric. Water Manage.** 97: 956-964.
- Pellegrino, A., Lebon, E., Simonneau, T. and Wery, J. (2005). Towards a simple indicator of water stress in grapevine (*Vitis vinifera* L.) based on the differential sensitivities of vegetative growth components. **Aust. J. Grape Wine Res.** 11, 306-315.
- Paul, D. (n.d). **Efficient Vineyard Fertilization and Plant Nutrition**. Department of Horticultural. Iowa State University. [On-line]. Available:viticulture.hort.iastate.edu/info/pdf/domotonutr.pdf. November 20, 2012.

- Quoted in Spectrum Analytic Inc. (n.d). **Fertilizer Grapes**. [On-line]. Available: http://www.spectrumanalytic.com/support/library/pdf/fertilizing_grapes.pdf. November 20, 2012.
- Sole, V. A., Papillon, E., Cotte, M., Walter, P. H. And Susini, J. (2007). A multiplatform code for the analysis of energy-dispersive X-ray fluorescence spectra. **SPECTROCHIM ACTA B**. 62:63-68.
- Tancharakorn, S., Tanthanuch, W., Kamonsutthipaijit, N., Wongprachanukul, N., Sophon, M., Chaichuay, S., Uthaisar, C. and Yimnirun, R. (2012). The first microbeam synchrotron X-ray fluorescence beamline at the Siam Photon Laboratory. **J. Synchrotron Rad.** 19:536-540.
- Thien, S.J. (1979). A flow diagram for teaching texture by feel analysis. **J. Agron.** 8: 54-55.
- Turner, F. T. and Jund, M. F. (1991). Chlorophyll meter to predict nitrogen top dress requirement for semi-dwarf rice. **J. Agron.** 83: 926-828
- Xin, S. Z, Song, Y. J., Lv, C., Rui, Y. K., Zhang, F. S., Xu, W., Wu, D., Wu, S., Zhong, J., Chen D. L., Chen Q. and Peng, F. T. (2009). Application of synchrotron radiation X-ray fluorescence to investigate the distribution of mineral elements in different organs of greenhouse spinach. **Hort. Sci.** 4: 133-139.

ภาคผนวก

ตารางภาคผนวกที่ 1 ปริมาณความต้องการน้ำของอู่ในที่ปลูกในจังหวัดนครราชสีมา ($ET_c = ET_p \times K_c$)

เดือน จำนวนวัน	ธ.ค. 31	ม.ค. 31	ก.พ. 29	มี.ค. 31	เม.ย. 30	พ.ค. 31	มิ.ย. 30	ก.ค. 31	ส.ค. 31	ก.ย. 30	ต.ค. 30	พ.ย. 30	รวม (มม)
ETp	3.62	3.86	4.96	5.25	5.61	5.1	5.03	4.71	4.32	4.4	4.1	4.05	4.58
Kc	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
Etc (มม./วัน)	3.08	3.28	4.22	4.46	4.77	4.34	4.28	4.00	3.67	3.74	3.49	3.44	3.89
ความถี่การให้น้ำ (วัน)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
เวลาการให้น้ำ (นาท./ครั้ง)	17	18	24	25	27	24	24	23	21	21	20	19	22



รูปภาพผนวกที่ 1 การปลูกต้นองุ่นติดตาพันธุ์ มาร์รู ซีดเลส



รูปภาพผนวกที่ 2 การวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบองุ่น ด้วยเครื่องวัดคลอโรฟิลล์ Konica Minolta รุ่น SPAD 502 plus



รูปภาคผนวกที่ 3 วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น ด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์



รูปภาคผนวกที่ 4 แสดงอาการขาดธาตุฟอสฟอรัส (phosphorus deficiency)



รูปภาคผนวกที่ 5 แสดงอาการขาดธาตุเหล็ก (iron deficiency)



รูปภาคผนวกที่ 6 แสดงอาการขาดธาตุแมกนีเซียม (magnesium deficiency)



รูปภาพผนวกที่ 7 ช่อผลองุ่นอายุ 1 เดือน



รูปภาพผนวกที่ 8 การห่อผลองุ่นที่เปลี่ยนสี



รูปภาคผนวกที่ 9 ผลองุ่นในระยะเก็บเกี่ยว

ประวัติผู้วิจัย

1. ชื่อ นายสุดชล วุ่นประเสริฐ (Mr. Sodchol Wonprasaid)

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงานที่อยู่ติดต่อได้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช	สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ต. สุรนารี
อ. เมือง	จ. นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-224161	โทรสาร: 044-224281
E-mail: sodchol@sut.ac.th	

ประวัติการศึกษา

- 1983 ปริญญาตรี B.Sc. (Agronomy) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 1992 ปริญญาโท M.Sc. (Crop Science) University of Western Australia, Australia.
- 2003 ปริญญาเอก Ph.D. (Soil Science) University of Kentucky, USA.

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

1. การจัดการดิน ปุ๋ย ธาตุอาหารพืช
2. การจัดการน้ำ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย และงานวิจัยทั้งภายใน และภายนอกประเทศ

1. ผู้อำนวยการแผนการวิจัย: เทคโนโลยี การจัดการดิน น้ำ และธาตุอาหารพืช สำหรับการผลิตมันสำปะหลัง

2. หัวหน้าโครงการวิจัย:

2.1 Organic matter residue management in lowland rice in northeast Thailand. ACIAR

2.2 Integrated nutrient management for rainfed lowland conditions. IRRI

2.3 การจัดการน้ำ และธาตุอาหารพืชในถั่วเหลือง

3. งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว: ชื่อแผนงานวิจัย และ/หรือโครงการวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และสถานภาพในการทำวิจัย

3.1 การตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลืองและผลตกค้างจากการตรึง N ของถั่วที่มีต่อผลผลิต ข้าวในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนข้าว-ถั่วเหลือง โดย N-15 เทคนิค. (2545) วารสารดินและปุ๋ย. 24: 1-21. ผู้ร่วมวิจัย

3.2 การใช้ปุ๋ยชีวภาพจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว. (2536) รายงานประจำปีศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมวิชาการเกษตร. หน้า 109-115. ผู้ร่วมวิจัย

3.3 ความไวในการตอบสนองของดัชนีชี้วัดคุณภาพของดินต่อการ จัดการดินและระบบพืช. (2546) รายงานการประชุมวิชาการถั่วเหลืองแห่งชาติ ครั้งที่ 9. 5 หน้า. หัวหน้าโครงการ

3.4 ประสิทธิภาพการใช้น้ำของถั่วเหลือง. (2539) รายงานการประชุมวิชาการถั่วเหลืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6. 3-6 กันยายน 2539. หน้า 172-179. หัวหน้าโครงการ

3.5 Effects of Fe-Amino Acid Chelate Foliar Application on Nutrient Uptake, Growth and Yield of Chili (*Capsicum annuum* L.). In 16th Asian Agricultural Symposium and 1th International Symposium on Agriculture Technology. 25-27 August. Bangkok. Thailand ผู้ร่วมวิจัย

3.6 Control release and split fertilizer application for rainfed lowland rice in sandy soils. (1992) RLRC Final Report IRRI. 40. หัวหน้าโครงการ

3.7 Effects of Ethephon Application on Grape Fruit Quality and Yield. In 16th Asian Agricultural Symposium and 1th International Symposium on Agriculture Technology. 25-27 August. Bangkok. Thailand. ผู้ร่วมวิจัย

3.8 Effects of Rice Growing Systems and PGPR on Nitrogen Fixation and Rice Yield. In 16th Asian Agricultural Symposium and 1th International Symposium on Agriculture Technology. 25-27 August. Bangkok. Thailand. หัวหน้าโครงการ

3.9 Gas Generation from Anaerobic Fermentation of Animal Manures and Their Liquid Residue Applications on Organic Hydroponics. In 16th Asian Agricultural Symposium and 1th International Symposium on Agriculture Technology. 25-27 August. Bangkok. Thailand. ผู้ร่วมวิจัย

3.10 Improved water conservation and nutrient-use efficiency via subsoil compaction and mineral fertilization. (1998) In: Rainfed Lowland Rice: Advances in Nutrient Management Research, Ladha JK, Wade LJ, Dobermann A, Reichardt W, Kirk GJD, Piggin C (editors). International Rice Research Institute, Los Baños, Laguna, Philippines 245-256. ผู้ร่วมวิจัย

3.11 Integrated nutrient management on sesbania-rice systems. (1993) RLRC Final Report IRRI 35-37. หัวหน้าโครงการ

3.12 Nitrogen Fixation Efficiency of *Azospirillum largimobile* in System of Rice Intensification: SRI. In The ASA-CSSA-SSSA 2010 International Annual Meetings. 31 Oct. - 4Nov. Longbeach CA. USA. หัวหน้าโครงการ

3.13 Nitrous Oxide Emissions from Fertilized Upland Fields in Thailand. (2001) Nutrient Cycling in Agroecosystems. 57:55-65. ผู้ร่วมวิจัย

3.14 Organic matter residue management in lowland rice in northeast Thailand. (1995) ACIAR Proceedings No. 56. 98-103. หัวหน้าโครงการ

3.15 Performance of contrasting rice cultivars selected for rainfed lowland conditions in relation to soil fertility and water availability. (1996) Field Crops Research. 47: 267. หัวหน้าโครงการ

3.16 Screening aquatic legumes for potential use as pre-rice green manure on unproductive sandy soil. (1992) RLRC Final Report IRRI. 36-39. หัวหน้าโครงการ

3.17 Stimulation of Nitrogen Release from Organic Fertilizer for Organic Vegetable Production. In 16th Asian Agricultural Symposium and 1th International Symposium on Agriculture Technology. 25-27 August. Bangkok. Thailand. ผู้ร่วมวิจัย

3.18 The management of rice straw, fertilizers and leaf litters in rice cropping systems in Northeast Thailand. 2. Rice yields and nutrient balances. (1999) Plant and Soil. 209, 29-36. ผู้ร่วมวิจัย

3.19 The management of rice straw, fertilizers and leaf litters to enhance the sustainability of rice cropping systems in North-east Thailand. 1. Soil Carbon Dynamic. (1999) Plant and Soil. 209,21-28. ผู้ร่วมวิจัย
ทุน วช.

2. ชื่อ นางสาว ณัฐธิยา เบื่อนสันเทียะ (Miss Natthiya Buensanteai)

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ม.เทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงานที่อยู่ติดต่อได้พร้อมโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี

โทรศัพท์ 044-224202 (office), 080-7388449 (cell)

โทรสาร 044-224281

E-mail: natthiya@sut.ac.th

ประวัติการศึกษา

1999-2003 ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช), ม. เทคโนโลยีสุรนารี

2003-2005 ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตพืช), ม. เทคโนโลยีสุรนารี

2005-2008 ปริญญาเอก วท.ด. (โรคพืช), ม. เกษตรศาสตร์

2008-2010 Postdoctoral Research Associate (Plant Pathology), Texas A&M University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

2011-2012 Postdoctoral Research Associate (Molecular Microbiology),
Unité Mixte de Recherche Eco&Sols (Ecologie fonctionnelle &
biogéochimie des Sols & des Agroécosystèmes, ประเทศฝรั่งเศส

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

Plant Molecular Biology

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ: ระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นต้น

1. ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย: -

2. หัวหน้าโครงการวิจัย

- การพัฒนากระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ของไบโออีลิซิเตอร์จากเชื้อแบคทีเรีย *Bacillus subtilis* สายพันธุ์ CaSUT007 และ CaSUT008 เพื่อควบคุมโรคพืชผัก
- การพัฒนากระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ของสารไบโอแอคทีฟอีลิซิเตอร์ จากเชื้อแบคทีเรีย *Bacillus subtilis* สายพันธุ์ CasUT007 เพื่อควบคุมโรคพืช

- การจัดการปัจจัยการผลิต (ดิน ปุ๋ย ศัตรูพืช) เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพผักกาดเขียวปลีเพื่อให้สามารถผลิตได้ทั้งปี
- การส่งเสริมการเจริญเติบโตและกระตุ้นระบบความต้านทานของมันสำปะหลังให้ต้านทานต่อการเข้าทำลายของโรคแอนแทรคโนสด้วยเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ *Bacillus amyloliquefaciens* สายพันธุ์ CaSUT007 และการศึกษาสูตรอาหารของ *Bacillus amyloliquefaciens* เพื่อใช้แช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
- สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ชักนำความต้านทานต่อโรคใบไหม้และเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
- การกระตุ้นระบบความต้านทานขององุ่นให้ต่อต้านการเข้าทำลายของโรคที่เกิดจากเชื้อราด้วยสารไบโอแอคทีฟอลิซิเตอร์ระยะที่ 2
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแอนติบอดีบนผิวเฟจเพื่อการตรวจสอบและการสำรวจโรคเน่าและจากแบคทีเรียของพืชผักตระกูลกะหล่ำในประเทศไทย
- B.A.I. สารชีวภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง เพื่อทดลองในสภาพแปลงปลูกขนาดใหญ่
- การกระตุ้นระบบความต้านทานขององุ่นให้ต่อต้านการเข้าทำลายของโรคที่เกิดจากเชื้อราด้วยสารไบโอแอคทีฟอลิซิเตอร์
- การจำแนกและศึกษาลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย *Bacillus subtilis* CaSUT007 ในการผลิตโปรตีน phytase
- กลไกการตอบสนองของเชื้อรา *Sclerotium rofsii* ภายในสภาวะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
- การส่งเสริมการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังด้วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์และสารชีวภัณฑ์
- การส่งเสริมการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์และฮอร์โมนพืช
- เชื้อแบคทีเรีย *Bacillus subtilis* CaSUT007 ผลิต phytohormone และ extracellular proteins กระตุ้นการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง
- ประสิทธิภาพของสารสกัดพอลิเลคไทด์ สารทุติยภูมิจากเชื้อราที่มีประโยชน์ *Trichoderma virens* สายพันธุ์ NBSUT085 และสารชีวภัณฑ์ต่อการเพิ่มผลผลิตน้ำยาง: ช่วงการทดลองที่ 1
- ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์จากผิวใบมันสำปะหลังในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย *Xanthomonas axonopodis* pv. *manihotis* สาเหตุโรคใบไหม้

3. งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

Natthiya Buensanteai, Mathukorn Sompong, Chanon Saengchan and Kanjana Thumanu. (2014). The cellular components of cucumber seedlings after primed with plant growth promoting rhizobacteria, *Bacillus subtilis* CaSUT007, African Journal of Microbiology Research, 8(10), 1006-1011.

- Chen Xiaojun, Sopone Wongkaew, Yuan Jie, Yang Xuehui, He Haiyong, Wu Shiping, Tai Qigun, Wang Lishuang, Dusit Athinuwat and **Natthiya Buensanteai**. (2014). In vitro inhibition of *Trichoderma* isolates on *Verticilliumdahliae* causal agent of potato wilt disease in China, African Journal of Biotechnology. 13(33), 3402-3412.
- He H., Womgkaew S., **Buensanteai N.**, Yang X., Chen X., Wy S., Tan Q., Wang L., Yuan J. (2013). Preservation and conidia culture technique of *Ustilaginoidea virens*, Agriculture Science & Technology, 14(4), 624-626.
- Sompong, M., Thamnu K., Prakhongka I., Burapatpong B., Athinuwat D., Prathuangwong S., **Buensanteai, N.** (2013). Infrared spectroscopy: Method for investigating cellular components of phytopathogenic fungi response to temperature stress, African Journal of Microbiology Research. 7(34), 4331-4337.
- Prakongkha I., Sompong, M., Wongkaew, S., and **Buensanteai, N.** 2013. Changes in salicylic acid in grapevine treated with chitosan and BTH against *Sphaceloma ampelinum*, the causal agent of grapevine anthracnose. African Journal of Microbiology Research. 7(7):557-563.
- Prakongkha I., Sompong, M., Wongkaew, S., Athinuwat, D., and **Buensanteai, N.** 2013. Foliar application of SAR inducers for controlling of grape anthracnose caused by *Sphaceloma ampelinum* de Bary in Thailand. African Journal of Biotechnology. (Accepted)
- Buensanteai, N.**, Thumanu, K., Kooboran, K., Athinuwat, D., and Prathaungwong, S. (2012). Biochemical adaptation of phytopathogenic fungi, *Sclerotium rolfsii* response to temperature stress, African Journal of Biotechnology, 11(84), 15082-15090.
- Buensanteai, N.** and Athinuwat, D. (2012). The antagonistic activity of *Trichoderma virens* strain TvSUT10 against cassava stem rot in Thailand, African Journal of Biotechnology, 11(84), 14996-15001.
- Buensanteai, N.**, Thumanu, K., Sompong, M., Athinuwat, D. and Prathuangwong, S. (2012). The FTIR spectroscopy investigation of the cellular components of cassava after sensitization with plant growth promoting rhizobacteria, *Bacillus subtilis* CaSUT007. African Journal of Microbiology Research. 6 (3), 603-610.
- Mukherjee P.K., **Buensanteai N.**, Moran-Diez M.E., Druzhinina I.S., Kenerley C.M. (2012). Functional analysis of non-ribosomal peptide synthetases (NRPSs) in *Trichoderma virens* reveals a polyketide synthase (PKS)/NRPS

- hybrid enzyme involved in the induced systemic resistance response in maize. *Microbiology*. 158, 155-165.
- Buensanteai, N.** and Prathuangwong, S. (2012). The gene expression of the Tvmfs transporter and defense enzyme activities from *Trichoderma harzianum* response to pH stress. *African Journal of Microbiology Research*. 6(5), 944-952.
- Sompong, M., Tantasawat, P., Wongkaew, S., and **Buensanteai, N.**. 2012. Morphological, pathogenicity and virulence characterization of *Sphaceloma ampelinum*, the causal agent of grape anthracnose in Thailand. *African Journal of Microbiology Research*. 6(10): 2313-2320.
- Buensanteai, N.**, Thumanu, K., Mathukorn, S., Athinuwat, D., and Prathaungwong, S. 2012. The ability of *Bacillus subtilis* to suppress *Xanthomonas manihotis* biofilm. 5th Biofilms, Paris, France.
- Buensanteai, N.**, Thumanu, K., Mathukorn, S., Athinuwat, D., and Prathaungwong, S. 2012. Cellular component changes of the fungal pathogen caused chili anthracnose disease, *Colletotrichum gloeosporioides* response to temperature using FT-IR spectroscopy. SPEC2012, ChaingMai, Thailand.
- Thumanu, K., **Buensanteai, N.**, Mathukorn, S., Athinuwat, D., and Prathaungwong, S. 2012. Infrared microspectroscopy of cassava leaf after cassava stake sensitization with *Bacillus subtilis*. SPEC2012, ChaingMai, Thailand.
- Buensanteai, N.**, and Thumanu, K. 2012. Cellular components change of cucumber plant after seed treatment with *Bacillus subtilis* for growth promotion. 2nd APMF, Phuket, Thailand.
- Prakongkha I., Wongkaew, S., and **Buensanteai, N.** 2012. Chitosan and BTH primed grapevine for induced resistance against anthracnose caused by *Sphaceloma ampellinum* de Bary. 2nd APMF, Phuket, Thailand.
- Buensanteai, N.**, Thumanu, K., Mathukorn, S., Athinuwat, D., and Prathaungwong, S. 2012. Identification of a plant growth promoting rhizobacteria, *Bacillus subtilis* B. subtilis using FT-IR spectroscopy. 6th Asia Oceania Forum for Synchrotron Radiation Research (AOFSRR2012), Bangkok, Thailand. 51p

Buensanteai, N., Thumanu, K., Mathukorn, S., and Prathaungwong, S. 2012. The investigation of cellular components of cassava seedlings after sensitization with plant growth promoting rhizobacteria, *Bacillus subtilis* B. subtilis using FT-IR spectroscopy and HPLC. 6th Asia Oceania Forum for Synchrotron Radiation Research (AOFSSRR2012), Bangkok, Thailand. 51p

Buensanteai, N., Thumanu, K., Mathukorn, S., Praklongka, I., and Prathaungwong, S. 2012. The FTIR spectroscopy and enzyme activities assay investigation of the cellular components of phytopathogenic fungi, *Sclerotium rolfsii* response to temperature stress. 6th Asia Oceania Forum for Synchrotron Radiation Research (AOFSSRR2012), Bangkok, Thailand. 53p

4. งานวิจัยที่กำลังทำ

Buensanteai, N., Sompong, M., Thamnu K., and Athinuwat D. 2013. Infrared microspectroscopy: methods for determining cassava leave biochemical composition response to plant growth promoting rhizobacterium, *Bacillus subtilis* CaSUT007. Vibrational Spectroscopy. (Submitted)

Buensanteai, N., Sompong, M., Thamnu K., and Athinuwat D. 2013. Early and rapid detection of cassava anthracnose causal agent infection by Fourier transform infrared microscopy. Vibrational Spectroscopy. (Submitted)

Buensanteai, N., Sompong, M., Thamnu K., and Athinuwat D. 2013. Development of synchrotron FTIR microspectroscopy to identifying *Xanthomonas axonopodis* pv. *manihotis* causal agent of cassava bacterial blight in Thailand. Vibrational Spectroscopy. (Submitted)

Buensanteai, N. 2012. Isolation and characterization of *Bacillus subtilis* CaSUT007, a phytase producing rhizobacteria. African Journal of Microbiology Research. (Submitted)

Buensanteai, N., Thumanu, K. 2012. The cellular components of cucumber seedlings after primed with plant growth promoting rhizobacteria, *Bacillus subtilis* CaSUT007. African Journal of Microbiology Research. (Submitted)

Buensanteai, N. 2012. The plant growth promoting bacterium *Bacillus subtilis* CaSUT007

produces phytohormone and extracellular proteins for enhanced growth of cassava. African Journal of Microbiology Research. (Submitted)