

4037213 PIPIII/M : สาขาวิชาเอก : สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ; วท.ม.(สาขาวิชานสุขศาสตร์)

คำสำคัญ : การตรวจเต้านมด้วยตนเอง / มัชเริงเต้านม / ตัวแทนแม่บ้าน

สุนทรภรากรณ์ พิพัฒนกุศลกุล : ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีในชุมชน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ( THE EFFECTIVENESS OF HEALTH EDUCATION PROGRAM IN PROMOTING BREAST SELF-EXAMINATION BEHAVIOR AMONG WOMEN IN AMPHER VISESCHAICHAN ANGTHONG PROVINCE) คณะกรรมการคุณวิทยานิพนธ์ : ชนิษฐา ไกรทัย, Dr.P.H., ชาญชัย ยามะรัต, MSPH., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุยุชยา, คศ.ม., M.Ed. 192 หน้า, ISBN 974-663-353-8

โรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 3 ของมะเร็งในสตรีไทย และมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้เพิ่มขึ้นทุกปี โรคนี้ถ้าตรวจพบในระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นการเฝ้าระวังโรคด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ จะช่วยให้กันพบโรคมะเร็งเต้านมในระยะแรกได้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนจากตัวแทนแม่บ้านและการตั้งเป้าหมายมาเป็นแนวทางในการกำหนดกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายประกอบสื่อ การใช้ตัวแบบ การอธิบายกลุ่ม สารสาธิตและฝึกปฏิบัติ การตั้งเป้าหมายในการฝึกอบรมและการบันทึกพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการกระตุ้นเตือน กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีอายุระหว่าง 30-50 ปี จำนวน 156 คน โดยเป็นกลุ่มทดลองจำนวน 76 คน อาศัยอยู่ในตัวบ้านบางจังหวัดและกลุ่ม对比อยู่ที่บ้านจำนวน 80 คน อาศัยอยู่ในตัวบ้านที่ดำเนินการ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มทดลองได้รับกิจกรรมสุขศึกษาจากผู้วิจัย ใช้เวลาในการศึกษา 16 สัปดาห์ รวมรวมชั่วโมงโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ครั้ง คือ ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผล

ผลการวิจัยพิสูจน์ว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้ การรับรู้ความรู้และกระบวนการรับรู้ โอกาสสืบสานต่อการเกิดมะเร็งเต้านม ความคาดหวังในความสามารถด้านตนเองและความคาดหวังในผลลัพธ์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่ม对比อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงว่า โปรแกรมสุขศึกษาดังกล่าว สามารถสร้างแรงจูงใจในการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมระยะรุนแรง นำไปสู่การมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสตรีกลุ่มอื่นๆ เช่น ในสถานประกอบการ สมาคมสตรีต่างๆ