

3736580 PHPH/M : สาขาวิชาเอก: สุขศึกษา ; วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

คำสำคัญ : การประยุกต์ / ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค / พฤติกรรมการป้องกันกามโรค
/ ทหารกองประจำการ

พนักเอกชุมพล คอวนิช : การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการป้องกันกามโรคของทหารกองประจำการ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
จังหวัดปราจีนบุรี (APPLICATION OF PROTECTION MOTIVATION THEORY ON
VENEREAL DISEASES PREVENTIVE BEHAVIOR AMONG CONSCRIPTS OF 2nd
INFANTRY DIVISION ROYAL GUARD 1st ARMY AREA IN PRACHINBURI PROVINCE.)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : บุญยง เกี่ยวการคำ, วท.บ., ค.ม., M.P.H., Dr.P.H. นิรัตน์ อิมามิ,
วท.บ. เกียรตินิยม, M.P.H., Ph.D. รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว, วท.บ. เกียรตินิยม, M.P.H., Ph.D. 276 หน้า.

ISBN 974-663-118-7

จากสถิติทางสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2535-2539 พบว่า ทหารกองประจำการยังคงเป็น
กลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อกามโรคอยู่ การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันกามโรคของทหารกองประจำการ โดย
ใช้ PRECEDE Framework (L.W. Green, 1980) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาแล้วประยุกต์
ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค (R.W. Rogers, 1983) และทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม (R.D.
Caplan, 1974)เป็นกรอบแนวคิดในการจัดโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทหาร
กองประจำการกลุ่มทดลอง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้จาก
ทหารกองประจำการ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 80 คน โดยใช้
เป็นกลุ่มทดลองจำนวน 40 คนและกลุ่มเปรียบเทียบจำนวน 40 คน ใช้แบบสัมภาษณ์ทำการเก็บ
ข้อมูลรวม 3 ครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มและภายในกลุ่มใช้สถิติวิเคราะห์ Student's t-test และ Paired Samples t-test ส่วนการวิเคราะห์
หาอิทธิพลของตัวแปรที่ศึกษาด้วยสถิติ Multiple Classification Analysis (MCA)

ผลการวิเคราะห์พบว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกัน
กามโรคเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ
ตัวแปรที่ศึกษาสามารถทำนายพฤติกรรมการป้องกันกามโรคได้ร้อยละ 57.40 สรุปการจัดโปรแกรม
สุขศึกษาครั้งนี้มีประสิทธิผลดี ทำให้กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการป้องกันกามโรคดีขึ้น และเห็นควร
พิจารณานำไปใช้กับทหารกลุ่มอื่นของกองทัพบกที่มีวัยใกล้เคียงกันต่อไป