

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนผ่านในชีวิตของผู้สูงอายุสตรีภายหลังที่มีภาวะข้อสะโพกหักขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และเปรียบเทียบภาวะสุขภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านระหว่างก่อนและภายหลังที่มีภาวะข้อสะโพกหักขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาแบบเจาะจงจากผู้สูงอายุสตรีที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 79 คน ได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ว่ามีภาวะข้อสะโพกหัก และได้รับการรักษาตามอาการ ที่หอผู้ป่วยกระดูกหญิง โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย และแบบสอบถามภาวะสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ หาความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และนำไปหาความเชื่อมั่นด้วยวิธีของครอนบาค ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .81 กลุ่มตัวอย่างได้รับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการรับรู้ภาวะสุขภาพก่อนและภายหลังที่มีภาวะข้อสะโพกหัก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า ที ผลการวิจัยพบว่าในช่วงการเปลี่ยนผ่านในชีวิตของผู้สูงอายุสตรีภายหลังที่มีภาวะข้อสะโพกหัก ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพบมีการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพไปในด้านลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($t = -18.82, p < .001$)

Abstract

175727

The specific purposes of this descriptive research were to study transition in the lives of elderly women, and to compare health status including physical, mental, social and spiritual aspects between before and after having sustained hip fracture. Seventy-nine elderly women with over 60 years of age were randomly selected. They were diagnosed with hip fracture and received symptomatic treatment at female orthopedic unit in Chonburi hospital and Maharaj Nakorn Chiang Mai, and at female surgical unit, Queen Sawangwattana Memorial hospital. The instrument used in this study was comprised of demographic, information related to illness and current health status questionnaire. Content validity was approved by the experts. Reliability was .81 obtained by Cronbach's coefficient alpha. Subjects were asked about health status prior to and after hip fracture. By conducting dependent t-test, the finding showed that the scores of health status prior to and after hip fracture were significantly different. ($t = -18.82, p < .001$). Particularly, all aspects of health status after hip fracture decreased. This differentiation of health status was considered a transition in the lives of elderly women with hip fracture. Nursing intervention to maintain health status of these elderly women are recommended.