

4036532 PHPH/M : สาขาวิชาเอก : พยาบาลสาธารณสุข ; วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)

คำสำคัญ : ความรุนแรงในครอบครัว / ความวิตกกังวล / ความซึมเศร้า / ความก้าวร้าว

กมลพร แพทย์ชีพ : ความรุนแรงในครอบครัวและผลกระทบต่อปัญหาด้านจิตใจในกลุ่มอาการความวิตกกังวล ความซึมเศร้าและความก้าวร้าว: กรณีศึกษา อ.เมือง จ.ราชบุรี

(PSYCHOLOGICAL DISTRESS: ANXIETY, DEPRESSION AND AGGRESSION EFFECT FROM COUPLE VIOLENCE IN MUANG DISTRICT, RATCHABURI PROVINCE)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: สมพร เดียมชัยศรี, ป.ร.ค., ชนิดู วัชรโรทัย, Dr.P.H, พิทยา จารุทุนผล, M.P.H.M. 191 หน้า. ISBN 974-663-047-4

ถึงแม้สาธารณชนจะตระหนักเห็นความสำคัญว่า มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวในรูปแบบต่างๆ แต่งานวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวที่ศึกษาวิจัยโดยทีมสาธารณสุขยังพบน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้ชายที่ถูกกระทำรุนแรง

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัญหาด้านจิตใจในกลุ่มอาการ ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และความก้าวร้าว ระหว่างผู้ที่ไม่ถูกทำรุนแรงและผู้ที่ถูกทำรุนแรงในครอบครัว 154 คู่ ที่อาศัยอยู่ในเขต อ.เมือง จ.ราชบุรี

ความรุนแรงด้านจิตใจและร่างกายสามารถประเมินได้จาก 2 แบบวัดย่อยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ปัญหาด้านจิตใจในกลุ่มอาการความวิตกกังวลและความซึมเศร้าประเมินได้จากแบบวัดย่อยของแบบวัดสุขภาพจิตที่เรียกว่า Symptom Distress Checklist -90 หรือ SCL-90, ความก้าวร้าวประเมินได้จากแบบวัดที่ประยุกต์มาจากแบบวัดย่อยที่ใช้วัดความรู้สึกไม่เป็นมิตรของ SCL-90

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for windows โดยใช้สถิติร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, t-test และ F-test จาก ANOVA

ผลการศึกษาพบว่า เพศชายและเพศหญิงที่ถูกกระทำรุนแรงด้านจิตใจหรือที่ถูกกระทำรุนแรงด้านร่างกายและจิตใจ มีปัญหาด้านจิตใจทั้ง 3 ด้านสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ถูกกระทำรุนแรง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) เพศหญิงในกลุ่มที่ไม่ถูกกระทำรุนแรงและกลุ่มที่ถูกกระทำรุนแรงด้านจิตใจมีรายงานปัญหาด้านจิตใจทั้ง 3 ด้านสูงกว่าเพศชายในกลุ่มเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) และระหว่างผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงและเป็นผู้กระทำรุนแรง มีรายงานปัญหาทางด้านจิตใจทั้ง 3 ด้านสูงกว่า ผู้ที่ไม่ถูกกระทำรุนแรงและไม่เป็นผู้กระทำรุนแรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) ทั้งเพศชายและเพศหญิง

ดังนั้นพยาบาลสาธารณสุข ควรตระหนักถึงความสำคัญในการให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในครอบครัวในรูปแบบอื่นๆรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความรักความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว