

6.2 ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการศึกษาความสามารถของเชื้อแบคทีเรีย *Streptomyces* spp. ไอโซเลท K1 เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา *Pythium* sp. ได้ 99.04 เปอร์เซ็นต์ ในระดับห้องปฏิบัติการ (*in vitro test*) ดังนั้นจึงควรมีการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย *Streptomyces* sp. ไอโซเลท K1 เพื่อควบคุมโรคเน่าคอดินสาเหตุจากเชื้อรา *Pythium* sp. ในต้นกวางตุ้งในระดับโรงเรือน (Green house)
2. ควรมีศึกษาการใช้เชื้อแบคทีเรีย *Streptomyces* sp. ไอโซเลท F3 ร่วมกับ เชื้อแบคทีเรีย *Streptomyces* sp. ไอโซเลท K1 เนื่องจาก เชื้อแบคทีเรีย *Streptomyces* sp. ไอโซเลท K1 สามารถในการยับยั้งการเจริญเส้นใยเชื้อรา *Rhizoctonia* sp. ได้ 54.73 เปอร์เซ็นต์ ในระดับห้องปฏิบัติการ (*in vitro test*) ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาการใช้เชื้อแบคทีเรีย *Streptomyces* sp. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเน่าคอดินสาเหตุจากเชื้อรา *Rhizoctonia* sp. ในระดับโรงเรือน