

ตารางที่ 6 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน ดัชนีตับต่อตัว ของปลา ตะกรับที่ได้รับอาหารเสริมเปลือกกล้วยในระดับต่างๆ เป็นเวลา 12 สัปดาห์

สูตรอาหาร	อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ	ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน	ดัชนีตับต่อตัว
1	2.87±0.12 ^a	0.92±0.04 ^a	3.87±0.42 ^a
2	3.14±0.25 ^a	0.88±0.08 ^a	4.14±0.29 ^a
3	3.40±0.32 ^a	0.82±0.08 ^a	4.00±0.23 ^a
4	3.19±0.47 ^a	0.86±0.12 ^a	3.95±0.36 ^a
5	3.51±0.65 ^a	0.78±0.14 ^a	3.61±0.53 ^a

¹ตัวเลขที่นำเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากข้อมูล 3 ซ้ำ

ค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ที่มีตัวอักษรเหมือนกันในกำกับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ (p>0.05)