

บทที่ 4

ผลการศึกษา

ความหลากหลายทางชีวภาพ

จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของนกบริเวณเขาชอนเคื่อในวนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง อ.ตากลิ จ.นครสวรรค์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 - พฤศจิกายน 2550 พบนกทั้งหมด 50 ชนิด จาก 28 วงศ์ ดังนี้

วงศ์ ไก่ฟ้า นกกระทาและนกคุ้ม (Phasianidae)



ภาพโดย : สัทธีกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ ไก่ป่า (Red Junglefowl)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Gallus gallus*

ลักษณะทั่วไป ในประเทศไทยมี 2 ชนิดย่อย คือไก่ป่าดุ่มหูขาวและไก่ป่าดุ่มหูแดง ไก่ป่าดุ่มหูขาว ตัวผู้มีดุ่มหูขาว หน้าและหงอนขนาดใหญ่แดงสด หัว คอ ปีก และหลังเหลืองสลับแดง ท้องดำ หางดำเหลือบเขียว หางคู่กลางยื่นยาวกว่าหางเส้นอื่น

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 43 - 76 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ทุ่งหญ้า ป่าโปร่ง ป่าไผ่ และชายป่า

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อย

วงศ์ นกคอปันและนกหัวขวาน (Picidae)



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

- ชื่อสามัญ** นกหัวขวานค่างอกลายจุด (Fulvous-breasted Woodpecker)
- ชื่อวิทยาศาสตร์** *Dendrocopos macei*
- ลักษณะทั่วไป** หน้าขาว แถบมุมปากแยกเป็น 2 แถบสั้นๆ ท้ายทอยดำ หลังดำมีจุดขาวเรียงกัน เป็นแถบขวาง หางดำแถบขาว อกน้ำตาลแกมสีเนื้อมีจุดดำเล็กๆ กระจาย กัน เป็นชมพูแกมแดง
- ขนาด** เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 17 - 18 เซนติเมตร
- ถิ่นอาศัย** ป่าโปร่ง ป่าผลัดใบ และป่าละเมาะ
- สถานะภาพ** เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยบางพื้นที่

วงศ์ นกโพระดก (Megalaimidae)



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกโพระดกธรรมดา (Lineated Barbet)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Megalaima lineata*

ลักษณะทั่วไป หัว ใต้คอ และ อกน้ำตาลเข้ม มีลาย เป็นลายเกล็ดน้ำตาลอ่อน ปนขาว ปากหนาใหญ่ เหลืองอ่อน วงรอบตาเหลือง ขนบริเวณแก้มไปจนถึง ใต้คอขาว บริเวณไหล่มีขีดขาว และขีดขาวปนขีดเข้มจะมีต่อเนื่องลงไปจนถึงท้อง ขนคลุมลำตัวส่วนใหญ่เป็นเขียว

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 27 - 28 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ป่าเต็งรัง ป่าโปร่ง และสวนผลไม้ ที่ราบถึงความสูง 800 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อย



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกคิตทอง (Coppersmith Barbet)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Megalaima haemacephala*

ลักษณะทั่วไป หน้าผากแดงสดเด่นชัด มีแถบดำ จากกึ่งกลางกระหม่อมลากลงมาจนถึงหลังขนคลุมหู แล้ววกไปต่อกับโคนปาก หัวตาและหลังตาดำ มีแถบแคบๆ เหนือตาคลุมคิ้วคิ้วเหลือง ตีตาเป็นแถบหนาๆ เหลือง กางและใต้คอเหลืองเข้ม แล้วต่อด้วยแถบแดง ล้อมด้วยเหลืองอีกทีหนึ่ง ท้ายทอยและด้านข้างของคอเขียวแกมเทา ส่วนบนของลำตัวถัดจากท้ายทอยไปยังหลังไหล่ ตะโพก ขนคลุมโคนหางและขนหางตอนบนเป็นเขียวอมเหลือง ปีกเขียวแต่ขนปลายปีกคล้ำดำ ส่วนล่างของลำตัวตั้งแต่หน้าอก ท้อง จนถึงขนคลุมใต้โคนหางขาวแกมเหลือง มีลายเป็นขีดยาวๆ เขียวกระจายทั่ว โดยเฉพาะบริเวณสีข้าง ใต้หางฟ้า ม่านตาน้ำตาลอ่อน มีหนังเปลือกเปลือยรอบอีกด้วย ปากดำ ขาและนิ้วเท้าแดงเลือดนก เล็บดำ

ขนาด เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 16 - 17 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ป่าโปร่ง สวนผลไม้และสวนสาธารณะ ถึงระดับความสูง 915 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

วงศ์ นกตะขาบ (Coraciidae)



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกตะขาบทุ่ง (Indian Roller)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Coracias benghalensis*

ลักษณะทั่วไป หน้าผาก หัวจนถึงท้ายทอยมีเขียวแกมฟ้า แต่กลางกระหม่อมจะเหลือบน้ำตาล หัวดำ หลังคอ หลังไหล่และขนกลางปีกด้านในเป็นน้ำตาลแกมเขียว แต่ที่หลังคอจะเหลือบม่วงแดง ตะโพกและขนคลุมบนโคนหางฟ้าสด สะดุดตามาก ในเวลากลางคืนจะเห็นเป็นแถบน้ำเงิน ที่ปลายหางฟ้า ขนบนปีกมีหลายสีเหลื่อมกัน ม่านตาน้ำตาล หนังรอบตาเหลือง ปากดำด้านๆ ขาและนิ้วเท้าน้ำตาลแกมเหลือง เล็บดำ

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 33 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ทุ่งนา พื้นที่เกษตรกรรม และป่าโปร่ง ที่ราบถึงความสูง 1,500 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก



ที่มา : www.zyworld.com

ชื่อสามัญ นกกระจ่างหัวขวาน (Common Hoopoe)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Upupa epops*

ลักษณะทั่วไป หัวเล็ก มีปากยาวมาก เรียวเล็กแลโค้งลงเล็กน้อยคล้ายๆ กับปากของ นกจาบคา (Bee-eater) ปากมีค่อนข้างดำ แต่จางตอนปลายปาก รุงมุกกลางและไม่มีขนคลุมรุงมุก ม่านตาน้ำตาลแก่ มีลักษณะเด่นอยู่ที่ขนหงอนบนหัว ซึ่งกางออกได้เหมือนพัด ขนหงอนแต่ละเส้นน้ำตาลเหลืองและชมพูกลมกลืนกับสีสันของลำตัว และมีแต้มดำตรงปลายขนหงอน แต่ละ เส้นบนหัวโดยเรียงซ้อนทับกันจนราบ มองดูคล้ายกับด้ามพัดเล็กๆ ที่ยื่นยาวออกมาจากท้ายทอย ดูเผินๆ คล้ายกับว่ามีปากยาวๆ ที่ท้ายทอยอีกอันหนึ่ง เวลาที่นกกางขนหงอนออกเต็มที่จะดูคล้ายพัดหรือหมวกของหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดง

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 30 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ทุ่งหญ้า พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่โล่งในป่า ที่ราบถึงความสูง 1,500 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่นบางส่วนเป็นนกอพยพ พบบ่อย

วงศ์ นกจาบคา (Meropidae)



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกจาบคาเล็ก (Green Bee-eater)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Merops orientalis*

ลักษณะทั่วไป ขนโดยทั่วไป เป็นเขียวอมเหลืองแทบทั้งตัว ยกเว้นบนหัวและท้ายทอย ซึ่งเป็นแดงออกน้ำตาล ในเวลาถูกแสงแดด ขนบริเวณหัวและท้ายทอย จะดูเป็นมันคล้ายทองแดง นกบางตัวอาจมีสีฟ้าที่ได้คอเล็กน้อย มีแถบดำพาดผ่านตาไปยังด้านข้างของคอ และมีแถบดำสั้นๆ ขวางหน้าอกตอนบนด้วย ปีกมีสีเข้มกว่าส่วนล่างของลำตัว และมีขนปลายปีกดำ ขนหางคู่กลาง ซึ่งยาวเลยปลายขนหางคู่อื่นออกไปมีสีดำเช่นกัน มีมันตาสีแดง ปากสีดำ ขาและนิ้วเท้าดำ

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 20 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย พื้นที่เกษตรกรรมเปิดโล่ง และพื้นที่แห้งแล้ง

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก บางส่วนอพยพมาทำรังวางไข่



ภาพโดย : สัทธกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกjabคาหัวเขียว (Blue-tailed Bee-eater)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Merops philippinus*

ลักษณะทั่วไป หน้าผากลงไปจนถึงหัวไหล่เขียวเป็นมัน อาจมีแต้มหรือปื้นน้ำตาลปนอยู่ด้วย หัวไหล่หลังและขนคลุมปีกเขียวสด ตะโพกฟ้า ขนปีกบินชั้นรองออกฟ้า ตะโพกและหางฟ้า ขนหางเส้นกลางมีสีฟ้า แต่แกนขนหางที่ยื่นยาวออกไปเป็นสีดำ มีแถบดำลากจากโคนปากบนผ่านตาไปทางด้านหลังตาจนเกือบถึงต้นคอ ซึ่งแถบดำนี้จะมีขอบทั้งสองข้างเป็นสีฟ้า กางเหลืองอ่อน คอแดงอมส้ม ขนคลุมใต้หางฟ้าจางๆ ขนคลุมใต้ปีกเหลืองอมน้ำตาล ปลายปากดำ โคนปากออกชมพู ตาม่วงแดง ขาและเท้าน้ำตาลอมชมพู

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 30 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย พื้นที่เปิดโล่งใกล้น้ำ

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น อพยพผ่าน อพยพและอพยพมาทำรังวางไข่พบบ่อย



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

- ชื่อสามัญ** นกจาบคาหัวสีส้ม (Chestnut-headed Bee-eater)
- ชื่อวิทยาศาสตร์** *Merops leschenaulti*
- ลักษณะทั่วไป** ขนโดยทั่วไป เป็นสีเขียวอมเหลืองแทบทั้งตัว ยกเว้นบนหัวและท้ายทอย ซึ่งเป็นสีแดงออกน้ำตาล ในเวลาถูกแสงแดด ขนบริเวณหัวและท้ายทอย จะดูเป็นมันคล้ายทองแดง นกบางตัวอาจมีสีฟ้าที่ใต้คอเล็กน้อย มีแถบสีดำพาดผ่านตาไปยังด้านข้างของคอ และมีแถบสีดำสั้นๆ ขวางหน้าอกตอนบนด้วย ปีกมีสีเข้มกว่าส่วนล่างของลำตัว และมีขนปลายปีกสีดำ ขนหางคู่กลาง ซึ่งยาวเลยปลายขนหางคู่อื่นออกไปมีสีดำเช่นกัน มีมันตาสีแดง ปากสีดำ ขาและนิ้วเท้าสีดำ
- ขนาด** เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 23 เซนติเมตร
- ถิ่นอาศัย** ป่าดิบค่อนข้างโปร่ง ป่าผลัดใบ และชายป่า ที่ราบถึงความสูง 1,800 เมตร นก
- สถานะภาพ** เป็นประจำถิ่น พบบ่อย

วงศ์ นกคัคคู (Cuculidae)



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้า

ชื่อสามัญ บั้งรอกใหญ่ (Green-billed Malkoha)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Phaenicophaeus tristis*

ลักษณะทั่วไป หน้าผาก กระหม่อมและหลังคอ สีเทาเข้มเหลือบเขียวเล็กน้อย หลังและตะโพก สีเทาเข้มเช่นกัน แต่เหลือบเขียวมากกว่า นอกจากนี้ก้านขนยังมีสีดำ จึงทำให้เห็นคล้ายมีลายสีดำด้วย ปีกและขนหาง เป็นสีดำเหลือบเขียวเข้มและยังเหลือบน้ำเงิน อีกนิดหน่อยด้วย ปลายขนหางทุกเส้นที่ยาวลดหลั่นกันลงไปมีสีขาว จึงทำให้เห็นด้านใต้ของขนหาง คางและแก้มสีขาวขุ่น ใต้คอเป็นสีเทาออกน้ำตาล ซึ่งค่อยๆ เข้มขึ้นบริเวณหน้าอก และเข้มมากขึ้นไปทางส่วนล่างของลำตัว จนถึง ขนคลุมใต้โคนหาง มีหนังสีแดงสด ม่านตาสีน้ำตาล ปากสีเขียวอ่อนเป็นมัน แต่ โคนปากบนและมุมปากออกสีแดง ขาและนิ้วเท้า สีเขียวอมเทา เล็บ สีเทา

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 53-59 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ป่าดิบ ป่าผลัดใบ ชายป่า และสวนผลไม้ ที่ราบถึงความสูง 1,600 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

วงศ์ นกกะปูด (Centropodidae)



ที่มา : www.zyworld.com

ชื่อสามัญ นกกะปูดใหญ่ (Greater Coucal)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Centropus sinensi*

ลักษณะทั่วไป นกตัวเมียตัวโตกว่าตัวผู้เล็กน้อย ขนบริเวณหัวและหน้าอกค่อนข้างน้อย และเส้นขนค่อนข้างแข็ง ปากสีดำ ตาสีแดง หัวและคอ สีดำเหลือบน้ำเงินหรือเขียว หลังตอนบนเหลือบน้ำเงินและม่วง หลังตอนล่างและปีกสีน้ำตาลแดง ปลายปีกสีคล้ำ ขนคลุมปีกด้านล่างสีดำ ลำตัวด้านล่างและหาง สีดำเหลือบน้ำเงินปนเขียว ขาและนิ้วเท้า สีดำ

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 53 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ทุ่งนา ทุ่งหญ้า และป่าโปร่ง มักพบใกล้แหล่งน้ำ ที่ราบถึงความสูง 1,525

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

วงศ์ นกเค้า (Strigidae)



ที่มา : www.zyworld.com

ชื่อสามัญ นกเค้าโมง ,นกเค้าแมว (Asian Barred Owlet)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Glaucidium cuculoides*

ลักษณะทั่วไป เป็นนกลีขขนาดเล็ก หัวกลม รูปร่างอ้วนลำ จมูกคล้ายนกไม่มีคอ เนื่องจากขนที่คอขาวลักษณะอ่อนนุ่ม หัวและลำตัวสีน้ำตาลคล้ำ มีลายเป็นขีดสีขาวอมเหลืองหรือขาว ขาวลงมาตามความยาวของลำตัวขีดสีน้ำตาลนี้จะกระจาย ห่างๆกัน ตรงกลางอก จะเว้นช่วงเป็นสีขาวแคบๆ ข้างลำตัวจะมีขีดสีน้ำตาลค่อนข้างถี่กว่าบริเวณอื่นๆ มีลายเป็นขีดสั้นๆ สีขาวอมเหลืองตามขวางของลำตัวกระจายห่างๆกัน ม่านตาสีเหลือง มีคิ้วแคบๆ สีขาว

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 20.5-23 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ป่าดิบค่อนข้างโปร่ง ป่าโปร่ง และสวนผลไม้ ที่ราบถึงความสูง 1,980 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

วงศ์ นกพิราบและนกเขา (Columbidae)



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกพิราบป่า (Rock Pigeon)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Columba livia*

ลักษณะทั่วไป ขนตามลำตัวโดยทั่วไปสีเทา หัว ด้านหลังหัว และอกตอนบนสีค่อนข้างดำ ปลายหางสีดำ ขนคลุมปีกสีเทาอ่อน ที่ปีกมีแถบกว้าง สีค่อนข้างดำ 2 แถบ คอสีเขียวและม่วง เหลือบมัน ลำตัวมีแต้มสีขาวหรือน้ำตาล นกบางตัวมีสีคล้ำจนเกือบดำ ขณะบินขนคลุมด้านล่างปีกมีสีเทาเงินหรือสีขาวเงิน

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 33-34 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย บ้านเรือน แหล่งชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และหน้าผาหิน

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกเขาใหญ่, นกเขาหลวง (Spotted Dove)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Streptopelia chinensis*

ลักษณะทั่วไป หัวสีเทา ปากสีน้ำตาล ค่อนข้างยาว คอ ค่อนข้างสั้น คอด้านบนมีแถบสีดำ ลายจุดสีขาว ลำตัวด้านบนสีออกน้ำตาล ปีกสีน้ำตาลเข้มกว่าลำตัว ขนคลุมขนปีก แฉวนอกและบริเวณหัวปีกมีแถบสีเทา ออกสีน้ำตาลอ่อน ท้องและขนคลุมโคนขนหาง ด้านล่างสีขาว หางยาวปานกลาง ขนหางคู่บนสุด กว้างมีสีดำ และปลายสีขาว ขาและนิ้วเท้าสีแดง

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 30-31 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย สวน ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ ที่ราบถึงความสูง 2,040 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกเขาไฟ (Red Collared Dove)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Streptopelia tranquebarica*

ลักษณะทั่วไป หัว สีเทา ท้ายทอยด้านล่างมีแถบดำคาด ลำตัวมีสีน้ำตาลแดงแกมม่วง ปีกและหลังสีเข้มกว่าท้อง ขนปีกบินสีเทาดำ ตะโพกสีเทา ใต้หางสีขาว ขนหางคู่บนอกๆ ขาวประมาณครึ่งหนึ่ง ตัวเมียสีน้ำตาล

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 23-24.5 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย สวน ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ ที่ราบถึงความสูง 1,200 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกเขาขาว (Peaceful Dove)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Geopelia striata*

ลักษณะทั่วไป หน้าผากจนถึง กลางหัว แก้ม คางและใต้คอ สีเทาอมฟ้าอ่อนๆ บริเวณท้ายทอย สีเทาแกมน้ำตาลแดง หลังคอและด้านข้างคอ ด้านข้างอก และ สีข้าง เป็นลายบั้งสีดำสลับขาวเรียงกันถี่ๆ หลังตะโพก ขนคลุมโคนหางด้านบน ขนคลุมปีก สีเทาแกมน้ำตาลอ่อน ขนปลายปีก สีน้ำตาลคล้ำ ขนหางด้านใน สีเทาแกมน้ำตาล ขลิบปลายขนสีขาว ปลายหางและขนหางด้านนอกสี ลำตัวด้านล่าง ตั้งแต่หน้าอกลงไปเป็นสีน้ำตาลเจือชมพู ซึ่งจะค่อยๆจางลงจนเป็นสีขาว ที่ส่วนท้องและ ขนคลุมใต้โคนหาง ม่านตาสีเทา วงรอบตาสีฟ้าอมเขียวอ่อน ปากสีดำแกมเขียวหรือสีเทาแกมน้ำเงิน ขาและนิ้วเท้าสีชมพูหรือแดงเข้ม เล็บเท้าสีฟ้าแกมเขียว

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 21-21.5 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย สวน ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ ที่ราบถึงความสูง 2,030 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

- ชื่อสามัญ** นกเขาเป๋ล้าธรรมดา (Thick-billed Green Pigeon)
- ชื่อวิทยาศาสตร์** *Treron curvirostra*
- ลักษณะทั่วไป** นกตัวผู้ กระหม่อมสีเทา ใต้คอสีเขียวทึมๆ ช่วงไหล่ไปจนถึงขนคลุมปีกสีแดง เลือดหมู ขอบปีกมีลายสีเหลืองแซมด้วยลายสีดำที่ขอบปีก อกสีเขียว คันทาสีเขียวเข้มและมีลายขีดสีขาว ขนคลุมโคนขนหาง ด้านล่างสีน้ำตาลปนแดง นกตัวเมียเมื่อมองดูไกลๆ จะเห็นเป็นสีเขียวทั้งหมด และมีลายแถบสีเหลืองที่ปีก แต่ถ้าดูใกล้ๆ จะเห็นกระหม่อมสีเทาดัดกับหัวสีเขียว คันทาสีเขียวเข้มและมีลายขีดสีขาว ต่อเนื่องไปจนถึง ขนคลุมโคนขนหางด้านล่างซึ่งมีสีเนื้อเข้มหรือสีครีม ขนปีกด้านล่าง ขณะบินจะเห็นได้ปีก เป็นสีฟ้าอมเทา
- ขนาด** เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 15 เซนติเมตร
- ถิ่นอาศัย** ป่าดิบ ป่าโปร่ง และชายป่า ที่ราบถึงความสูง 1,280 เมตร
- สถานะภาพ** เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อย

วงศ์ นกหัวโตและนกกระเต (Charadriidae)



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกกระเตแต่้แวด (Red-wattled Lapwing)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Vanellus indicus*

ลักษณะทั่วไป หัวถึงอกดำ หน้รอบตาและเหนียงที่หัวตาแดงเข้ม ปากแดงเข้มปลายดำ ขนคลุมหูเป็นแถบขาวใหญ่ ลำตัวด้านบนสีน้ำตาล ลำตัวด้านล่างขาว แข็งและดินเหลืองหรือแกมเขียว

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 31.5-35 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ทุ่งนา และพื้นที่เกษตรกรรมเปิดโล่ง

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

วงศ์ เหยี่ยว (Accipitridae)



ภาพโดย : สัทธกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ	เหยี่ยวขาว (Black-shouldered Kite)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Elanus caeruleus</i>
ลักษณะทั่วไป	ขนหางคู่บนสุด เป็นสีเทาอ่อน แต่ขนหางคู่อื่นๆ เป็นสีขาว หน้าผาก หลังจนถึงขนคลุมโคนหางเป็นสีดำสนิท และ ขนคลุมหัวปีกกลาง มีสีดำสนิทในขณะที่ยังส่วนอื่นๆ ของปีก รวมทั้งขนกลางปีกและขนปลายปีก เป็นสีเทาอมฟ้า ปลายขนปีกด้านนอกและปลายขนปลายปีก มีสีคล้ำเล็กน้อย ตาสีแดงสุกใส หนังเปลือกตาลรอบรูจมูกสีเหลือง ปากสีคล้ำดำ ขาและนิ้วเท้าสีเหลือง
ขนาด	เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 31-35 เซนติเมตร
ถิ่นอาศัย	ทุ่งนา ทุ่งหญ้า และพื้นที่เกษตรกรรมเปิดโล่ง ที่ราบถึงความสูง 1,500 เมตร
สถานะภาพ	เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อย

วงศ์ นกอีเสือ (Laniidae)



ภาพโดย : สัทธกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกอีเสือน้ำตาล (Brown Shrike)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Lanius cristatus*

ลักษณะทั่วไป มีปากหนา ใหญ่สีดำ แต่บางตัวอาจเป็นสีน้ำตาลคล้ำ ปลายปากแหลมจุ่ม หัวโต ลำตัวเพรียวหางยาว ม่านตาสีน้ำตาล มีแถบสีดำลากจากโคนปาก ผ่านตาจนไปถึงข้างหู ปีกสีน้ำตาลเข้ม ลำตัวด้านล่างสีขาวแซมด้วยสีน้ำตาลแดงจางๆ ยกเว้นคางและคอ หางด้านล่าง สีน้ำตาลอมเทา ขาสีดำ

ขนาด เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 19-20 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย พื้นที่เกษตรกรรมและที่โล่งต่างๆ ที่ราบถึงความสูง 2,000 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกอพยพ พบบ่อยมาก



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกอีเสือหลังแดง (Burmese Shrike)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Lanius collurio*

ลักษณะทั่วไป บริเวณกระหม่อม ท้ายทอยและหลังตอนบนสีเทาอมฟ้า มีแถบสีดำลากจากหน้าผากพาดผ่านตาไปถึงด้านข้างของหัว ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแดงปนส้มอมแดงไม่มีลวดลายใดๆ ปีกและหางสีดำ มีแถบสีขาวบริเวณโคนขนปลายปีก ขนคลุมโคนขนหางด้านบน สีส้มแดง ขนหางคู่บนมีสีขาว ด้านข้างของลำตัวและ สีข้างสีจางกว่า ลำตัวด้านล่างสีอ่อนข้างขาว

ขนาด เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 19-21 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ชายป่าติดกับพื้นที่เกษตรกรรมและที่โล่งต่างๆ ที่ราบถึงความสูง 1,800 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่นและนกอพยพ พบค่อนข้างบ่อยในบางพื้นที่



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกอีเสือหัวดำ (Long-tailed Shrike)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Lanius schach*

ลักษณะทั่วไป ส่วนบนของหัว ตั้งแต่หัวตา หน้าผาก กระหม่อม ท้ายทอย จนถึงหลังคอ สีดำสนิท ถัดจากหลังคอดลงมา เป็นสีเทาซีดเล็กน้อย หลังส่วนที่เหลือรวมทั้งไหล่ ตะโพก จนถึงขนคลุมบนโคนหาง เป็นสีน้ำตาลปนแดง ขนคลุมปีกดำ ขนกลางปีกและขนปลายปีกเป็นสีน้ำตาลแกมเกือบดำ แต่ขอบขนเป็นสีแดงปนน้ำตาล นอกจากนี้ ที่โคนขนปลายปีกทุกเส้นมีแต้มขาวอีกด้วย จึงทำให้แลเห็นเป็นแถบสีขาว อยู่กลางปีกสีดำ ขนหางเป็นสีดำแต่ขนหางสองคู่บนอกมีริบขนด้านนอกเป็นสีแดงอมน้ำตาล ขอบขนหางและปลายขนหางทุกๆ เส้นเป็นสีแดงปนน้ำตาลเรื่อๆ

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 25-28 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย พื้นที่เกษตรกรรมและที่โล่งต่างๆ ที่ราบถึงความสูง 1,800 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

วงศ์ นกแอ่นพง (Artamidae)



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกแอ่นพง (Ashy Woodswallow)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Artamus fuscus*

ลักษณะทั่วไป ปีกเป็นรูปสามเหลี่ยม สีเทาเข้มแต่บริเวณอก และ ท้องสีจะจางกว่า ขนคลุมโคนขนหางด้านล่างสีขาว มีลายพาดแคบๆ สีขาว ที่ขนคลุมโคนขนหางด้านบนและลายพาดสีขาวหรือเทาที่ปลายหาง ปากสีน้ำตาลอ่อนหรือเทา บริเวณหัวตาสีดำ ลำตัวส่วนอื่นๆ สีน้ำตาล โดยด้านบนจะเข้มกว่าด้านล่าง หาง สีดำ

ขนาด เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 16-18 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย พื้นที่เกษตรกรรมและที่โล่งต่างๆ และบางครั้งพบบินเหนือป่า ที่ราบถึงความสูง 1,800 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

วงศ์ นกขมิ้น (Oriolidae)



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกขมิ้นท้ายทอยดำ (Black-naped Oriole)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Oriolus chinensis*

ลักษณะทั่วไป ขนส่วนใหญ่ของลำตัวเป็นสีเหลืองขมิ้น ยกเว้นขนปลายปีกและขนหางเส้นบน ซึ่งเป็นสีดำ มีแถบสีดำจากโคนปากทั้งสองลากไปจดกันที่ท้ายทอย ปากสีชมพู ม่านตาสีแดงแกมน้ำตาล ขาและนิ้วเท้าสีดำแกมเขียว

ขนาด เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 19-20 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ชายป่า ป่าโปร่ง สวนสาธารณะและป่าชายเลน ที่ราบถึงความสูง 1,525 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกอพยพ พบบ่อยมาก บางส่วนเป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยหรือหายาก

วงศ์ นกอีแพรด (Rhipiduridae)



ที่มา : www.zyworld.com

ชื่อสามัญ นกอีแพรดแถบอกดำ (Pied Fantail)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Rhipidura javanica*

ลักษณะทั่วไป ได้คอสีขาวต่อจากสีขาวมีลายพาดสีดำผ่านอกตอนบน ท้องมีสีขาวแกมสีครีม ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลเข้มปนน้ำตาลดำ หัวสีออกดำ คีบมีบริเวณที่เป็นสีขาวเล็กน้อยและอาจสังเกตเห็นได้ไม่ถนัดนักเพราะขนโดยรอบยาวปิดบังไว้ หางกางแผ่ออกเป็นรูปพัด ปลายขนหางสีขาว

ขนาด เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 17.5-19.5 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย แหล่งชุมชนในที่ราบ สวนสาธารณะและป่าชายเลน

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

วงศ์ นกแซงแซว (Dicruridae)



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกแซงแซวสีเทา (Ashy Drongo)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Dicrurus leucophaeus*

ลักษณะทั่วไป ขนคลุมลำตัวเป็นสีเทาหรือสีเกือบดำ ลำตัวด้านบนสีเข้มกว่าลำตัวด้านล่าง มีลายแฉกที่ด้านหลังของหน้าเป็นสีขาว สีเทาหรือเทาเข้ม หางเว้าลึก

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 25.5-29 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ชายป่าและป่าโปร่ง ที่ราบถึงความสูง 2,565 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่นและนกอพยพ พบบ่อย



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

- ชื่อสามัญ** นกแซงแซวหางปลา (Black Drongo)
- ชื่อวิทยาศาสตร์** *Dicrurus macrocercus*
- ลักษณะทั่วไป** ขนลำตัวเป็นสีดำเหลือบน้ำเงินเป็นมัน ปากสีดำ ขาและนิ้วเท้ารวมทั้งเล็บก็เป็นสีดำ แต่มีขนตาของเป็นสีแดง หากแฉกเล็ก
- ขนาด** เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 27-28.5 เซนติเมตร
- ถิ่นอาศัย** ทุ่งนา พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ ที่ราบถึงความสูง 2,000 เมตร
- สถานะภาพ** เป็นนกประจำถิ่นและนกอพยพ พบบ่อยมาก



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ	นกแซงแซวหางอนขน (Spangled Drongo)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Dicrurus hottentottus</i>
ลักษณะทั่วไป	ลำตัวยาวเพรียว ปลายปากโค้งลงเล็กน้อย รูปปากเกือบเป็นรูปสามเหลี่ยม ลำตัวและปีกเขียวเข้มจนเกือบดำเป็นมันเงา บนกระหม่อม โคนปากได้คอด้านข้างคอ และอกตอนบน มีขนเส้นสั้นๆ ตั้งตรงเป็นกระจุกสีเขียวเข้มจนเกือบดำ ขนบริเวณตั้งแต่ไหล่ ไปจนถึงหาง เป็นสีดำมัน
ขนาด	เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 29-33 เซนติเมตร
ถิ่นอาศัย	ป่าดิบและป่าโปร่ง ช่วงอพยพบางครั้งพบในสวนผลไม้ สวนสาธารณะ ที่ราบถึงความสูง 2,000 เมตร
สถานะภาพ	เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อย บางส่วนเป็นนกอพยพ

วงศ์ นกแซวสวรรค์ (Monarchidae)



ที่มา : www.zyworld.com

ชื่อสามัญ นกจับแมลงจุกดำ (Black-naped Monarch)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Hypothymis azurea*

ลักษณะทั่วไป ขนคลุมลำตัวส่วนใหญ่ และอกส่วนบนสีน้ำเงินอมฟ้า มีจุดกลมสีดำบริเวณกลางหัวก่อนไปใกล้ท้ายทอย ปลายขีดเล็กๆ สีดำพาดจากใต้คอไปเกือบถึงหลังคอ มีขีดดำเล็กๆ ลากผ่านตาปาก สีเทาอมฟ้า ภายในปากสีเหลือง โคนปากมีหนวดแข็งสีดำ หนา ท้องด้านล่างจนถึงขนคลุมใต้โคนหางสีขาว

ขนาด เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 16-17.5 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ป่าดิบ ป่าโปร่ง และป่าชายเลน ช่วงอพยพพบได้หลายสภาพป่า ที่ราบถึงความสูง 1,520 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่นและนกอพยพ พบบ่อย

วงศ์ นกขมิ้นน้อย (Aegithinidae)



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกขมิ้นน้อยธรรมดา (Common Iora)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Aegithina tiphia*

ลักษณะทั่วไป ส่วนบนของหัว ท้ายทอย ไปจนถึงหลังเป็นสีเหลืองแกมเขียว แต่ส่วนล่างของลำตัว ตั้งแต่ใต้คอ หน้าอก ท้อง จนถึงขนคลุมใต้โคนหาง เป็นสีเหลือง ขนคลุมบนโคนหาง เป็นสีเหลืองเข้มเช่นกัน ปีกและหางเป็นสีดำเข้มตัดกับสีเหลืองเข้มของลำตัวดูเด่นชัดยิ่งขึ้น บนปีกสีดำ ยังมีแถบสีขาวพาดขวางอีก 2 แถบ ปากสีดำ ม่านตาสีเหลือง ขาและนิ้วเท้าสีค่อนข้างดำ

ขนาด เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 12-14.5 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ป่าโปร่ง ป่าชายเลน สวนสาธารณะ และสวนผลไม้ ที่ราบถึงความสูง 1,500 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

วงศ์ นกเดินดง (Turdinae)



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกกระเบื้องฟ้า (Blue Rock-Thrush)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Monticola solitarius*

ลักษณะทั่วไป ลำตัวเป็นสีน้ำเงินเข้ม ขนแต่ละเส้น มีขอบขาวจึงทำให้เห็น เป็นลาย เกล็ดสีจางๆ ทั่วทั้งตัว หัวตามีสีดำ ขนปีกและขนหางเป็นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ แต่ขอบขนเป็นสีน้ำเงินและปลายขน เป็นสีขาว จึงเห็นเป็นลายจางๆ ที่ปีก และ หาง ปากสีดำ ภายในปากสีเหลือง ขาและนิ้วเท้าสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม เล็บสีดำ

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 21-23 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย หน้าผา พื้นที่เกษตรกรรมและที่เปิดโล่งต่างๆ ที่ราบถึงความสูง 1,830 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยบางพื้นที่ และนกอพยพ พบบ่อยมาก



Chaiyan Kasorndorkbua

ที่มา : www.zyworld.com

ชื่อสามัญ นกเอี้ยงถ้ำ (Blue Whistling-Thrush)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Myiophonus caeruleus*

ลักษณะทั่วไป ลำตัวหนาใหญ่ ปากใหญ่สีเหลือง ขนลำตัวม่วงแกมน้ำเงิน แขนงด้วยจุดเหลือง
ม่วงน้ำเงินเป็นมัน

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 31-35 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ป่าดิบ มักอยู่ใกล้ลำน้ำและถ้ำ ที่ราบถึงความสูง 2,565 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่นและนกอพยพ พบบ่อย

วงศ์ นกจับแมลงและนกแขวน (Muscicapinae)



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกจับแมลงคอแดง (Red-throated Flycatcher)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ficedula parva*

ลักษณะทั่วไป ขนคลุมลำตัวด้านบนสีออกเทาอมน้ำตาล ลำตัวด้านล่างสีค่อนข้างขาว บริเวณอกจะมีสีขาวอมเหลืองปนเทาตัดกับคอและท้องด้านล่างที่เป็นสีขาว ขนคลุมหางด้านบนสีดำ ส่วนขนหางสีดำ แต่ขนหางด้านนอกสุดทั้งสองข้างมีขอบขนครึ่งหนึ่งเป็นสีขาว

ขนาด เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 13-13.5 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ป่าโปร่ง สวนสาธารณะ และสวนผลไม้ ที่ราบถึงความสูง 2,153 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกอพยพ พบบ่อยมาก



ที่มา : www.zyworld.com

- ชื่อสามัญ** นกจับแมลงหัวเทา (Grey-headed Flycatcher)
- ชื่อวิทยาศาสตร์** *Culicicapa ceylonensis*
- ลักษณะทั่วไป** มีหัวและอกสีเทา บนหัวเป็นพุ่มคล้ายหงอนสั้นๆ สีเข้มกว่าอกและหัวเล็กน้อย ขนคลุมลำตัวด้านบนสีเขียวอมเหลือง แต่บริเวณขนคลุม โคนหางด้านบน สีจะค่อนข้างเหลือง ลำตัวด้านล่างสีเหลืองสด แต่บริเวณสีข้างจะออกสีเขียวเล็กน้อย
- ขนาด** เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 11.5-13 เซนติเมตร
- ถิ่นอาศัย** ป่าดิบ ป่าโปร่ง และชายป่า ช่วงอพยพอาจพบในป่าชายเลน สวนสาธารณะ ที่ราบถึงความสูง 2,565 เมตร
- สถานะภาพ** เป็นนกประจำถิ่นและนกอพยพ พบบ่อย



ที่มา : www.zyworld.com

ชื่อสามัญ นกกางเขนบ้าน (Oriental Magpie Robin)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Copsychus saularis*

ลักษณะทั่วไป ส่วนบนของลำตัวตั้งแต่หัว คอ หน้าอก หลัง ไหล่ ขนคลุมปีก ตะโพก จนถึง ขนหางตอนบน เป็นสีดำขลับเหลือบน้ำเงินเล็กน้อย ปีกมีสีดำด้านๆ แต่มีแถบสีขาวตามความยาวของปีก 1 แถบ ส่วนล่างของลำตัวถัดจากหน้าอกลงมาจนถึง ท้อง ขนคลุมใต้โคนหางและด้านใต้ของหางเป็นสีขาว

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 19-21 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย อาศัยบ้านเรือน แหล่งชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม สวนผลไม้ สวนสาธารณะ ป่าโปร่ง และชายป่า ที่ราบถึงความสูง 1,830

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกกางเขนดง (White-rumped Shama)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Copsychus malabaricus*

ลักษณะทั่วไป บริเวณหัว คอ ออก และลำตัวด้านบนเป็นสีน้ำเงินเข้มเกือบดำ ตะโพก ขนคลุมโคนขนหางด้านบน และขนหางคู่บนๆ เป็นสีขาว ลำตัวด้านล่างสีน้ำตาลแดงถึงส้ม

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 21.5-28 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ป่าดิบ ป่าโปร่ง ป่าไผ่ และชายป่า ที่ราบถึงความสูง 1,525 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อย

วงศ์ นกเอี้ยงและนกกิ้งโครง (Sturnidae)



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกเอี้ยงสาริกา (Common Myna)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Acridotheres tristis*

ลักษณะทั่วไป หัวและอกสีดำแกมน้ำตาล ปากและหนังรอบตาสีเหลือง ลำตัวสีน้ำตาลเข้ม กลางท้องและก้นสีขาว ขนปีกบินสีดำมีแถบสีขาว ขนหางได้ปีกสีขาว แข็งและ ดินสีเหลือง

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 24.5-27 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เปิดโล่งต่างๆ และแหล่งชุมชน ที่ราบถึงความสูง 1,525 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ	นกเอี้ยงหงอน (White-vented Myna)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Acridotheres grandis</i>
ลักษณะทั่วไป	ขนลำตัวสีดำ ตาสีน้ำตาลแดงเข้มเกือบดำ ปากเหลือง หน้าผากมีหงอนยาวตั้งเด่นชัด ปีกมีแถบสีขาวเห็นเป็นวงใหญ่ขณะบิน ก้นสีขาว แข็งและตีนสีเหลือง
ขนาด	เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 24-27.5 เซนติเมตร
ถิ่นอาศัย	พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เปิดโล่งต่างๆ และแหล่งชุมชน
สถานะภาพ	เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

วงศ์ นกนางแอ่น (Hirundinidae)



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกนางแอ่นบ้าน (Barn Swallow)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Hirundo rustica*

ลักษณะทั่วไป ขนลำตัวด้านบนสีดําเหลืองปนํ้าเงินเป็นมัน หน้าผากและคอสีนํ้าตาลแดงเข้มมีแถบสีดําเหลืองปนํ้าเงินพาดอก ลำตัวด้านล่างและขนคลุมใต้ปีกขาว หากแรกลีกลักษณะที่เด่นชัดที่สุด

ขนาด เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 14-15 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย พื้นที่เปิดโล่ง ที่ราบถึงความสูง 2,565 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่นและนกอพยพ พบบ่อยมาก

วงศ์ นกปรอด (Pycnonotidae)



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกปรอดเหลืองหัวจุก (Black-crested Bulbul)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Pycnonotus melanicterus*

ลักษณะทั่วไป หัวสีดำมีหงอนยาว ส่วนบนของลำตัวรวมทั้งปีก มีสีเขียวอ่อนปนเหลือง ขนหางสีน้ำตาลเข้ม ขอบขนหางสีเขียวอ่อนปนเหลือง ขนคลุมลำตัวด้านล่างสีเหลือง บริเวณอกส่วนบน และสีข้างมีสีเขียวอ่อนเจือปน ขา ดินและเล็บสีดำ

ขนาด เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 18.5-19.5 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ป่าดิบ ป่าโปร่ง ชายป่า และป่าละเมาะ ที่ราบถึงความสูง 2,565 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกปรอดหัวสีเข้ม (Sooty-headed Bulbul)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Pycnonotus aurigaster*

ลักษณะทั่วไป หัวสีดำ มีพุ่มหงอนขนไม่ยาวนัก ลำตัวด้านบนสีน้ำตาล ขนคลุมโคนขนหางด้านบน มีแถบสีออกขาว ลำตัวด้านล่างและปลายหางสีขาวแกมเทา ขนคลุมหูสีขาวแกมเทา

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 19-21 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ชายป่า พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เปิดโล่ง ที่ราบถึงความสูง 1,830 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก



ที่มา : www.zyworld.com

ชื่อสามัญ นกปรอดคอลาย (Stripe-throated Bulbul)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Pycnonotus finlaysoni*

ลักษณะทั่วไป ขนคลุมลำตัวด้านบนสีเขียวเข้มอมน้ำตาล หน้าผาก ขนคลุมหู ใต้คอและอก
 ตอนบนมีลายขีดสีเหลือง กลางท้องสีขาวแกมเทา ท้องด้านล่างและสีข้างสี
 น้ำตาลอ่อน ขนคลุมใต้โคนหางสีเหลือง

ขนาด เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 19-20 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ป่าโปร่ง และชายป่า

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อย



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

- ชื่อสามัญ** นกปรอดหน้าवल (Yellow - vented Bulbul)
- ชื่อวิทยาศาสตร์** *Pycnonotus goiavier*
- ลักษณะทั่วไป** ลำตัวด้านบนสีน้ำตาล อกและหัวตาสีดำ มีคิ้วกว้างสีขาว อกและท้องมี
 หงอนสั้นๆ สีน้ำตาลอมแดง ปกติจะมองไม่เห็น แต่เมื่อกระแวงภัย หรือตกใจ
 จะยกหงอนตั้งขึ้นจนพอสังเกตเห็นได้ ลำตัวด้านล่างสีขาว อกมีสีน้ำตาลแซม ขน
 กลุ่มโคนขนหางด้านล่างสีเหลืองแกมเขียว
- ขนาด** เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 20-20.5 เซนติเมตร
- ถิ่นอาศัย** ป่าชายเลน สวนผลไม้ สวนสาธารณะ และใกล้แหล่งชุมชนในพื้นที่ราบ
- สถานะภาพ** เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อย



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกปรอดสวน (Streak-eared Bulbul)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Pycnonotus blanfordi*

ลักษณะทั่วไป สีของขน คลุมลำตัวโดยทั่วไปสีน้ำตาลปนสีเขียวอมเหลือง ใต้คอสีจาง ท้องและขนคลุมโคนขนหางด้านล่างสีเหลืองอ่อน บริเวณขนคลุมหุ้มีลายขีดสีขาวเห็นเด่นชัด ตาสีเทาอ่อน ปีกสีเขียวอมเหลือง ปากสีน้ำตาล โคนปากสีชมพูอ่อน

ขนาด เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 17.5-19.5 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ป่าโปร่ง สวนผลไม้ พื้นที่เกษตรกรรม สวนสาธารณะ และใกล้ชุมชน ที่ราบถึงความสูง 915 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

วงศ์ นกแว่นตาขาว (Zosteropidae)



ที่มา : www.zyworld.com

ชื่อสามัญ นกแว่นตาขาวสีทอง (Oriental White-eye)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Zosterops palpebrosus*

ลักษณะทั่วไป ขนคลุมลำตัวด้านบนตั้งแต่หน้าผาก หัว หลัง ลงไปจนถึงหางเป็นสีเขียวอ่อน แกมเหลือง คาง ใต้คอและหน้าอกตอนบนสีเหลืองสด เนื้อตามีแต้มสีเหลือง เล็กน้อย หน้าอกตอนล่างและท้องเป็นสีเทาจางๆ แต่มีเส้นสีเหลือง ลากจาก หน้าอกตอนบนผ่านกลางหน้าอกตอนล่าง และท้องลงไปจนถึงขนคลุมใต้โคน หาง หางมีสีคล้ำ เช่นเดียวกับขนปลาย

ขนาด เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 10.5-11 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ป่าดิบ ป่าโปร่ง ป่าชายหาด และพื้นที่ใกล้ป่า ที่ราบถึงความสูง 1,830 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

วงศ์ นกกระเจี๊ยบ นกพง และนกกกระจิด (Sylviidae)



ที่มา : www.zyworld.com

ชื่อสามัญ นกกระเจี๊ยบธรรมดา (Common Tailorbird)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Orthotomus sutorius*

ลักษณะทั่วไป หน้าผาก และกระหม่อมมีสีน้ำตาลแดงสด ลำตัวด้านบนมีสีเขียวอมเหลือง หางสีน้ำตาลอ่อนแซมด้วยสีเหลืองอมเขียว ค้นขาสีน้ำตาลแดงเรื่อๆ ขาสีเนื้อ หรือ อกน้ำตาล

ขนาด เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 11-13 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ชายป่า ป่าละเมาะ สวนผลไม้และสวนสาธารณะใกล้ชุมชน ที่ราบถึงความสูง 1,525 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อย



ที่มา : www.zyworld.com

- ชื่อสามัญ** นกกระจิ๊ดหางขาวเล็ก (White-tailed Leaf Warbler)
- ชื่อวิทยาศาสตร์** *Phylloscopus davisoni*
- ลักษณะทั่วไป** ปากล่างสีส้มปลายดำ คีวสีขาวแกมเหลือง แฉบตาสีคล้ำ กระจงมอมสีดำแกมเขียวมีแถบกลางสีอ่อน แฉบปีก 2 เส้นสีเหลือง ลำตัวด้านล่างสีขาวแกมเหลือง มีขีดสีเหลืองจางๆ ใต้หางขณะหุบสีขาวชัดเจน
- ขนาด** เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 11-11.5 เซนติเมตร
- ถิ่นอาศัย** ป่าดิบ ป่าโปร่ง และชายป่า ความสูง 900-2,565 เมตร
- สถานะภาพ** เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

วงศ์ นกกาฝาก (Dicaeidae)



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกสีชมพูสวน (Scarlet-backed Flowerpecker)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Dicaeum cruentatum*


ลักษณะทั่วไป ตัวผู้มีส่วนบนของลำตัว ตั้งแต่หน้าผาก หัว ท้ายทอย หลัง ตะโพก และขนคลุมบนโคนหางเป็นสีแดงเข้ม ใหล่ ขนคลุมปีกและขนหางเป็นสีดำเหลือบน้ำเงิน จอยปาก แข็ง นิ้วเท้า และเล็บเป็นสีดำ ม่านตาสีน้ำตาลแก่ ตัวเมีย ลำตัวเป็นสีเทาแกมน้ำตาล แต่ตะโพก และขนคลุมบนโคนหางเป็นสีแดง

ขนาด เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 8.5-9 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ป่าโปร่ง ชายป่า สวนผลไม้และสวนสาธารณะ ที่ราบถึงความสูง 1,220 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

วงศ์ นกกินปลีและนกปลีกล้วย (Nectariniidae)



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ	นกกินปลีอกเหลือง (Olive-backed Sunbird)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Nectarinia jugularis</i>
ลักษณะทั่วไป	คอและอกส่วนบนสีน้ำเงินเหลืองเป็นมัน ท้องและขนคลุมโคนหางด้านล่างสีเหลืองสด ลำตัวด้านบนสีเขียวอมน้ำตาล ได้คอดลงมาจนถึงอกส่วนบน สีเหลืองน้ำเงินเข้ม อกและท้องส่วนล่างสีเหลืองสด ปากและนิ้วเท้าสีดำ
ขนาด	เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 11.5 เซนติเมตร
ถิ่นอาศัย	ป่าโปร่ง ป่าชายเลน ป่าพรุ พื้นที่เกษตรกรรม สวนผลไม้และสวนสาธารณะ ที่ราบถึงความสูง 915 เมตร
สถานะภาพ	เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

วงศ์ นกกระติ๊ด^๗ (Estrildidae)



ภาพโดย : สิทธิกร อินทร์น้ำ

ชื่อสามัญ นกกระติ๊ดขี้หมู (Scaly-breasted Munia)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Lonchura punctulata*

ลักษณะทั่วไป ออกและสีออกขาว มีลายเป็นเกล็ดสีน้ำตาล ลำตัวด้านบน สีน้ำตาล มีบริเวณที่ขนเป็นสีออกเหลืองอมเขียวบนตะโพกและขนคลุมหางด้านบน ใบหน้าด้านข้างมีแต้มสีน้ำตาล แก้มและคอจะมีสีน้ำตาลคล้ำกว่าส่วนอื่นๆ ขนคลุมใต้โคนหางสีขาว ปากหนาสีดำ ขนคลุมปีกสีน้ำตาล

ขนาด เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 12-12.5 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย ทุ่งหญ้า ทุ่งนา ป่าละเมาะ และพื้นที่เปิดโล่งใกล้ชุมชนเมือง ที่ราบถึงความสูง 1,500 เมตร

สถานะภาพ เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

ชนิดพันธุ์ของนกที่ช่วยแพร่กระจายพันธุ์พืช

จากการศึกษาพบนกที่กินพืชเป็นอาหารทั้งหมด 24 ชนิด จาก 13 วงศ์ แบ่งเป็น นกที่กินพืชเป็นอาหารหลัก และนกที่กินทั้งพืชและสัตว์ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายชื่อนกที่กินพืชเป็นอาหารและชนิดของพืชอาหารนก

ลำดับที่	ชื่อสามัญ/ ชื่อวิทยาศาสตร์	ลักษณะการกิน	ชนิดของพืชอาหารนก
	Family Phasianidae		
1	ไก่ป่า/ <i>Gallus gallus</i>	O	เมล็ดธัญพืชต่างๆ เมล็ดข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว และดอกหญ้า
	Family Megalaimidae		
2	นกโพระดกธรรมดา/ <i>Megalaima lineata</i>	F	ผลสุกของไทร หว้า ตะขบ ส้านใบเล็ก มะเดื่อ และน้ำหวานของดอกจี่ว ทองหลวงป่า และทองกวาว
3	นกตีทอง/ <i>Megalaima haemacephala</i>	F	ผลสุกของไทร หว้า ตะขบ ส้านใบเล็ก มะเดื่อ และมะเฒ่า
	Family Columbidae		
4	นกพิราบป่า/ <i>Columba livia</i>	O	เมล็ดธัญพืชต่างๆ
5	นกเขาใหญ่, นกเขาหลวง/ <i>Streptopelia chinensis</i>	O	เมล็ดธัญพืชต่างๆ เมล็ดข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว และดอกหญ้า
6	นกเขาไฟ/ <i>Streptopelia tranquebarica</i>	O	เมล็ดธัญพืชต่างๆ เมล็ดข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว และดอกหญ้า
7	นกเขาขาว/ <i>Geopelia striata</i>	O	เมล็ดธัญพืชต่างๆ เมล็ดข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว และดอกหญ้า
8	นกเขาเปล้าธรรมดา/ <i>Treron curvirostra</i>	F	ผลสุกของไทร และหว้า
	Family Oriolidae		
9	นกขมิ้นท้ายทอยดำ/ <i>Oriolus chinensis</i>	O	ผลสุกของไทร หว้า และน้ำหวานของดอกจี่ว และทองหลวงป่า
	Family Dicuridae		
10	นกแซงแซวหางอนขน/ <i>Dicrurus hottentottus</i>	O	น้ำหวานของดอกจี่ว ปอหูช้าง และทองหลวงป่า

ตารางที่ 1 รายชื่อนกที่กินพืชเป็นอาหารและชนิดของพืชอาหารนก (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อสามัญ/ ชื่อวิทยาศาสตร์	ลักษณะการกิน	ชนิดของพืชอาหารนก
	Family Turdinae		
11	นกกระเบื้องผา/ <i>Monticola solitarius</i>	O	ผลสุกของไทร และมะเดื่อ
12	นกเอี้ยงถ้ำ/ <i>Myiophonus caeruleus</i>	O	ผลสุกของไทร คำลิ่ง และมะเดื่อ
	Family Sturnidae		
13	นกเอี้ยงสาธิตา/ <i>Acridotheres tristis</i>	O	เมล็ดธัญพืช
14	นกเอี้ยงหงอน/ <i>Acridotheres grandis</i>	O	เมล็ดธัญพืช และผลสุกของมะขามเทศ ไทร มะละกอ
	Family Pycnonotidae		
15	นกปรอดเหลืองหัวจุก <i>Pycnonotus melanicterus</i>	O	ผลสุกของหว้า ปอลาย มะกา ข่อย ตาเสือเล็ก พุทรา และน้ำหวานของดอกทองเหลืองป่า
16	นกปรอดหัวสีเขม่า/ <i>Pycnonotus aurigaster</i>	O	ผลสุกของไทร หว้า ตะขบ อบเชย ชมพู่มะละกอ คำลิ่ง และมะม่วง
17	นกปรอดคอคลาย/ <i>Pycnonotus finlaysoni</i>	O	ผลสุกของไทร หว้า และคำลิ่ง
18	นกปรอดหน้าขาว/ <i>Pycnonotus goiavier</i>	O	ผลสุกของตะขบ ปอสา และมะม่วง
19	นกปรอดสวน/ <i>Pycnonotus blanfordi</i>	O	ผลสุกของไทร หว้า ตะขบ ชมพู่มะละกอ มะม่วง น้อยหน่า และคำลิ่ง
	Family Zosteropidae		
20	นกแว่นตาขาวสีทอง/ <i>Zosterops palpebrosus</i>	O	น้ำหวานของดอกทองเหลืองป่า และแคสตันดิสุช
	Family Sylviidae		
21	นกกระจับธรรมดา/ <i>Orthotomus sutorius</i>	O	น้ำหวานของดอกจิว และทองเหลืองป่า

ตารางที่ 1 รายชื่อนกที่กินพืชเป็นอาหารและชนิดของพืชอาหารนก (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อสามัญ/ ชื่อวิทยาศาสตร์	ลักษณะการกิน	ชนิดของพืชอาหารนก
	Family Dicaeidae		
22	นกสีชมพูสวน/ <i>Dicaeum cruentatum</i>	F	ผลสุกของตำลึง ตะขบ มะเดื่อ ไทร กาฝาก และน้ำหวานของดอกกาฝาก
	Family Nectariniidae		
23	นกกินปลีอกเหลือง/ <i>Nectarinia jugularis</i>	O	น้ำหวานของดอกกาฝาก แคนดิสุข สัก
	Family Estrildidae		
24	นกกระติ๊ดขี้หมู/ <i>Lonchura punctulata</i>	O	เมล็ดธัญพืชต่างๆ เมล็ดข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว

ลักษณะการกินอาหาร : F = นกที่กินพืชเป็นอาหารหลัก

O = นกที่กินทั้งพืชและสัตว์