

การวิจัยแบบบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โดยใช้แนวคิดความต้องการด้านจิตวิญญาณของ Taylor (2006) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย อายุ 20-59 ปี โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จำนวน 120 คน ที่มารับการรักษาแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์มหาชิราลงกรณ์ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีและอโรคยาศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน แบบสอบถามความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย และ แบบวัดการรับรู้ความรุนแรงของอาการ แบบสอบถามมีค่าเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .96, .93, .94 และ .91 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย มีความต้องการด้านจิตวิญญาณในระดับน้อย ($\bar{X} = 2.21$, $SD = 0.40$)
2. ระยะเวลาของการเจ็บป่วย การรับรู้ความรุนแรงของอาการ การเข้าร่วมในการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กับความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$, $r = .68$, $.63$ และ $.38$ ตามลำดับ)
3. ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลางกับความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$, $r = -.51$ และ $-.30$ ตามลำดับ)

5077569036 : MAJOR NURSING SCIENCE

KEYWORDS: TERMINAL CANCER PATIENTS / SPIRITUAL NEEDS / PARTICIPATION
IN THE RELIGIOUS CEREMONIES / DURATION OF ILLNESS / FAMILY
RELATIONSHIPS / SEVERITY OF SYMPTOMS / ABILITY TO PERFORM ROUTINE

THIWARIN WATTHANAWATTHU: FACTORS RELATED TO SPIRITUAL
NEEDS AMONG TERMINAL CANCER PATIENTS. THESIS ADVISOR:
ASSOC.PROF. SUREEPORN THANASILP,D.N.S., 119 pp.

The purpose of this descriptive research was to examine factors that related to the spiritual needs of terminal cancer patients. A conceptual framework used in this study was the Spiritual Needs of Taylor Model (2006). A simple random sampling was applied to receive 120 terminal cancer patients, aged 20-59 years. They were treated in Chulalongkorn Hospital, the Great Center of Mahavatchilalogkorn Tayburi, Pathumthani province and Arokayasarn Wat Kumpramong, Sakon Nakhon Province. Four questionnaires were used to collect data; Family Relationships, Intuitive Ability to Perform Routine, Spiritual Needs of Terminal Cancer Patients, and Perception of the Symptoms Severity Questionnaires. They demonstrated acceptable reliability with Cronbach's alphas at .96, .93, .94, and .91, respectively. Statistical technique used in data analysis were mean, standard deviation and Pearson's Product-Moment correlation.

The research results were as follows:

1. Spiritual needs of terminal cancer patients was at minimum level ($\bar{X} = 2.21$, $SD = 0.4$).
2. The duration of illness, perception of the symptom severity, and participation in religious ritual were significantly positive related to the spiritual needs of terminal cancer patients at the moderate level ($p < .05$, $r = .68$, $.63$ and $.38$, respectively).
3. Ability to perform routine and family relationships were significantly negative related to the spiritual needs of terminal cancer patients at the moderate level ($p < .05$, $r = -.51$ and $-.30$, respectively).