

## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

#### สรุปผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ (correlational descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ มารดาของเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลัน อายุ 1 เดือน – 5 ปี ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 85 ราย และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม จำนวน 30 ราย โรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต และโรงพยาบาลแขวงจำปาสัก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2554

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลสำหรับมารดา คือ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของมารดาและเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลัน แบบประเมินการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลของเชปปี้ (Scheppl, 1995) แปลเป็นภาษาไทยด้วยวิธีย้อนกลับโดย ฉิชกานต์ ไชยชนะและคณะ (2546) นำไปทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .89 แบบสอบถามความรุนแรงของการเจ็บป่วยของเด็กตามการรับรู้ของบิดามารดา ของ ไกรวรร กาทันท์และคณะ (2553) และแบบสอบถามความรู้ของมารดาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของเด็กเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (content validity index: [CVI]) เท่ากับ .94 และหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีคูเดอร์ริชาร์ดสัน 20 (KR-20) เท่ากับ .79 2) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลสำหรับพยาบาล คือ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาล และแบบสอบถามความคิดเห็นของพยาบาลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยนำมาจากแบบประเมินการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลของฉิชกานต์ ไชยชนะ และคณะ (2546) และได้ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน

### ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. มารดาทุกรายมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลัน โดย ร้อยละ 61.2 มีส่วนร่วมในการดูแลเด็กเจ็บป่วยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันรายด้านพบว่า มารดาร้อยละ 96.5 มีส่วนร่วมด้านกิจกรรมที่ทำประจำอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 58.8 มีส่วนร่วมด้านกิจกรรมการพยาบาล และร้อยละ 68.2 มีส่วนร่วมด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ในระดับมาก แต่ร้อยละ 50.6 มีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ อยู่ในระดับน้อย และร้อยละ 4.7 ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

2. การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับปานกลางกับความรุนแรงของโรคตามการรับรู้ของมารดา ( $r = .419, p < .01$ ) และมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับต่ำกับความรู้ของมารดาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเฉียบพลันของเด็ก ( $r = .225, p < .05$ ) แต่ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p > .05$ ) กับความคิดเห็นของพยาบาลต่อการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลัน

### ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1. ด้านปฏิบัติการพยาบาล สามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลัน และเป็นแนวทางในการประเมินการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันให้กับบุคลากรพยาบาล

2. ด้านการศึกษา สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนทางการพยาบาล โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลัน เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลนำไปใช้ในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

3. ด้านการวิจัย ผลการวิจัยในครั้งนี้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลัน

### ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

1. การศึกษาการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในประเด็นอื่นๆ ได้แก่ ศึกษาในโรงพยาบาลระดับศูนย์กลาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมของมารดาเด็กเล็กและเด็กโต และศึกษาการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กเจ็บป่วยตามการรับรู้ของมารดาและบุคลากรพยาบาล
2. การศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ด้านสัมพันธภาพและการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรพยาบาลกับมารดา
3. พัฒนาแบบประเมินการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว