



ภาคผนวก ก


ในการทดลองด้วย GC-MS ได้ทำการทดลองเพิ่มเติมโดยวัดตัวอย่างกระเทียมจาก 5 แหล่งปลูก ได้แก่ ศรีสะเกษ 2 แหล่งปลูก เชียงใหม่ ลำพูน และอุดรดิตถ์ แต่ละแหล่งปลูกวัดซ้ำ 3 ตัวอย่าง ๆ ละ 2 ครั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ GC-MS โดยใช้เงื่อนไขการวัดดังอธิบายในบทที่ 3 ในที่นี้ขอแสดงเพียงแค่อิออนโครมาโตแกรมเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป




รูปที่ ก.1 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากศรีสะเกษตัวอย่างที่ 1 ครั้งที่ 1




รูปที่ ก.2 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากศรีสะเกษตัวอย่างที่ 1 ครั้งที่ 2




รูปที่ ก.3 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากศรีสะเกษตัวอย่างที่ 2 ครั้งที่ 1




รูปที่ ก.4 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากศรีสะเกษตัวอย่างที่ 2 ครั้งที่ 2




รูปที่ ก.5 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากศรีสะเกษตัวอย่างที่ 3 ครั้งที่ 1




รูปที่ ก.6 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากศรีสะเกษตัวอย่างที่ 3 ครั้งที่ 2




รูปที่ ก.7 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากศรีสะเกษแหล่งปลูกที่ 2 ตัวอย่างที่ 1 ครั้งที่ 1




รูปที่ ก.8 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากศรีสะเกษแหล่งปลูกที่ 2 ตัวอย่างที่ 1 ครั้งที่ 2




รูปที่ ก.9 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากศรีสะเกษแหล่งปลูกที่ 2 ตัวอย่างที่ 2 ครั้งที่ 1




รูปที่ ก.10 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากศรีสะเกษแหล่งปลูกที่ 2
ตัวอย่างที่ 2 ครั้งที่ 2




รูปที่ ก.11 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากศรีสะเกษแหล่งปลูกที่ 2
ตัวอย่างที่ 3 ครั้งที่ 1




รูปที่ ก.12 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากศรีสะเกษแหล่งปลูกที่ 2
ตัวอย่างที่ 3 ครั้งที่ 2




รูปที่ ก.13 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากเชียงใหม่ตัวอย่างที่ 1 ครั้งที่ 1




รูปที่ ก.14 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากเชียงใหม่ตัวอย่างที่ 1 ครั้งที่ 2




รูปที่ ก.15 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากเชียงใหม่ตัวอย่างที่ 2 ครั้งที่ 1




รูปที่ ก.16 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากเชียงใหม่ตัวอย่างที่ 2 ครั้งที่ 2




รูปที่ ก.17 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากเชียงใหม่ตัวอย่างที่ 3 ครั้งที่ 1




รูปที่ ก.18 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากเชียงใหม่ตัวอย่างที่ 3 ครั้งที่ 2




รูปที่ ก.19 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากลำพูนตัวอย่างที่ 1 ครั้งที่ 1




รูปที่ ก.20 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากลำพูนตัวอย่างที่ 1 ครั้งที่ 2




รูปที่ ก.21 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากลำพูนตัวอย่างที่ 2 ครั้งที่ 1




รูปที่ ก.22 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากลำพูนตัวอย่างที่ 2 ครั้งที่ 2




รูปที่ ก.23 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากลำพูนตัวอย่างที่ 3 ครั้งที่ 1




รูปที่ ก.24 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากลำพูนตัวอย่างที่ 3 ครั้งที่ 2




รูปที่ ก.25 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากอุตรดิตถ์ตัวอย่างที่ 1 ครั้งที่ 1




รูปที่ ก.26 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากอุตรดิตถ์ตัวอย่างที่ 1 ครั้งที่ 2




รูปที่ ก.27 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากอูตรดิตถ์ตัวอย่างที่ 2 ครั้งที่ 1



รูปที่ ก.28 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากอูตรดิตถ์ตัวอย่างที่ 2 ครั้งที่ 2



รูปที่ ก.29 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากอุตรดิตถ์ตัวอย่างที่ 3 ครั้งที่ 1



รูปที่ ก.30 ไอออนโครมาโตแกรมของตัวอย่างกระเทียมจากอุตรดิตถ์ตัวอย่างที่ 3 ครั้งที่ 2