

ภาคผนวก

ตารางภาคผนวกที่ 1 จำนวนใบของเอื้องเงินหลวงจากอาหารสูตร SM ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร
12 สูตร

จำนวนใบ	สูตรอาหาร											
ต้นที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4.00	3.00	6.00	3.00	5.00	5.00	3.00	4.00	3.00	4.00	5.00	4.00
2	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00
3	5.00	4.00	5.00	2.00	3.00	5.00	5.00	4.00	3.00	5.00	4.00	5.00
4	4.00	5.00	6.00	4.00	3.00	5.00	3.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00
5	3.00	3.00	5.00	3.00	6.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	5.00	4.00
6	4.00	4.00	5.00	3.00	4.00	4.00	3.00	2.00	3.00	4.00	5.00	4.00
7	3.00	3.00	5.00	4.00	2.00	4.00	4.00	3.00	5.00	2.00	5.00	4.00
8	5.00	3.00	5.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	4.00	4.00
9	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00
10	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	3.00	1.00	5.00	4.00
เฉลี่ย	3.60	3.40	4.90	3.40	3.60	4.30	3.80	3.70	3.50	3.40	4.60	4.00

ตารางภาคผนวกที่ 2 จำนวนใบของเอื้องเงินหลวงจากอาหารสูตร LM1 ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร
12 สูตร

จำนวนใบ	สูตรอาหาร											
ต้นที่	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2.00	3.00	4.00	3.00	5.00	4.00	4.00	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00
2	2.00	4.00	2.00	3.00	4.00	4.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	3.00
3	1.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	4.00
4	2.00	4.00	3.00	3.00	2.00	4.00	4.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00
5	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	4.00	1.00	3.00	3.00
6	1.00	3.00	4.00	3.00	2.00	4.00	3.00	1.00	3.00	2.00	2.00	3.00
7	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00
8	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	3.00	2.00	4.00
9	1.00	4.00	3.00	3.00	2.00	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00
10	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00
เฉลี่ย	1.70	3.40	2.80	3.00	3.10	3.60	2.90	1.50	2.20	2.10	2.20	3.20

ตารางภาคผนวกที่ 3 จำนวนใบของเอื้องเงินหลวงจากอาหารสูตร LM2 ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร
12 สูตร

จำนวนใบ	สูตรอาหาร											
ต้นที่	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	4.00	6.00	4.00	3.00	5.00	3.00	5.00	2.00	4.00	5.00	4.00	4.00
2	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	3.00	4.00	3.00	5.00
3	4.00	2.00	4.00	6.00	5.00	3.00	2.00	2.00	4.00	3.00	1.00	4.00
4	4.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	4.00	4.00	1.00
5	4.00	6.00	2.00	3.00	5.00	2.00	2.00	2.00	4.00	5.00	3.00	2.00
6	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	2.00	5.00	5.00	1.00	5.00	1.00	4.00
7	4.00	2.00	4.00	3.00	5.00	1.00	4.00	2.00	3.00	4.00	4.00	5.00
8	4.00	3.00	4.00	4.00	1.00	3.00	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	1.00
9	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	5.00	1.00	4.00	1.00	2.00
10	4.00	2.00	2.00	3.00	5.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	3.00	1.00
เฉลี่ย	4.00	3.30	3.40	3.50	3.60	2.30	2.80	3.10	2.60	3.90	2.70	2.90

ตารางภาคผนวกที่ 4 ความยาวใบของเอื้องเงินหลวงจากอาหารสูตร SM ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร
12 สูตร

ความยาวใบ	สูตรอาหาร											
ต้นที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5.85	5.93	5.90	4.37	6.64	5.20	8.43	5.13	7.17	7.08	7.08	4.83
2	6.35	5.80	5.48	5.26	6.60	5.06	7.18	4.75	6.83	9.00	5.42	5.23
3	4.22	6.73	4.96	5.80	6.83	4.70	5.80	3.10	4.13	6.60	7.50	6.34
4	3.43	6.08	4.55	5.35	5.37	4.44	7.07	3.63	3.55	5.84	7.68	6.08
5	6.23	3.07	6.00	4.83	6.60	4.73	5.38	2.73	6.78	6.90	6.80	4.68
6	2.23	4.35	5.38	6.47	5.25	3.78	4.40	2.75	4.57	5.45	7.08	3.70
7	2.87	3.40	5.42	3.15	7.60	4.75	5.80	5.07	4.92	8.70	5.42	4.28
8	2.38	3.37	5.42	4.93	4.80	4.85	5.10	4.33	5.05	5.30	7.50	3.95
9	2.80	3.07	4.67	2.75	3.15	3.57	4.63	2.25	6.00	4.87	7.68	2.90
10	3.25	2.60	3.58	3.53	4.80	3.60	4.13	2.40	3.93	7.00	6.86	3.50
เฉลี่ย	3.96	4.44	5.14	4.64	5.76	4.47	5.79	3.61	5.29	6.67	6.90	4.55

ตารางภาคผนวกที่ 5 ความยาวใบของเอื้องเงินหลวงจากอาหารสูตร LM1 ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร
12 สูตร

ความยาวใบ	สูตรอาหาร											
ต้นที่	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1.55	3.73	4.95	3.17	8.24	6.35	4.23	3.35	5.95	5.33	2.37	5.77
2	1.65	4.45	4.85	1.73	4.73	4.58	3.45	2.10	4.20	5.00	3.25	4.37
3	.50	5.03	2.93	1.33	4.90	4.13	4.83	3.35	2.50	3.00	2.75	2.08
4	1.55	2.98	4.90	1.80	2.80	3.43	4.28	2.10	3.00	1.05	3.00	2.13
5	1.65	3.35	1.90	1.50	4.33	2.83	3.45	3.35	5.95	1.50	2.10	2.77
6	.50	3.30	4.95	3.17	2.75	6.35	4.83	2.10	4.20	2.50	3.25	5.77
7	1.55	2.41	4.85	1.73	4.73	4.58	4.28	3.35	2.50	2.65	2.75	4.37
8	1.65	3.73	2.93	1.33	4.90	4.13	3.45	2.10	3.00	3.00	3.00	2.08
9	.50	3.35	4.90	1.80	2.80	3.43	4.83	3.35	4.20	2.50	2.75	2.13
10	1.55	3.30	1.90	1.50	4.33	2.83	3.45	2.10	3.00	2.65	3.00	2.77
เฉลี่ย	1.27	3.59	3.91	1.91	4.45	4.26	4.11	2.73	3.85	2.92	2.82	3.42

ตารางภาคผนวกที่ 6 ความยาวใบของเอื้องเงินหลวงจากอาหารสูตร LM2 ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร
12 สูตร

ความยาวใบ	สูตรอาหาร											
ต้นที่	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	5.23	8.27	5.28	5.00	4.74	6.23	7.06	2.00	7.58	5.46	6.20	5.68
2	5.53	6.83	5.28	5.10	2.50	4.78	6.28	6.30	3.03	4.10	3.37	5.48
3	5.53	3.75	6.50	7.00	1.14	3.07	5.00	3.35	3.00	4.60	2.50	5.18
4	5.23	2.33	4.83	4.43	1.80	4.50	3.00	3.57	7.00	1.68	7.03	3.80
5	5.23	8.27	2.25	3.90	4.74	2.40	1.90	2.00	7.58	9.65	3.37	2.50
6	5.53	6.83	5.28	3.75	2.50	3.00	7.06	6.30	3.50	5.46	2.50	5.68
7	5.53	3.75	5.28	4.43	1.14	2.10	6.28	3.35	3.03	4.10	7.03	5.48
8	5.15	2.47	6.50	3.75	1.80	3.07	5.00	3.57	3.00	4.60	3.37	3.80
9	5.53	6.83	4.83	3.90	2.50	2.40	3.00	6.30	7.00	1.68	2.50	1.75
10	5.23	3.75	2.25	5.10	1.14	3.00	1.90	3.35	3.50	9.65	3.37	3.80
เฉลี่ย	5.37	5.31	4.83	4.64	2.40	3.46	4.65	4.01	4.82	5.10	4.12	4.32

ตารางภาคผนวกที่ 7 ความกว้างใบของเอื้องเงินหลวงจากอาหารสูตร SM ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร
12 สูตร

ความกว้างใบ	สูตรอาหาร											
ต้นที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	.63	.87	.92	.30	.64	.42	.47	.43	.57	.55	.52	.43
2	.43	.70	.50	.44	.53	.34	.50	.45	.38	.58	.62	.43
3	.44	.65	.48	.35	.93	.38	.50	.43	.40	.58	.55	.46
4	.40	.52	.43	.35	.67	.36	.50	.35	.45	.46	.55	.45
5	.40	.70	.50	.40	.58	.38	.25	.43	.35	.48	.64	.38
6	.33	.43	.38	.50	.65	.38	.53	.45	.33	.33	.52	.33
7	.43	.37	.38	.30	.70	.40	.45	.50	.44	.45	.62	.45
8	.28	.50	.38	.40	.50	.35	.38	.50	.45	.45	.55	.28
9	.40	.50	1.27	.35	.55	.30	.28	.25	.33	.33	.55	.47
10	.40	.70	.38	.35	.33	.25	.28	.28	.30	.50	.64	.43
เฉลี่ย	.41	.59	.56	.37	.61	.36	.41	.41	.40	.47	.58	.41

ตารางภาคผนวกที่ 8 ความกว้างใบของเอื้องเงินหลวงจากอาหารสูตร LM1 ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร
12 สูตร

ความกว้างใบ	สูตรอาหาร											
ต้นที่	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	.35	1.27	.45	.30	.72	.73	.40	.60	.50	.37	.27	.90
2	1.35	.38	.50	.23	.33	.55	.35	.30	.27	.50	.40	.50
3	.20	.50	.60	.23	.53	.03	.37	.60	.30	.33	.60	.23
4	.35	.38	.50	.30	.45	.38	.40	.30	.50	.25	.30	.23
5	1.35	.38	.35	.30	.33	.47	.35	.60	.50	.20	.20	.23
6	.20	.40	.45	.30	.65	.73	.37	.30	.27	.30	.40	.90
7	.35	.33	.50	.23	.33	.55	.40	.60	.30	.45	.60	.50
8	.35	.38	.60	.23	.53	.03	.35	.30	.50	.33	.30	.23
9	.20	.38	.50	.30	.45	.38	.37	.60	.27	.30	.60	.23
10	.35	.40	.35	.30	.37	.47	.35	.30	.50	.45	.30	.23
เฉลี่ย	.51	.48	.48	.27	.47	.43	.37	.45	.39	.35	.40	.42

ตารางผนวกที่ 9 ความกว้างใบของเอื้องเงินหลวงจากอาหารสูตร LM2 ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร
12 สูตร

ความกว้างใบ	สูตรอาหาร											
ต้นที่	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	.50	.80	.68	.57	.32	.87	.70	.35	.85	.54	.40	.65
2	.55	.63	.68	.43	.37	.63	.53	.56	.77	.48	.50	.54
3	.55	.55	.48	.65	.22	.60	.45	.60	.30	.53	.30	.58
4	.50	.47	.57	.43	.20	.40	1.00	.30	.50	.23	.55	.60
5	.50	.80	.30	.40	.32	.55	.35	.35	.85	.50	.50	.40
6	.55	.63	.68	.28	.37	.50	.70	.56	.60	.54	.30	.65
7	.55	.55	.68	.40	.22	.20	.53	.60	.77	.48	.55	.54
8	.50	.47	.48	.30	.20	.60	.45	.30	.30	.53	.50	.60
9	.55	.63	.57	.33	.37	.55	1.00	.56	.50	.23	.30	.35
10	.50	.55	.30	.33	.22	.50	.35	.60	.60	.50	.50	.60
เฉลี่ย	.53	.61	.54	.41	.28	.54	.61	.48	.60	.46	.44	.55

ตารางผนวกที่ 10 จำนวนรากของเอื้องเงินหลวงจากอาหารสูตร SM ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร
12 สูตร

จำนวนราก	สูตรอาหาร											
ต้นที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4.00	10.0	9.00	4.00	8.00	7.00	14.0	6.00	8.00	6.00	13.0	7.00
2	12.0	9.00	9.00	12.0	7.00	7.00	14.0	8.00	5.00	14.0	9.00	6.00
3	11.0	10.0	9.00	12.0	12.0	10.0	9.00	7.00	6.00	12.0	11.0	9.00
4	10.0	8.00	8.00	9.00	3.00	5.00	10.0	10.0	5.00	8.00	11.0	8.00
5	8.00	4.00	5.00	5.00	9.00	5.00	10.0	3.00	9.00	8.00	11.0	10.0
6	5.00	4.00	6.00	7.00	6.00	4.00	9.00	3.00	6.00	6.00	13.0	4.00
7	7.00	4.00	6.00	4.00	8.00	5.00	10.0	7.00	5.00	8.00	9.00	9.00
8	5.00	4.00	8.00	10.0	2.00	8.00	6.00	8.00	7.00	8.00	11.0	6.00
9	7.00	6.00	4.00	2.00	6.00	4.00	6.00	2.00	6.00	8.00	11.0	4.00
10	7.00	2.00	3.00	10.0	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	11.0	6.00
เฉลี่ย	7.60	6.10	6.70	7.50	6.60	6.00	9.30	5.90	6.20	8.60	11.0	6.90

ตารางภาคผนวกที่ 11 จำนวนรากของเอื้องเงินหลวงจากอาหารสูตร LM1 ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร
12 สูตร

จำนวนราก	สูตรอาหาร											
ต้นที่	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1.00	6.00	6.00	6.00	11.00	7.00	5.00	5.00	6.00	5.00	4.00	5.00
2	1.00	7.00	6.00	3.00	4.00	8.00	5.00	7.00	3.00	4.00	7.00	2.00
3	3.00	7.00	1.00	6.00	3.00	3.00	6.00	5.00	3.00	6.00	2.00	5.00
4	1.00	3.00	7.00	5.00	5.00	3.00	5.00	7.00	6.00	4.00	4.00	3.00
5	1.00	3.00	3.00	2.00	7.00	4.00	5.00	5.00	6.00	2.00	4.00	3.00
6	3.00	5.00	6.00	6.00	3.00	7.00	6.00	7.00	3.00	5.00	7.00	5.00
7	1.00	3.00	6.00	3.00	4.00	8.00	5.00	5.00	3.00	2.00	2.00	2.00
8	1.00	6.00	1.00	6.00	3.00	3.00	5.00	7.00	6.00	6.00	4.00	5.00
9	3.00	3.00	7.00	5.00	5.00	3.00	6.00	5.00	3.00	5.00	2.00	3.00
10	1.00	5.00	3.00	2.00	7.00	4.00	5.00	7.00	6.00	2.00	4.00	3.00
เฉลี่ย	1.60	4.80	4.60	4.40	5.20	5.00	5.30	6.00	4.50	4.10	4.00	3.60

ตารางภาคผนวกที่ 12 จำนวนรากของเอื้องเงินหลวงจากอาหารสูตร LM2 ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร
12 สูตร

จำนวนราก	สูตรอาหาร											
ต้นที่	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	9.00	6.00	4.00	6.00	8.00	10.0	10.0	6.00	12.0	10.0	9.00	6.00
2	9.00	4.00	4.00	3.00	5.00	6.00	10.0	4.00	7.00	6.00	3.00	9.00
3	9.00	6.00	4.00	12.0	3.00	2.00	10.0	5.00	4.00	2.00	3.00	11.0
4	9.00	7.00	6.00	4.00	2.00	6.00	13.0	4.00	7.00	2.00	9.00	7.00
5	9.00	6.00	6.00	3.00	8.00	6.00	5.00	6.00	5.00	9.00	3.00	3.00
6	9.00	4.00	4.00	4.00	5.00	2.00	10.0	4.00	12.0	10.0	3.00	4.00
7	9.00	6.00	4.00	7.00	3.00	3.00	9.00	5.00	7.00	6.00	9.00	6.00
8	9.00	7.00	4.00	4.00	2.00	2.00	10.0	4.00	4.00	2.00	3.00	11.0
9	9.00	4.00	6.00	3.00	5.00	6.00	13.0	4.00	7.00	9.00	3.00	7.00
10	9.00	6.00	6.00	3.00	3.00	2.00	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00	3.00
เฉลี่ย	9.00	5.60	4.80	4.90	4.40	4.50	9.50	4.70	7.00	5.80	4.80	6.70

ตารางภาคผนวกที่ 13 ความยาวรากของเอื้องเงินหลวงจากอาหารสูตร SM ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร
12 สูตร

ความยาวราก	สูตรอาหาร											
ดัชนีที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	7.10	5.02	4.21	.63	6.38	2.33	.54	3.26	3.65	5.23	5.92	4.67
2	1.84	4.42	3.58	.90	5.10	3.27	.65	1.76	4.96	3.74	4.68	3.60
3	1.67	5.08	5.52	.62	4.08	2.23	1.98	3.34	5.57	2.67	4.78	2.99
4	.76	4.51	8.56	.71	2.17	3.96	1.30	2.84	4.66	2.58	2.58	3.54
5	.50	4.28	7.12	.52	6.62	3.78	.56	.80	3.67	2.04	6.20	2.36
6	1.96	1.43	7.63	.84	7.15	4.13	3.11	1.23	5.18	2.42	5.93	3.10
7	.33	2.20	4.97	.53	9.61	3.88	1.49	3.84	5.22	1.64	4.68	3.09
8	2.08	4.23	1.43	.64	2.75	3.53	1.02	4.55	4.96	1.38	4.78	4.45
9	5.76	5.52	1.93	.25	6.75	2.98	.65	3.95	4.25	.51	2.58	1.18
10	.60	1.65	2.50	.49	5.26	2.46	.50	1.22	3.44	1.15	6.20	4.22
เฉลี่ย	2.26	3.83	4.75	.61	5.59	3.26	1.18	2.68	4.56	2.34	4.83	3.32

ตารางภาคผนวกที่ 14 ความยาวรากของเอื้องเงินหลวงจากอาหารสูตร LM1 ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร
12 สูตร

ความยาวราก	สูตรอาหาร											
ดัชนีที่	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	.20	2.67	1.88	2.52	5.00	4.00	3.70	4.84	3.08	3.56	1.58	4.10
2	.80	1.64	6.12	.97	5.70	3.10	5.46	5.50	1.90	4.58	6.02	3.05
3	.67	1.61	5.30	.83	1.73	4.03	3.27	4.84	3.03	4.02	1.00	1.86
4	.20	1.83	5.04	1.18	5.10	.47	3.70	5.50	4.60	2.78	5.18	1.33
5	.80	2.50	3.47	.45	4.14	1.50	5.46	4.84	3.08	2.60	1.58	.80
6	.67	1.98	1.88	2.52	10.8	3.69	3.27	5.50	1.90	4.20	6.02	4.10
7	.20	1.97	6.12	.97	5.70	3.10	3.70	4.84	3.03	1.20	1.00	3.05
8	.80	2.67	5.30	.83	1.73	4.03	5.46	5.50	4.60	4.02	5.18	1.86
9	.67	2.50	5.04	1.18	5.10	.47	3.27	4.84	1.90	4.20	1.00	1.33
10	.20	1.98	3.47	.45	4.14	1.50	5.46	5.50	4.60	1.20	5.18	.80
เฉลี่ย	.52	2.14	4.36	1.19	4.92	2.59	4.28	5.17	3.17	3.24	3.37	2.23

ตารางภาคผนวกที่ 15 ความยาวรากของเอียงเงินหลวงจากอาหารสูตร LM2 ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร
12 สูตร

ความยาวราก	สูตรอาหาร											
ต้นที่	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	.78	6.42	3.80	5.50	1.65	4.59	4.50	3.85	4.92	3.90	2.73	6.02
2	1.17	1.55	3.80	3.50	2.28	4.67	3.63	3.83	10.1	2.75	1.70	2.82
3	1.17	9.90	2.58	7.71	1.63	1.20	13.0	4.84	.50	2.85	3.30	2.04
4	.78	2.94	8.50	5.56	1.50	6.18	6.75	1.73	.91	4.30	2.73	4.46
5	.78	6.42	2.43	2.53	1.65	6.15	10.4	4.40	3.48	8.10	2.80	3.70
6	1.17	1.55	3.80	3.35	2.28	.65	4.50	3.83	4.92	3.90	3.30	4.35
7	1.17	9.90	3.80	5.56	1.63	4.43	3.63	4.84	10.1	2.75	2.73	6.02
8	.78	2.94	2.58	3.35	1.80	1.20	13.0	1.73	.50	4.30	1.70	2.04
9	1.17	1.55	8.50	2.53	2.23	6.15	6.75	3.83	.91	8.10	3.30	4.46
10	.78	9.90	2.43	3.50	1.63	.65	10.4	4.84	3.48	2.85	1.70	3.70
เฉลี่ย	.98	5.31	4.22	4.31	1.83	3.59	7.66	3.77	3.99	4.38		

ตารางภาคผนวกที่ 16 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Anova) จำนวนใบของเอื้องเงินหลวงจากอาหารสูตร SM LM1 และ LM2 ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร 12 สูตร

สูตร	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
1.00	10	3.6000	1.07497	.33993	2.8310	4.3690	2.00	5.00
2.00	10	3.4000	.84327	.26667	2.7968	4.0032	2.00	5.00
3.00	10	4.9000	.87560	.27689	4.2736	5.5264	3.00	6.00
4.00	10	3.4000	.96609	.30551	2.7089	4.0911	2.00	5.00
5.00	10	3.6000	1.26491	.40000	2.6951	4.5049	2.00	6.00
6.00	10	4.3000	.67495	.21344	3.8172	4.7828	3.00	5.00
7.00	10	3.8000	.63246	.20000	3.3476	4.2524	3.00	5.00
8.00	10	3.7000	.82327	.26034	3.1111	4.2889	2.00	5.00
9.00	10	3.5000	.84984	.26874	2.8921	4.1079	2.00	5.00
10.00	10	3.4000	1.34990	.42687	2.4343	4.3657	1.00	5.00
11.00	10	4.6000	.51640	.16330	4.2306	4.9694	4.00	5.00
12.00	10	4.0000	.47140	.14907	3.6628	4.3372	3.00	5.00
13.00	10	1.7000	.48305	.15275	1.3544	2.0456	1.00	2.00
14.00	10	3.4000	.51640	.16330	3.0306	3.7694	3.00	4.00
15.00	10	2.8000	.78881	.24944	2.2357	3.3643	2.00	4.00
16.00	10	3.0000	.66667	.21082	2.5231	3.4769	2.00	4.00
17.00	10	3.1000	.99443	.31447	2.3886	3.8114	2.00	5.00
18.00	10	3.6000	.51640	.16330	3.2306	3.9694	3.00	4.00
19.00	10	2.9000	.87560	.27689	2.2736	3.5264	2.00	4.00
20.00	10	1.5000	.52705	.16667	1.1230	1.8770	1.00	2.00
21.00	10	2.2000	1.31656	.41633	1.2582	3.1418	1.00	4.00
22.00	10	2.1000	.73786	.23333	1.5722	2.6278	1.00	3.00
23.00	10	2.2000	.42164	.13333	1.8984	2.5016	2.00	3.00
24.00	10	3.2000	.42164	.13333	2.8984	3.5016	3.00	4.00
25.00	10	4.0000	.00000	.00000	4.0000	4.0000	4.00	4.00
26.00	10	3.3000	1.49443	.47258	2.2309	4.3691	2.00	6.00
27.00	10	3.4000	.84327	.26667	2.7968	4.0032	2.00	4.00
28.00	10	3.5000	.97183	.30732	2.8048	4.1952	3.00	6.00
29.00	10	3.6000	1.64655	.52068	2.4221	4.7779	1.00	5.00
30.00	10	2.3000	.94868	.30000	1.6214	2.9786	1.00	4.00
31.00	10	2.8000	1.54919	.48990	1.6918	3.9082	1.00	5.00
32.00	10	3.1000	1.37032	.43333	2.1197	4.0803	2.00	5.00
33.00	10	2.6000	1.42984	.45216	1.5772	3.6228	1.00	4.00
34.00	10	3.9000	.99443	.31447	3.1886	4.6114	2.00	5.00
35.00	10	2.7000	1.25167	.39581	1.8046	3.5954	1.00	4.00
36.00	10	2.9000	1.66333	.52599	1.7101	4.0899	1.00	5.00
Total	360	3.2222	1.19914	.06320	3.0979	3.3465	1.00	6.00

ตารางภาคผนวกที่ 17 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของจำนวนใบของเอื้อง
เงินหลวงจากการเพาะเลี้ยงในอาหาร 12 สูตร เป็นเวลา 11 เดือน

Source of Variation	SS	df	MS	F	Sig.
Between Groups	197.822	35	5.652	5.751	.000
Within Groups	318.400	324	.983		
Total	516.222	359			