

อดิฉัน หนิมนั 2549: การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับการตรวจแยกเชื้อ
เลปโตสไปรา โดยใช้ยีนที่สร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พันธุวิศวกรรม) สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม โครงการ
สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิริวรรณ พรพวงษ์, Ph.D. 97 หน้า
ISBN 974-16-2605-3

เทคนิคพีซีอาร์ (PCR; polymerase chain reaction) เป็นเทคนิคทางชีวโมเลกุลที่ใช้ในการตรวจแยกเชื้อเลปโตสไปราชนิดก่อโรคและไม่ก่อโรค เนื่องจากมีความแม่นยำ และรวดเร็ว ปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ในระดับซีโรวาร์ การศึกษาครั้งนี้จึงได้นำเทคนิคพีซีอาร์มาพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลชนิดใหม่ เพื่อให้แยกความแตกต่างได้ในระดับซีโรวาร์ โดยใช้ยีนที่ได้รับการทำนายว่าเป็นรหัสสำหรับสร้างโปรตีนที่มีส่วนของ leucine rich repeat (LRR) ของเชื้อ *Leptospira interrogans* ซีโรกรุ๊ป *Icterohaemorrhagiae* ซีโรวาร์ Lai ซึ่งสามารถจัดกลุ่มยีนได้ 5 กลุ่ม และออกแบบไพรเมอร์ได้ 3 กลุ่ม โดยผลการทดสอบสามารถคัดเลือกไพรเมอร์กลุ่มที่ 1 และไพรเมอร์กลุ่มที่ 3 มาตรวจสอบผลผลิตพีซีอาร์เพื่อสร้างเครื่องหมายโมเลกุล ด้วยเทคนิค capillary electrophoresis (CE) และโปรแกรม GeneScan[®] 2.1 analysis พบว่าผลผลิตพีซีอาร์จากไพรเมอร์กลุ่มที่ 3 ให้เครื่องหมายโมเลกุลหลากหลายมากกว่าไพรเมอร์กลุ่มที่ 1 และความหลากหลายของเครื่องหมายโมเลกุลของไพรเมอร์กลุ่มที่ 3 สามารถจำแนกเชื้อเลปโตสไปราในกลุ่มก่อโรคในระดับซีโรวาร์ได้ ผลจากการทดลองนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาไปสู่การศึกษาหน้าที่ของโปรตีนที่มีส่วน LRR ของเชื้อเลปโตสไปรา และใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษากลไกการเกิดโรค หรือการจำแนกเชื้อได้ในอนาคต

อดิฉัน หนิมนั
ลายมือชื่อนิสิต



ลายมือชื่อประธานกรรมการ

18 ต.ค. 2549