

บทที่ 4

ผลการศึกษา

ผลการสำรวจความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างวิมานลอยในเขาชอนเคือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปรากฏว่าพบผีเสื้อกลางวันทั้งหมด 5 วงศ์ 12 วงศ์ย่อย 26 สกุล รวมทั้งสิ้น 34 ชนิด ดังนี้

ตารางที่ 3 แสดงผีเสื้อกลางวันที่สำรวจพบ ในวงศ์ผีเสื้อหางติ่ง (Family Papilionoidae) พบ 4 สกุล 8 ชนิด ดังนี้

ลำดับ	ชนิด	วงศ์	จำนวนผีเสื้อที่พบ ในระยะเวลา 12 เดือน (ตัว)
1.	ผีเสื้อถุงทองธรรมดา (<i>Troides aeacus</i>)	วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง (Family Papilionnidae)	8
2.	ผีเสื้อถุงทองป่าสูง (<i>Troides helena</i>)		13
3.	ผีเสื้อหางคู้มจุดชมพู (<i>Pachliopta aristolochiae</i>)		20
4.	ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา (<i>Pachlio polytes</i>)		17
5.	ผีเสื้อหนอนมะนาว (<i>Pachlio demoleus malayanus</i>)		16
6.	ผีเสื้อหางติ่งนางระเวง (<i>Pachlio memnon agenor</i>)		10
7.	ผีเสื้อหางดาบลายจุด (<i>Graphium nomius swinhoi</i>)		8
8.	ผีเสื้อหางดาบลายขีด (<i>Graphium aristeus</i>)		7



ภาพที่ 45 แสดงปีกล่างของผีเสื้อถุงทองป่าสูง



ภาพที่ 46 แสดงปีกบนของผีเสื้อถุงทองป่า




ภาพที่ 47 แสดงตัวหนอนของผีเสื้อถุงทองป่าสูง

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อถุงทองป่าสูง

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Troides helena*

ลักษณะทั่วไป: ผีเสื้อสกุลถุงทองเป็นผีเสื้อที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ มักพบบินอยู่ระยะ 3 ม.ขึ้นไป น้อยครั้งที่จะพบลงมากินอาหารบนพื้นดิน อาหารของหนอนเป็นพืชพวกไม้เถา เช่น กระเช้าถุงทอง กระเช้าฝีมด กระเช้าสีดา ผีเสื้อในสกุลนี้พบในประเทศไทย 3 ชนิด คือ ผีเสื้อถุงทองป่าสูง ผีเสื้อถุงทองธรรมดา และผีเสื้อถุงทองปีกยี่สิบ ทุกชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ทั้ง ๆ ที่พบผีเสื้อถุงทองทั้งสองชนิดแรกชุกชุมมาก และสามารถเพาะเลี้ยงได้ แต่เนื่องจากการจับผีเสื้อในสกุลนี้กันมาก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จนมีแนวโน้มว่าในอนาคตอาจตกอยู่ในสถานะที่ใกล้สูญพันธุ์หรือสูญพันธุ์ได้ จึงได้กำหนดให้ผีเสื้อทุกชนิดในสกุลนี้อยู่ในกฎหมายคุ้มครอง ปีกบน พื้นปีกคู่หน้ามีสีดำคล้ายกำมะหยี่ รอบเส้นปีกมีสีขาวคล้ายเงา ปีกคู่หลังเพศผู้มีสีเหลืองตามช่องระหว่างเส้นปีกเกือบเต็มแผ่นปีกเส้นปีกมีสีดำบริเวณขอบปีกด้านข้างมีแต้มสีดำ ปีกคู่หลังของเพศเมียมีแต้มสีดำขนาดใหญ่บนสีเหลืองในแต่ละช่องปีก ปีกล่าง คล้ายปีกบน ขนาดกางปีก 14-17 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้ออุ้งทองป่าสูง



ภาพที่ 48 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้ออุ้งทองป่าสูง

ที่มา: (www.sema.go.th, วงจรชีวิตผีเสื้ออุ้งทองป่าสูง, 2552)

พืชอาหาร

1. กระเช้าอุ้งทอง


- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. กระเช้าผีเสื้อ

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย



ภาพที่ 49 แสดงปีกล่างของผีเสื้ออุงทองธรรมดา




ภาพที่ 50 แสดงปีกบนของผีเสื้ออุงทองธรรมดา

ชื่อสามัญ: ผีเสื้ออุงทองธรรมดา

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Troides aeacus*

ลักษณะทั่วไป: เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ คล้ายผีเสื้ออุงทองป่าสูง ปีกบน พื้นปีกคู่หน้ามีสีดำ คล้ายกำมะหยี่ ปีกคู่หน้าของเพศผู้มีเงาสีขาวรอบเส้นปีกเห็นได้ชัดกว่าผีเสื้ออุงทองป่าสูง แต้มสีดำที่อยู่บนสีเหลืองของปีกคู่หลังมีขนาดเล็ก และมีอยู่ในช่องปีกที่ 2-5 เท่านั้น ส่วนปีกคู่หน้าของเพศเมียมีเงาสีขาวรอบเส้นปีกน้อยกว่า เห็นไม่ชัดเจน ปีกล่าง คล้ายปีกบน ขนาดกางปีก 15-17 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้ออุ้งทองธรรมดา



ภาพที่ 51 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้ออุ้งทองธรรมดา

ที่มา: (www.sema.go.th, วงจรชีวิตผีเสื้ออุ้งทองธรรมดา, 2552)

พืชอาหาร

1. กระเช้าทอง

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. กระเช้าฝีมด

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย



ภาพที่ 52 แสดงปีกล่างของผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู




ภาพที่ 53 แสดงปีกบนของผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Pachliopta aristolochiae*

ลักษณะทั่วไป: ทั้งสองเพศคล้ายกัน ออกและท้องสีแดงอมชมพูขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หลังยื่นยาว ปีกบน พื้นปีกสีดำ กลางปีกคู่หลังมีแถบสีขาวตามช่องเส้นปีกแถบที่อยู่ใกล้ขอบปีกด้านในสีขาวอมชมพู มีจุดแต้มสีชมพูเรียงกันตามแนวขอบปีกด้านข้าง ปีกล่าง คล้ายปีกบน ขนาดกางปีก 8-11 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู



ภาพที่ 54 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู

ที่มา: (www.upload.wikimedia.org, วงจรชีวิตผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู, 2552)

พืชอาหาร

1. ชบา
 - ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
 - ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย
2. กำจัดต้น
 - ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
 - ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย
3. เขยตาย
 - ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
 - ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย



ภาพที่ 55 แสดงปีกล่างของผีเสื้อหางดิ่งธรรมดา




ภาพที่ 56 แสดงปีกบนของผีเสื้อหางดิ่งธรรมดา

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อหางดิ่งธรรมดา

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Pachlio polytes*

ลักษณะทั่วไป: ทั้งสองเพศมีขอบปีกด้านข้างบางส่วนของปีกคู่หลังที่ยื่นยาว แต่เพศผู้จะสั้นกว่า ปีกบน พื้นปีกสีดำขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หน้ามีแถบสีขาวเรียงกัน ซึ่งแตกต่างจาก ผีเสื้อหางดิ่งชะอ้อน ปีกคู่หลังของเพศผู้มีแถบสีขาวเรียงกันบริเวณกลางปีก เพศเมียมี พื้นปีกคู่หน้าเป็นสีดำจาง ๆ มองเห็นเส้นปีกชัดเจน ปีกคู่หลังมีแถบสีขาวอยู่บริเวณกลาง ปีก ต่อด้วยแถบสีชมพูจนถึงขอบปีกด้านใน ปีกล่าง คล้ายปีกบน ขนาดกางปีก 9-10 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อหางติ่งธรรมดา



ภาพที่ 57 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อหางติ่งธรรมดา

ที่มา: (www.richard-seaman.com, วงจรชีวิตผีเสื้อหางติ่งธรรมดา, 2552)

พืชอาหาร

1. กำจัดต้น

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. เขยตาย

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

3. เครือเห่า

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย
- ผล เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

4. มะนาวผี

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย



ภาพที่ 58 แสดงปีกล่างของผีเสื้อหนอนมะนาว




ภาพที่ 59 แสดงปีกบนของผีเสื้อหนอนมะนาว

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อหนอนมะนาว

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Pachlio demoleus malayanus*

ลักษณะทั่วไป: ผีเสื้อหนอนมะนาวเป็นผีเสื้อที่พบบ่อยมาก แพบจะทุกแห่ง หนอนกินพืชสกุลส้มเป็นอาหาร หนอนมีหัวซ่อนอยู่ภายในบริเวณส่วนหัว เมื่อตกใจจะยื่นหัวพร้อมกับส่งกลิ่นเหม็นออกมาจากต่อมออสมีที่บริเวณเพื่อขับไล่ศัตรู มีการผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียว แต่วางไข่ได้หลายครั้ง หลังจากการผสมพันธุ์แล้ว 1-2 วัน จึงจะวางไข่ วางเป็นฟองเดี่ยว ปีกบน พื้นปีกสีดำมีแถบและแต้มสีเหลืองครีม มุมปลายปีกหลังของปีกคู่หลังมีจุดสีแดง-ดำ ปีกล่าง พื้นปีกสีเหลืองอ่อน มีแต้มสีเหลืองเข้มและสีดำประปรายทั่วทั้งปีก ขนาดกางปีก 8-10 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อหนอนมะนาว



ภาพที่ 60 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อหนอนมะนาว

ที่มา: (www.butterflycircle.blogspot.com, วงจรชีวิตผีเสื้อหนอนมะนาว, 2552)

พืชอาหาร

1. กำจัดต้น

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. เขยตาย

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

3. มะนาว ผี


- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

4. ส่องฟ้าแดง

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย
- ผล เป็นอาหารของตัวเต็มวัย



ภาพที่ 61 แสดงปีกบนของผีเสื้อหางดิ่งนางระเว




ภาพที่ 62 แสดงปีกล่างของผีเสื้อหางดิ่งนางระเว

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อหางดิ่งนางระเว

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Pachlio memnon agenor*

ลักษณะทั่วไป: ผีเสื้อชนิดนี้ชอบหากินอยู่ตามลำห้วย ทางเดินในป่าที่มีแสงแดดส่อง หรือตามพุ่มดอกไม้ป่าและอาจพบเพศเมียได้ตามพุ่มดอกไม้เหล่านี้ ทั้งสองเพศมีพื้นปีกทั้งสองด้านสีดำ เพศผู้มีแต้มสีแดงบริเวณโคนปีกของปีกล่าง เพศเมียมีแต้มสีแดงบริเวณโคนปีกทั้งปีกบนและปีกล่าง เพศผู้มีแบบเดียว แต่เพศเมียมีความแตกต่างกันถึง 7 แบบ ปีกบน พื้นปีกสีดำ บางส่วนของปีกคู่หน้ามีสีออกเทาเล็กน้อย ปีกคู่หลังมีสีเหลืองน้ำตาลเงิน ปีกล่าง พื้นปีกสีดำ โคนปีกมีแต้มสีแดง มุมปลายปีกหลังของปีกคู่หลังมีสีแดงและแต้มสีดำ ขนาดกางปีก 12-15 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อหางติ่งนางระเวง



ภาพที่ 63 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อหางติ่งนางระเวง

ที่มา: (www.pro.corbis.com, วงจรชีวิตผีเสื้อหางติ่งนางระเวง, 2552)

พืชอาหาร

1. กำจัดต้น


- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. เขยตาย

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย
- ผล เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

3. มะนาว ผี

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย




ภาพที่ 64 แสดงปีกล่างของผีเสื้อหางดาบลายจุด

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อหางดาบลายจุด

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Graphium nomius swinhoei*

ลักษณะทั่วไป: จัดเป็นผีเสื้อที่พบเห็นได้ง่ายอีกชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะบริเวณลำธาร ปีกบน ในช่วงฤดูแล้งที่มีแดดจัดพื้นสีของปีกจะออกเป็นสีขาวอมเหลือง มีลวดลายสีน้ำตาลดำ และมีจุดสีเหลืองเรียงขนานกับขอบปีกไปตลอดความกว้างของปีกคู่หน้า เวลาเกาะนิ่งจะสังเกตเห็นลวดลายสีแดงชัดเจนที่ปีกหลัง ปีกล่าง เหมือนกับปีกด้านบน จุดสังเกตอยู่ตรงปลายของขอบปีกหน้า เกิดจากจุดต่อเชื่อมกันอันเป็นที่มาของชื่อ ลายจุด ขนาดกางปีก 8-9 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อหางดาบลายจุด



ภาพที่ 65 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อหางดาบลายจุด

ที่มา: (www.pbase.com, วงจรชีวิตผีเสื้อหางดาบลายจุด, 2552)

พืชอาหาร

1. ขางหัวหมู

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย




ภาพที่ 66 แสดงปีกบนของผีเสื้อหางดาบลายขีด

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อหางดาบลายขีด

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Graphium aristeus*

ลักษณะทั่วไป: ปีกบน คล้ายผีเสื้อหางดาบลายจุด แต่แถบสีน้ำตาลเข้มบริเวณขอบปีกด้านข้างจะหนากว่า และบนแถบสีน้ำตาลเข้มนี้ของปีกคู่หน้ามีเส้นขีดสั้น ๆ สีขาวครีมเรียงต่อกัน ส่วนผีเสื้อหางดาบลายจุดบริเวณนี้จะเป็นจุดค่อนข้างกลมเรียงกัน ปีกล่าง คล้ายปีกบนแต่แถบสีน้ำตาลจะหนากว่าปีกบน ขนาดกางปีก 7-8 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อหางดาบลายขีด



ภาพที่ 67 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อหางดาบลายขีด

ที่มา: (www.lifeinitaly.com, วงจรชีวิตผีเสื้อหางดาบลายขีด, 2552)

พืชอาหาร

1. ขางหัวหมู

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

ตารางที่ 4 แสดงผีเสื้อกลางวันที่สำรวจพบ วงศ์ผีเสื้อขาหน้าฟู (Family Nymphalidae) พบ 6 สกุล
6 ชนิดได้แก่

ลำดับ	ชนิด	วงศ์	จำนวนผีเสื้อที่พบ ในระยะเวลา 12 เดือน (ตัว)
1.	ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก (<i>Acraea violae</i>)	วงศ์ผีเสื้อขาหน้าฟู (Family Nymphalidae)	51
2.	ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา (<i>Cethosia cyane</i>)		27
3.	ผีเสื้อแพนซีสีตาล (<i>Junonia lemonias</i>)		21
4.	ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา (<i>Neptis hylas</i>)		25
5.	ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ (<i>Danaus genutia</i>)		26
6.	ผีเสื้อจระกานอนอีโต้ (<i>Euploea core godartii</i>)		19



ภาพที่ 68 แสดงปีกล่างของผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก




ภาพที่ 69 แสดงปีกบนของผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Acraea violae*

ลักษณะทั่วไป: ปีกบน พื้นปีกสีส้ม มีแถบและจุดสีดำประปราย ขอบปีกด้านข้างของปีกทั้งสองคู่มีสีดำ ปีกล่าง คล้ายปีกบน แต่พื้นปีกมีสีอ่อนกว่า ขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หลังมีแถบสีขาวเรียงกันบนแถบสีดำ ขนาดกางปีก 5-7 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก



ภาพที่ 70 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก

ที่มา: (www.geocities.com, วงจรชีวิตผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก, 2552)

พืชอาหาร

1. กะทกรก


- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย
- ผล เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. ดินตุ๊กแก

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

3. ข้าวเม่านก

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย



ภาพที่ 71 แสดงปีกล่างของผีเสื้อกะทกรกธรรมดา




ภาพที่ 72 แสดงปีกบนของผีเสื้อกะทกรกธรรมดา

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Cethosia cyane*

ลักษณะทั่วไป: ลักษณะและสีส้มของทั้งสองเพศคล้ายผีเสื้อกะทกรกแดง แต่สีพื้นปีกของเพศผู้จะออกสีส้มมากกว่า เพศเมียมีพื้นปีกสีน้ำตาลเทาที่แตกต่างจากผีเสื้อกะทกรกแดงอย่างเห็นได้ชัดคือ แถบสีขาวที่พาดขวางกลางปีกคู่หน้า ซึ่งผีเสื้อกะทกรกแดงไม่มี วางไข่เป็นกลุ่ม ประมาณ 30-70 ฟอง ปีกบน เพศผู้มีพื้นปีกสีน้ำตาลส้ม ปีกคู่หน้าตั้งแต่กลางปีกไปจนถึงมุมปลายปีกหน้ามีสีดำ และมีแถบสีขาวพาดขวางบนพื้นสีดำ ขอบปีกหยักเว้า ปีกล่าง พื้นปีกมีสีคล้ายปีกบนแต่อ่อนกว่า มีเส้นลายและจุดสีดำทั่วทั้งปีก ปีกคู่หน้ามีแถบสีขาวพาดขวางกลางปีกเช่นเดียวกับปีกบน เพศเมียมีสีเหลืองอ่อนตั้งแต่กลางปีกจนถึงขอบปีก ขนาดกางปีก 7-9.5 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อกะทกรกธรรมดา



ภาพที่ 73 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อกะทกรกธรรมดา

ที่มา: (www.butterflyworld.ca.com, วงจรชีวิตผีเสื้อกะทกรกธรรมดา, 2552)

พืชอาหาร

1. กะทกรก

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย
- ผล เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. สร้อยฟ้า


- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

3. ดินตุ๊กแก

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย



ภาพที่ 74 แสดงปีกล่างของผีเสื้อแพนซีสีตาล




ภาพที่ 75 แสดงปีกบนของผีเสื้อแพนซีสีตาล

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อแพนซีสีตาล

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Junonia lemonias*

ลักษณะทั่วไป: ปีกบน พื้นปีกสีน้ำตาล ขอบปีกด้านนอกของปีกคู่หน้ามีแถบสีขาว มีจุดวงกลมคล้ายผีเสื้อแพนซีมยุรา ปีกล่าง พื้นปีกสีน้ำตาลอ่อน มีลวดลายจางๆ ขนาดกางปีก 4.5-5.5 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อแพนซีสีตาล



ภาพที่ 76 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อแพนซีสีตาล

ที่มา: (www.freepages.misc.rootsweb.ancestry.com, วงจรชีวิตผีเสื้อแพนซีสีตาล, 2552)

พืชอาหาร

1. ต้อยตุง
 - ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
 - ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย
2. หญ้าเกล็ดปลา
 - ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
 - ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย
3. ข้าวเม่านก
 - ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
 - ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย



ภาพที่ 77 แสดงปีกล่างของผีเสื้อกะลาสีธรรมดา




ภาพที่ 78 แสดงปีกบนของผีเสื้อกะลาสีธรรมดา

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Neptis hylas*

ลักษณะทั่วไป: ปลายหนวดมีสีส้ม ขณะเกาะมักกางปีก ปีกบน พื้นปีกสีดำมีลายแถบสีขาวยาวเป็นแนวขวางกับลำตัวคล้ายผีเสื้อกะลาสีชนิดอื่น ๆ แถบบริเวณกลางปีกคู่หน้าจะแตกต่างจากกะลาสีลายทึบ ปีกล่าง พื้นปีกสีน้ำตาลออกเหลืองมีแถบสีขาวคล้ายปีกบน ขนาดกางปีก 5-6 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อกะลาสีธรรมดา



ภาพที่ 79 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อกะลาสีธรรมดา

ที่มา: (www.freepages.misc.rootsweb.ancestry.com, วงจรชีวิตผีเสื้อกะลาสีธรรมดา, 2552)

พืชอาหาร

1. ต้อยติ่ง


- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. คนทีดิน

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

3. หังเม่น

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย



ภาพที่ 80 แสดงปีกล่างของผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ




ภาพที่ 81 แสดงปีกบนของผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Danaus genutia*

ลักษณะทั่วไป: ปีกบน พื้นปีกสีน้ำตาลแดง ปีกคู่หน้า มีแถบสีขาวพาดขวางขอบปีกด้านข้างมีจุดสีขาวเรียงกันสองแถวบนพื้นสีน้ำตาลเข้ม เส้นปีกมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ ปีกล่าง คล้ายปีกบน ขนาดกางปีก 7.5-9.5 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ



ภาพที่ 82 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ

ที่มา: (www.bloggang.com, วงจรชีวิตผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ, 2552)

พืชอาหาร

1. ปอกระสา

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. คนทีดิน

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

3. ไทรย้อย

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย
- ผล เป็นอาหารของตัวเต็มวัย



ภาพที่ 83 แสดงปีกล่างของผีเสื้อจระกานอนยี่โก *Euploea core godartii*




ภาพที่ 84 แสดงปีกบนของผีเสื้อจระกานอนยี่โก *Euploea core godartii*

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อจระกานอนยี่โก

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Euploea core godartii*

ลักษณะทั่วไป: พบในประเทศไทย 3 ชนิดย่อย คือ *E.c. godartii*, *E.c. layardi* และ *E.c. graminifera* ปีกบน พื้นปีกสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ ปีกคู่หน้าของแต่ละชนิดย่อยจะแตกต่างกัน *E.c. godartii* มุมปลายปีกหน้าเป็นสีน้ำตาลจางเกือบขาว กลางปีกมีสีเหลืองน้ำตาลเล็กน้อย *E.c. layardi* มุมปลายปีกหน้าของปีกด้านข้างมีจุดสีขาว *E.c. graminifera* มีแต้มเรียงกัน ขวางมุมปลายปีกหน้า ปีกคู่หลังคล้ายกันทั้งสามชนิดย่อย มีจุดสีขาวเรียงกันตามแนวขอบปีกด้านข้าง 2 แถว ปีกล่าง คล้ายปีกบน ขนาดกางปีก 8.5-9.5 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อจระกานอนยี่โก



ภาพที่ 85 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อจระกานอนยี่โก

ที่มา: (www.gotoknow.org.com, วงจรชีวิตผีเสื้อจระกานอนยี่โก, 2552)

พืชอาหาร

1. ผักสาบ

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. ไทรย้อย

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย
- ผล เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

ตารางที่ 5 แสดงผีเสื้อกลางวันที่สำรวจพบ วงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่ำ (Family Pieridae) พบ 8 สกุล 10 ชนิด ได้แก่

ลำดับ	ชนิด	วงศ์	จำนวนผีเสื้อที่พบ ในระยะเวลา 12 เดือน (ตัว)
1.	ผีเสื้อขาวแคะ (<i>Leptosia nina</i>)	วงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่ำ (Family Pieridae)	57
2.	ผีเสื้อเหลืองสยามธรรมดา (<i>Cepora iudith</i>)		8
3.	ผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมดา (<i>Appias albina darada</i>)		19
4.	ผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นดำ (<i>Appias libythea</i>)		21
5.	ผีเสื้อหนอนใบกุ่มอินทรา (<i>Appias indra</i>)		7
6.	ผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก (<i>Ixias pyrene</i>)		15
7.	ผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่ (<i>Hebomoia glaucippe</i>)		7
8.	ผีเสื้อฟ้าเมฆเลียนธรรมดา (<i>Pareronia anais</i>)		13
9.	ผีเสื้อหนอนกุญ (<i>Catopsilia pomona</i>)		18
10.	ผีเสื้อเนรธรรมดา (<i>Eurema hecabe contubernalis</i>)		80



ภาพที่ 86 แสดงปีกล่างของผีเสื้อขาวแกระ




ภาพที่ 87 แสดงปีกบนของผีเสื้อขาวแกระ

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อสีขาวแกระ

ชื่อวิทยาศาสตร์: *leptosia nina*

ลักษณะทั่วไป: ปีกบน พื้นปีกสีขาว มุมปลายปีกหน้าของปีกคู่หน้ามีสีดำ กลางปีกมีจุดใหญ่ 1 จุด
 ปีกล่าง พื้นปีกสีขาวครีม มีลายหยาบ ๆ มุมปลายปีกหน้าและกลางปีกคู่หน้าอาจเห็นสีดำ
 จาง ๆ ของปีกบนขนาดกางปีก 2.5-3.5 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อขาวแฉะ



ภาพที่ 88 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อขาวแฉะ

ที่มา: (www.ukleps.org.com, วงจรชีวิตผีเสื้อขาวแฉะ, 2552)

พืชอาหาร

1. จี๋เหล็กป่า

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. จี๋เหล็ก

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

3. กุณ

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย




ภาพที่ 89 แสดงปีกบนของผีเสื้อเหลืองสยามธรรมดา

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อเหลืองสยามธรรมดา

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Cepora iudith*

ลักษณะทั่วไป: ปีกบน เพศผู้มีพื้นปีกสีขาว มุมปลายปีกหน้าและขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หน้ามีสีดำ ปีกคู่หลังตั้งแต่กลางปีกจนถึงขอบปีกด้านในมีสีเหลือง ขอบปีกด้านข้างมีสีดำ เพศเมียคล้ายเพศผู้ แต่ขอบปีกด้านข้างและมุมปลายปีกหน้าของปีกคู่หน้ามีสีดำเกือบครึ่งปีก ขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หลังมีสีดำหนากว่าของเพศผู้ ปีกล่าง ทั้งสองเพศคล้ายกัน ปีกคู่หน้าคล้ายปีกบน แต่มีแถบสีดำหนากว่า ปีกคู่หลังมีพื้นปีกสีเหลือง ขอบปีกด้านข้างมีสีดำหนา ขนาดกางปีก 5.5-6.5 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อเหลืองสยามธรรมดา



ภาพที่ 90 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อเหลืองสยามธรรมดา

ที่มา: (www.butterfly-guide.co.uk, วงจรชีวิตผีเสื้อเหลืองสยามธรรมดา, 2552)


พืชอาหาร

1. จี๋เหล็กป่า

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. กุณ

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย



ภาพที่ 91 แสดงปีกล่างของผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมชาติ




ภาพที่ 92 แสดงปีกบนของผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมชาติ

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมชาติ

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Appias albina*

ลักษณะทั่วไป: กลุ่มผีเสื้อหนอนใบกุ่มมักบินตามกันเป็นกลุ่ม เพื่อหาแหล่งอาหาร ปีกบน ทั้งสองเพศมีพื้นปีกสีขาว แต่ปีกคู่หน้าของเพศเมียมีขอบปีกด้านข้างและด้านนอกสีดำ กลางปีกคู่หน้าใกล้ขอบปีกด้านข้างมีสีดำ 1 จุด ปีกล่าง พื้นปีกสีขาวครีม ขนาดกางปีก 5-7 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมชาติ



ภาพที่ 93 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมชาติ

ที่มา: (www.home.vicnet.net.au, วงจรชีวิตผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมชาติ,


พืชอาหาร

1. กุ่มบก

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. แฉง

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย
- ผล เป็นอาหารของตัวเต็มวัย



ภาพที่ 94 แสดงปีกล่างของผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นดำเพศผู้




ภาพที่ 95 แสดงปีกบนของผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นดำเพศเมีย

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Appias libythra*

ลักษณะทั่วไป: ปีกบน เพศผู้มีพื้นปีกสีขาว ขอบปีกด้านข้างสีดำ คล้ายเพศผู้ของผีเสื้อหนอนใบกุ่ม ขอบตาลไหม้ แต่ชนิดนี้เห็นเส้นปีกเป็นสีดำชัดเจน เพศเมียคล้ายเพศผู้ของผีเสื้อหนอนใบกุ่มขอบตาลไหม้ แต่มีลักษณะของแถบสีขาวที่แตกต่างกัน ปีกล่าง มีพื้นปีกสีขาว มีเส้นปีกสีดำ เพศเมียมีสีส้มจาง ๆ บริเวณโคนปีก ขนาดกางปีก 5-6.5 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นดำ



ภาพที่ 96 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นดำ

ที่มา: (www.forums.gardenweb.com, วงจรชีวิตผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นดำ, 2552)

พืชอาหาร

1. กุ่มบก

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. แฉง

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย
- ผล เป็นอาหารของตัวเต็มวัย



ภาพที่ 97 แสดงปีกล่างของผีเสื้อหนอนใบกุ่มอินทรา




ภาพที่ 98 แสดงปีกบนของผีเสื้อหนอนใบกุ่มอินทรา

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อหนอนใบกุ่มอินทรา

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Appias indra*

ลักษณะทั่วไป: จุดสังเกตของผีเสื้อหนอนใบกุ่มอินทราอยู่ที่มุมปีกคู่หน้ามีสีดำและมีจุดสีขาว 2 จุด อยู่ภายในเพศเมียมีสีคล้ำกว่าด้านล่างของปลายปีกหน้าเป็นสีเหลืองและมีสีน้ำตาลระบายน ที่ขอบปีกด้านใน ขนาดกางปีก 6-7 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อหนอนใบกุ่มอินทรา



ภาพที่ 99 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อหนอนใบกุ่มอินทรา

ที่มา: (www.dgsgardening.btinternet.co.uk, วงจรชีวิตผีเสื้อหนอนใบกุ่มอินทรา, 2552)

พืชอาหาร

1. กุ่มบก

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. แฉง

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย
- ผล เป็นอาหารของตัวเต็มวัย



ภาพที่ 100 แสดงปีกล่างของผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก




ภาพที่ 101 แสดงปีกบนของผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Ixias pyrene*

ลักษณะทั่วไป: ปีกบน พื้นปีกสีขาวอมเหลือง ปีกคู่หน้าตั้งแต่กลางปีกจนถึงมุมปลายปีกด้านหน้ามีแถบสีเหลืองขอบสีดำ แถบสีเหลืองบริเวณนี้ของเพศเมียจะเล็กกว่าของเพศผู้ และพื้นปีกมีสีคล้ำกว่าขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หลัง ปีกล่าง พื้นปีกสีเหลืองคล้ายกับกลุ่มของผีเสื้อ เณร ขนาดกางปีก 5-6 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก



ภาพที่ 102 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก

ที่มา: (www.outdoors.webshots.com, วงจรชีวิตผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก, 2552)

พืชอาหาร

1. จี๋เหล็กป่า

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. กุณ

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

3. จี๋เหล็ก

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย



ภาพที่ 103 แสดงปีกล่างของผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่




ภาพที่ 104 แสดงปีกบนของผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่

ชื่อสามัญ: ปลายปีกส้มใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Hebomoia glaucippe*

ลักษณะทั่วไป: ปีกบน เพศผู้มีพื้นปีกสีขาว มุมปลายปีกหน้าของปีกคู่หน้ามีแถบสีส้มขนาดใหญ่ เป็นที่มาของชื่อ “ปลายปีกส้มใหญ่” เพศเมียคล้ายเพศผู้ แต่มีแต้มสีดำที่ขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หลัง ปีกล่าง คล้ายกันทั้งสองเพศ พื้นปีกสีน้ำตาลลาย ๆ คล้ายใบไม้แห้ง ขนาดกางปีก 8-10 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่



ภาพที่ 105 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่

ที่มา: (www.outdoors.webshots.com, วงจรชีวิตผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่, 2552)

พืชอาหาร

1. จี๋เหล็กป่า

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. กุณ

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

3. จี๋เหล็ก

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย



ภาพที่ 106 แสดงปีกบนของผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมชาติเพศผู้




ภาพที่ 107 แสดงปีกบนของผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมชาติเพศเมีย

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมชาติ

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Pareronia anais*

ลักษณะทั่วไป: เพศเมียเลียนแบบผีเสื้อหนอนใบรักสกุล *Parantica* เพศผู้คล้ายผีเสื้อฟ้าเมียเลียนมลายู ปีกบน ทั้งสองเพศมีพื้นปีกสีดำ มีแถบสีฟ้าในช่องระหว่างเส้นปีก มุมปลายปีกหน้าของปีกคู่หน้าเพศผู้มีจุดสีฟ้า ซึ่งเพศผู้ของผีเสื้อฟ้าเมียเลียนมลายูไม่มี เพศเมียมีแถบสีฟ้าอ่อนเกือบขาวบริเวณกลางปีก มีขอบปีกและเส้นปีกสีดำหนาค้นคล้ายผีเสื้อหนอนใบรักปีกล่าง ทั้งสองเพศคล้ายปีกบน แต่สีอ่อนกว่า ขนาดกางปีก 6.5-8 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมชาติ



ภาพที่ 108 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมชาติ

ที่มา: (www.kriyayoga.com, วงจรชีวิตผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมชาติ, 2552)

พืชอาหาร

1. พนมสวรรค์ป่า

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. จี๋เหล็กป่า

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

3. จี๋เหล็ก

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย



ภาพที่ 109 แสดงปีกล่างของผีเสื้อหนอนคูน *C. crocale*




ภาพที่ 110 แสดงปีกล่างของผีเสื้อหนอนคูน *C. Pomona*

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อหนอนคูน

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Catopsilia Pomona*

ลักษณะทั่วไป: ผีเสื้อชนิดนี้พบได้บ่อยมาก มีลวดลายแตกต่างจาก *C. crocale* ปีกบน เพศผู้มีพื้นปีกสีเขียวอ่อน ปีกคู่หน้ามีสีน้ำตาลที่มุมปลายปีกหน้า เพศเมียพื้นปีกสีขาว โคนปีกสีเขียว เหลือง ขอบปีกด้านบนและด้านข้างมีสีน้ำตาล ปีกล่าง เพศผู้คล้ายปีกบนแต่ไม่มีลวดลายของปีกบนจาง ๆ โคนปีกคู่หลังมีสีเหลืองไม่มีลวดลาย *C. pomona* หนวดสีน้ำตาลแดง ปีกบน พื้นปีกสีเหลือง ปีกคู่หน้ามีสีดำที่มุมปลายปีกหน้า และมีจุดสีดำกลางปีก 1 จุด ปีกล่าง เพศผู้มีพื้นปีกสีเขียวอ่อน กลางปีกคู่หน้ามีจุดสีน้ำตาล 1 จุดกลางปีกคู่หลังมีวงกลมสีน้ำตาลติดกัน 2 วง ขนาดกางปีก 5.5-8 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อหนอนคูน



ภาพที่ 111 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อหนอนคูน

ที่มา: (www.nestbox.com, วงจรชีวิตผีเสื้อหนอนคูน, 2552)

พืชอาหาร

1. ขี้เหล็กป่า

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. ขี้เหล็ก

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

3. คูน

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย



ภาพที่ 112 แสดงปีกล่างของผีเสื้อเนรธรรมดา




ภาพที่ 113 แสดงปีกบนของผีเสื้อเนรธรรมดา

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อเนรธรรมดา

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Eurema hecabe*

ลักษณะทั่วไป: กลุ่มผีเสื้อเนรเป็นผีเสื้อที่จำแนกชนิดได้ยาก ยกเว้นผีเสื้อเนรขอดไม้ที่มีสีออกไปทางสีเหลืองอ่อน และปีกล่างไม่มีลวดลายใด ๆ แต่ละชนิดมีสีสันที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้จะใช้สีดำที่บริเวณขอบปีกบนเป็นจุดสังเกตแล้ว จุดแต้มสีน้ำตาลเล็กที่กระจายอยู่บนแผ่นปีกล่างก็มีส่วนช่วยในการแยกความแตกต่างของผีเสื้อเนรเหล่านี้ได้เช่นกัน ปีกบน พื้นปีกสีเหลือง ขอบปีกสีดำ สีดำที่ต่อกับสีเหลืองบริเวณขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หน้าหักเว้า ปีกล่าง คล้ายปีกบน เห็นสีดำจาง ๆ ของปีกบนมีจุดสีน้ำตาลเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วไป ขนาดกางปีก 4-5 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อเอเธอร์มมดา



ภาพที่ 114 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อเอเธอร์มมดา

ที่มา: (www.ukleps.org, วงจรชีวิตผีเสื้อเอเธอร์มมดา, 2552)

พืชอาหาร

1. กุณ

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. จี๋เหล็กป่า

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

3. จี๋เหล็ก

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

ตารางที่ 6 แสดงผีเสื้อกลางวันที่สำรวจพบ วงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงิน (Family Lycaenidae) พบ 6 สกุล
8 ชนิด ได้แก่

ลำดับ	ชนิด	วงศ์	จำนวนผีเสื้อที่พบ ในระยะเวลา 12 เดือน (ตัว)
1.	ผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา (<i>Castalius rosimon</i>)	วงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงิน (Family Lycaenidae)	42
2.	ผีเสื้อฟ้าวาฬต่างฤดู (<i>Jamides celeno</i>)		48
3.	ผีเสื้อฟ้าวาฬใหญ่ (<i>Jamides alecto</i>)		20
4.	ผีเสื้อฟ้าขอบขนธรรมดา (<i>Anthene emolus</i>)		10
5.	ผีเสื้อฟ้าขอบขนใต้ปีกจุด (<i>Anthene lycaenina</i>)		17
6.	ผีเสื้อฟ้าอเคเซียธรรมดา (<i>Surendra quercetorum</i>)		40
7.	ผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง (<i>Spindasis syama</i>)		27
8.	ผีเสื้อพุ่มไม้ธรรมดา (<i>Hypolycaena erylus</i>)		22



ภาพที่ 115 แสดงปีกล่างของผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา




ภาพที่ 116 แสดงปีกบนของผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Castalius rosimon*

ลักษณะทั่วไป: ปีกคู่หลังที่มุมปลายปีกหลังมีเส้นขนเล็ก ๆ ข้างละ 1 เส้น ปีกบน พื้นปีกสีขาว ขอบปีกสีดำ กลางปีกมีสีดำประปราย โคนปีกมีสีฟ้าจาง ๆ ใกล้เคียงมุมปลายปีกหลังของปีกคู่หลังมีจุดสีดำ ปีกล่าง พื้นปีกสีขาว มีแต้มจุดสีดำกระจายอยู่ทั่วทั้งปีก ขนาดกางปีก 2.4-3.2 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา



ภาพที่ 117 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา

ที่มา: (www.bugsandweeds.co.uk, วงจรชีวิตผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา,

พืชอาหาร

1. พุทรา


- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย
- ผล เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. ตะแบก

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย



ภาพที่ 118 แสดงปีกล่างของผีเสื้อฟ้าวาวสีต่างฤดู




ภาพที่ 119 แสดงปีกบนของผีเสื้อฟ้าวาวสีต่างฤดู

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อฟ้าวาวสีต่างฤดู

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Jumides celeno*

ลักษณะทั่วไป: คล้ายผีเสื้อฟ้าวาวใหญ่ ต่างกันที่เส้นสีขาวบนปีกคู่หน้าของปีกล่าง ปีกคู่หลังที่มูมปลายปีกหลังมีเส้นขนเล็ก ๆ ข้างละ 1 เส้น ปีกบน เพศผู้มีพื้นปีกสีฟ้าอ่อนเกือบขาว ขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หน้าสีดำ เพศเมียมีพื้นปีกสีฟ้าอ่อนเกือบขาว ขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หน้าและขอบปีกด้านนอกของปีกคู่หลังมีสีน้ำตาลเข้ม ปีกคู่หลังของทั้งสองเพศมีจุดสีดำแต้มสีส้มบริเวณมุมปลายปีกหลัง ปีกล่าง ทั้งสองเพศคล้ายกัน พื้นปีกสีน้ำตาล มีเส้นตลอดสายขาวทั่วทั้งปีก มูมปลายปีกหลังมีจุดสีดำแต้มสีส้ม ขนาดกางปีก 2.7-3.5 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อฟาวาสีต่างฤดู



ภาพที่ 120 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อฟาวาสีต่างฤดู

ที่มา: (www.bugsandweeds.co.uk, วงจรชีวิตผีเสื้อฟาวาสีต่างฤดู, 2552)

พืชอาหาร

1. ถั่วเคถั่ว

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. ถั่วลิสงป่า

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

3. ตะแบก

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย




ภาพที่ 121 แสดงปีกล่างของผีเสื้อฟาวาใหญ่

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อฟาวาใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Jamides alecto*

ลักษณะทั่วไป: คล้ายผีเสื้อฟาวาต่างฤดู ต่างกันที่เส้นมีขาวบนปีกคู่หน้าของปีกล่าง ปีกคู่หลังที่มูมปลายปีกหลังมีเส้นขนเล็ก ๆ ข้างละ 1 เส้น ปีกบน เพศผู้มีพื้นปีกสีฟ้าอ่อน ขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หน้าสีดำ เพศเมียมีพื้นปีกสีฟ้า ขอบปีกทั้งสองคู่มีสีน้ำตาลเข้ม ปีกคู่หลังทั้งสองเพศมีจุดสีดำแต้มสีส้มบริเวณมุมปลายปีกหลัง ปีกล่าง ทั้งสองเพศคล้ายกัน พื้นปีกสีน้ำตาล มีเส้นลวดลายสีขาวทั่วทั้งปีก มูมปลายปีกหลังมีจุดสีดำแต้มสีส้ม ขนาดกางปีก 3-4.4 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อฟาวาใหญ่



ภาพที่ 122 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อฟาวาใหญ่

ที่มา: (www.bugsandweeds.co.uk, วงจรชีวิตผีเสื้อฟาวาใหญ่, 2552)

พืชอาหาร

1. ถั่วเคล้า

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. ถั่วลิสนป่า

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

3. ตะแบก

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย




ภาพที่ 123 แสดงปีกล่างของผีเสื้อฟ้าขอบขนธรรมดา

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อฟ้าขอบขนธรรมดา

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Anthene emolus*

ลักษณะทั่วไป: มุมปลายปีกหน้าของปีกคู่หน้าค่อนข้างแหลม ปีกบน เพศผู้มีพื้นปีกสีน้ำตาลอมม่วง เพศเมียมีพื้นปีกสีน้ำตาล โคนปีกมีสีน้ำตาล ปีกล่าง ทั้งสองเพศคล้ายกัน พื้นปีกสีน้ำตาล มีเส้นลวดลายสีขาว ปีกคู่หลังมีจุดสีดำแต้มสีส้มใกล้มุมปลายปีกหลัง และมีจุดสีดำอีก 1 จุดที่ขอบปีกด้านใน ขนาดกางปีก 2.8-3.5 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อฟ้าขอบขนธรรมดา



ภาพที่ 124 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อฟ้าขอบขนธรรมดา

ที่มา: (www.bugsandweeds.co.uk, วงจรชีวิตผีเสื้อฟ้าขอบขนธรรมดา, 2552)

พืชอาหาร

1. ถั่วเคถั่ว

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. ถั่วลิสง

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

3. ตะแบก

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย




ภาพที่ 125 แสดงปีกบนของผีเสื้อฟ้าขอบขนไต้ปีกจุด

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อฟ้าขอบขนไต้ปีกจุด

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Anthene lycaenina*

ลักษณะทั่วไป: มุมปลายปีกด้านหน้าของปีกคู่หน้าค่อนข้างแหลม ปีกบน พื้นปีกสีน้ำเงินอมม่วง ปีกล่าง คล้ายผีเสื้อฟ้าขอบขนธรรมดา ต่างกันที่ชนิดนี้มีจุดดำ 1 จุดบริเวณขอบปีกด้านนอกของปีกคู่หลัง ส่วนผีเสื้อฟ้าขอบขนธรรมดามีจุดสีดำบริเวณขอบปีกด้านใน ขนาดกางปีก 2.5-3.5 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อฟ้าขอบขนใต้ปีกจุด



ภาพที่ 126 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อฟ้าขอบขนใต้ปีกจุด

ที่มา: (www.images.on.ca, วงจรชีวิตผีเสื้อฟ้าขอบขนใต้ปีกจุด, 2552)

พืชอาหาร

1. ถั่วเคถั่ว

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. ถั่วลิสง

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

3. ตะแบก

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย



ภาพที่ 127 แสดงปีกล่างของผีเสื้อฟาวเคเซียธรรมดา




ภาพที่ 128 แสดงปีกบนของผีเสื้อฟาวเคเซียธรรมดา

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อฟาวเคเซียธรรมดา

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Surendra quercetorum*

ลักษณะทั่วไป: ปีกคู่หลังที่มูมปลายปีกหลังมีลักษณะที่ยื่นยาว ปีกบน เพศผู้มีสีน้ำตาลเงินบริเวณกลางปีก ขอบปีกมีสีน้ำตาลเข้ม เพศเมียมีพื้นปีกทั้งสองคู่สีน้ำตาล ปีกล่าง พื้นปีกสีน้ำตาล คล้ายใบไม้แห้งที่มูมปลายปีกหลังของปีกคู่หลังมีแต้มสีส้ม ขนาดกางปีก 3-4 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อฟ้าเคเชียธรรมดา



ภาพที่ 129 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อฟ้าเคเชียธรรมดา

ที่มา: (www.bugsandweeds.co.uk, วงจรชีวิตผีเสื้อฟ้าเคเชียธรรมดา, 2552)

พืชอาหาร

1. ถั่วเคลล์


- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. ถั่วลิ้นปี่

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

3. ตะแบก

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย



ภาพที่ 130 แสดงปีกล่างของผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง




ภาพที่ 131 แสดงปีกบนของผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Spindasis syama*

ลักษณะทั่วไป: ทั้งสองเพศคล้ายกัน ปลายหนวดสีส้ม ปีกคู่หลังที่มุมปลายปีกหลังมีเส้นขนเล็ก ๆ ข้างละ 2 เส้น ปีกบน พื้นปีกสีน้ำตาล มุมปลายปีกหลังของปีกคู่หลังมีแต้มสีส้มและจุดสีดำ ปีกล่าง พื้นปีกสีขาวครีมมีเส้นแถบสีน้ำตาลแดง บนเส้นแถบนี้อีกมีเส้นสีเงิน มุมปลายปีกหลังของปีกคู่หลังมีจุดสีดำบนแต้มสีส้ม ขนาดกางปีก 2.6-4 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง



ภาพที่ 132 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง

ที่มา: (www.images.on.ca, วงจรชีวิตผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง, 2552)

พืชอาหาร

1. ถั่วเคถั่ว

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. ถั่วลิสง

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย




ภาพที่ 133 แสดงปีกล่างของผีเสื้อพุ่มไม้ธรรมดา

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อพุ่มไม้ธรรมดา

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Hypolycaena erylus*

ลักษณะทั่วไป: ปีกคู่หลังที่มูมปลายปีกหลังมีเส้นขนเล็ก ๆ ข้างละ 2 เส้น ปีกบน เพศผู้มีพื้นปีกสีน้ำเงิน เพศเมียมีพื้นปีกสีน้ำตาล ปีกล่าง พื้นปีกสีเทาขาว กลางปีกมีเส้นขีดสีน้ำตาลเกือบขนานกับขอบปีกด้านข้าง มูมปลายปีกหลังของปีกคู่หลังมีจุดสีดำแต้มสีส้ม ขนาดกางปีก 3.2-3.6 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อพุ่มไม้ธรรมดา



ภาพที่ 134 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อพุ่มไม้ธรรมดา

ที่มา: (www.images.on.ca, วงจรชีวิตผีเสื้อพุ่มไม้ธรรมดา, 2552)

พืชอาหาร

1. ถั่วเคล้า

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. ถั่วเสี้ยนป่า


- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

3. ตะแบก

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ดอก เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

ตารางที่ 7 แสดงผีเสื้อกลางวันที่สำรวจพบ วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว (Family Hesperidae) พบ 2 สกุล
2 ชนิด ได้แก่

ลำดับ	ชนิด	วงศ์	จำนวนผีเสื้อที่พบ ในระยะเวลา 12 เดือน (ตัว)
1.	ผีเสื้อจันทอนมะพร้าว ธรรมดา (<i>Lambrix salsala</i>)	วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว (Family Hesperidae)	10
2.	ผีเสื้อมอธราบปีกแหลม (<i>Pseudomicronia aculeate</i>)		8



ภาพที่ 135 แสดงปีกล่างของผีเสื้อจัวหนอนมะพร้าวธรรมดา




ภาพที่ 136 แสดงปีกบนของผีเสื้อจัวหนอนมะพร้าวธรรมดา

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อจัวหนอนมะพร้าวธรรมดา

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Lambrix salsala*

ลักษณะทั่วไป: ปีกบน พื้นปีกสีน้ำตาลเข้มกลางปีกคู่หน้ามีจุดสีขาวเรียงกัน ปีกล่าง คล้ายปีกบน แต่สีอ่อนกว่า กลางปีกทั้งสองคู่มีจุดสีขาว ขนาดกางปีก 2.6-3 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อจันทอนมะพร้าวธรรมดา



ภาพที่ 137 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อจันทอนมะพร้าวธรรมดา

ที่มา: (www.sarapiquinfo.com, วงจรชีวิตผีเสื้อจันทอนมะพร้าวธรรมดา, 2552)

พืชอาหาร

1. กล้วยผา

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ผล เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. ฝรั่ง

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน




ภาพที่ 138 แสดงปีกบนของผีเสื้อมอรราบปีกแหลม

ชื่อสามัญ: ผีเสื้อมอรราบปีกแหลม

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Pseudomicronia aculeate*

ลักษณะทั่วไป: หัว ออกและท้องสีขาว ปีกทั้งสองด้านมีสีขาว มีลายเส้นสีเทาทั้งสองปีก ขอบปีกคู่จะ
 บินช้า ๆ กระตุก ๆ ไปมาสักระยะแล้วเกาะราบกับใบไม้ ขณะเกาะกับใบไม้ดูคล้ายมูลนกสี
 ขาวเปื้อนบนใบไม้ ขนาดกางปีก 2.5-4 ซม.

วงจรชีวิตผีเสื้อมอธราบปีกแหลม



ภาพที่ 139 แสดงวงจรชีวิตผีเสื้อมอธราบปีกแหลม

ที่มา: (www.pro.corbis.com, วงจรชีวิตผีเสื้อมอธราบปีกแหลม, 2552)


พืชอาหาร

1. กล้ายผา

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน
- ผล เป็นอาหารของตัวเต็มวัย

2. ไผ่รวก

- ใบ เป็นอาหารของตัวหนอน



ภาพที่ 140 แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนชนิดผีเสื้อกลางวันในแต่ละวงศ์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551