

บทที่ 6

สรุปผลการศึกษา

การศึกษความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างวิมานลอยในเขาชอนเคือ อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์ ผลที่ได้จากการศึกษา คือ พบผีเสื้อกลางวัน 5 วงศ์ ได้แก่ Papilionidae พบ 4 สกุล 8 ชนิด Pieridae พบ 8 สกุล 10 ชนิด Nymphalidae พบ 6 สกุล 6 ชนิด Lycaenidae พบ 6 สกุล 8 ชนิด และ Hesperidae พบ 2 สกุล 2 ชนิด รวมทั้งหมด 26 สกุล 34 ชนิด ซึ่งเดือนที่พบผีเสื้อกลางวันมากที่สุด คือ พบว่าเดือนตุลาคม พบจำนวนชนิดผีเสื้อกลางวันมากที่สุด พบทั้งหมด 33 ชนิด เนื่องจากเดือนตุลาคม เป็นช่วงฤดูฝน จึงทำให้มีปริมาณพืชอาหารอุดมสมบูรณ์ ขณะที่เดือนธันวาคม พบผีเสื้อกลางวันน้อยที่สุด พบทั้งหมด 8 ชนิด เนื่องจากเดือนธันวาคมเป็นช่วงฤดูหนาว อากาศแห้งแล้ง พืชบางชนิดมีการผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำ พืชอาหารของผีเสื้อจึงมีปริมาณน้อย จึงส่งผลต่อการสำรวจพบผีเสื้อกลางวัน

ข้อเสนอแนะ

1. การศึกษความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างวิมานลอยในเขาชอนเคือ อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์ อาจนำข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลพื้นฐานมาใช้ในการทำบทเรียนท้องถิ่น
2. การศึกษความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างวิมานลอยในเขาชอนเคือ อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์ อาจนำข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลพื้นฐานมาใช้ในการศึกษาผีเสื้อกลางวันต่อไป
3. สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวชมผีเสื้อ จึงขอแนะนำให้เดินทางมาเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม หรือในช่วงฤดูฝน เพราะมีผีเสื้อกลางวันจำนวนมาก เหมาะกับการเที่ยวชมและศึกษา