

อมรรัตน์ อ่อนเปี่ยม 2550: การกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งจำเพาะในช่องจับอะไกลโคโคนของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากพะยูน วิทยุวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) สาขาชีวเคมี ภาควิชาชีวเคมี
ประธานกรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์ประชุมพร คงเสรี, Ph.D. 124 หน้า

เอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสไม่เพียงแต่สลายพันธะเบต้า-กลูโคซิดิกเท่านั้น แต่บางชนิดยังสามารถเร่งปฏิกิริยาอื่นการสลายและปฏิกิริยาการย้ายหมู่กลูโคสได้อีกด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับลินามาเรสซึ่งเป็นเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากมันสำปะหลัง เอนไซม์คัลโคซิเนสซึ่งเป็นเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากพะยูนทำหน้าที่ดีกว่าในปฏิกิริยาอื่นการสลาย แต่ด้อยกว่าในปฏิกิริยาการย้ายหมู่กลูโคส เอนไซม์ทั้งสองชนิดต่างมีความจำเพาะกับสับสเตรทธรรมชาติของตัวเอง (คัลโคซิเนสกับกลูโคไซด์และลินามาเรส ตามลำดับ) ดังนั้นเอนไซม์ทั้งสองชนิดจึงมีความแตกต่างทั้งในการเร่งปฏิกิริยาและความจำเพาะต่อสับสเตรท แม้ว่าจะมีลำดับกรดอะมิโนคล้ายกันถึง 70% งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากรดอะมิโนที่มีความสำคัญต่อการทำงานของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสโดยใช้เอนไซม์คัลโคซิเนสและลินามาเรสเป็นตัวอย่างศึกษา โดยการแทนที่กรดอะมิโนในช่องจับอะไกลโคโคนของคัลโคซิเนสด้วยกรดอะมิโนของลินามาเรส (M195V H253F N323Q และ K402Y) ทำการแสดงออกคัลโคซิเนสกลายพันธุ์ในยีสต์ *Pichia pastoris* และทำให้บริสุทธิ์ คัลโคซิเนสกลายพันธุ์ทุกชนิดมีลักษณะคล้ายกับคัลโคซิเนสก่อนกลายพันธุ์โดยการวิเคราะห์โดยเทคนิคอิเล็กโตรโฟเรซิสแบบเอสดีเอส-พอลิอะคริลลาไมด์เจล เวสเทอร์นอิมมูโนโวลูเทอไรซ์ และอิเล็กโตรโฟเรซิสแบบนอนรีดิวซิงพอลิอะคริลลาไมด์เจล เมื่อศึกษาค่าทางจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์กลายพันธุ์ทั้ง 4 ชนิดเปรียบเทียบกับรีคอมบิแนนท์คัลโคซิเนส พบว่าค่า K_m ของ M195V N323Q และ K402Y ค่อยคัลโคซิเนสกลูโคไซด์ลดลง แต่ไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับ K_m ของ H253F และเอนไซม์กลายพันธุ์ทุกชนิดมีค่า K_m ต่อ *para*-nitrophenyl- β -D-glucopyranoside ลดลง แต่เอนไซม์กลายพันธุ์ทุกชนิดยังคงไม่สามารถสลายลินามาเรสได้ จากการศึกษาปฏิกิริยาการย้ายหมู่กลูโคสเอนไซม์กลายพันธุ์ทุกชนิด พบว่าเอนไซม์กลายพันธุ์เหล่านี้สามารถใช้แอลกอฮอล์ปฐมภูมิ และแอลกอฮอล์ทุติยภูมิบางตัวเป็นตัวรับน้ำตาลได้ดีกว่าคัลโคซิเนสธรรมชาติและรีคอมบิแนนท์คัลโคซิเนส โดย M195V สามารถใช้ *iso*-propanol เป็นตัวรับน้ำตาลได้ดี H253F และ N323Q สามารถใช้ methanol *n*-butanol *iso*-butanol และ *iso*-propanol เป็นตัวรับน้ำตาลได้ดี และ K402Y สามารถใช้แอลกอฮอล์ *n*-butanol *iso*-butanol และ *iso*-propanol เป็นตัวรับน้ำตาลได้ดี แต่เอนไซม์กลายพันธุ์ทุกตัวยังคงไม่สามารถใช้แอลกอฮอล์ทุติยภูมิเป็นตัวรับน้ำตาลได้สรุปได้ว่าตำแหน่งที่เลือกมาทำการกลายพันธุ์ในการทดลองนี้มีความสำคัญในการเร่งปฏิกิริยาการสลายสับสเตรท และปฏิกิริยาการย้ายหมู่กลูโคส เพราะทำให้คุณสมบัติของเอนไซม์เปลี่ยนไป อาจเป็นไปได้ว่าการกลายพันธุ์เพียงตำแหน่งเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้ได้เอนไซม์กลายพันธุ์ที่สามารถสลายลินามาเรส และใช้แอลกอฮอล์ทุติยภูมิเป็นตัวรับน้ำตาลได้ ดังนั้นถ้าทำการกลายพันธุ์มากกว่า 1 ตำแหน่งอาจทำให้เอนไซม์คัลโคซิเนสกลายพันธุ์ที่ได้สามารถสลายลินามาเรส และสามารถย้ายหมู่น้ำตาลไปให้ทั้งแอลกอฮอล์ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิได้

อมรรัตน์ อ่อนเปี่ยม
ลายมือชื่อนิติ

ประชุมพร คงเสรี
ลายมือชื่อประธานกรรมการ

๒๙ / ๐๕ / ๒๕๕๐