

ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเลิกเสพยาแอมเฟตามีนของผู้ที่ติดแอมเฟตามีนเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเสพยาแอมเฟตามีน การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้มุ่งศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเลิกเสพยาแอมเฟตามีนของผู้ที่ติดแอมเฟตามีน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่ติดแอมเฟตามีนและสามารถเลิกได้ 1 เดือนขึ้นไป ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนเมษายน 2545 ถึงเดือนกรกฎาคม 2545 จำนวน 53 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเลิกเสพยาแอมเฟตามีน ซึ่งผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลของไอเซนและฟิชไบน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ติดแอมเฟตามีนมีความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเลิกเสพยาแอมเฟตามีนที่มีต่อบุคคล และต่อครอบครัวและสังคมในทางบวก

ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบถึง ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเลิกเสพยาแอมเฟตามีนของผู้ที่ติดแอมเฟตามีนซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่อาจจะนำไปสู่พฤติกรรมเลิกเสพยาแอมเฟตามีน และสามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนในการปฏิบัติการพยาบาลแก่นักศึกษากลุ่มนี้ต่อไป

Outcome belief to non-reuse of amphetamine is one of the important factors that may impact on amphetamine using behavior. The purpose of this descriptive study was to investigate the outcome belief to non-reuse of amphetamine in persons with amphetamine dependence. Fifty three persons with amphetamine dependence were purposively recruited from Out Patient Department of Suanprung Hospital, Chiang Mai, during April to July 2002. The instrument was a questionnaire consisting of demographic data and outcome belief to non-reuse of amphetamine which developed by the investigator based on the concept of Ajzen & Fishbein (1980). Data were analyzed by using descriptive statistics.

The results revealed that persons with amphetamine dependence reported the positive outcome belief to non-reuse of amphetamine in terms of the personal concern and the family and social concern.

This finding, thus, provided the understanding of outcome belief as an underlying aspect, leading to the non-reuse of amphetamine behavior. It also could be applicable as a fundamental information for nursing care plan as well as an implementation for this target population.