

4036538 PHPH/M: สาขาวิชาเอก : พยาบาลสาธารณสุข; วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

คำสำคัญ : ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีในครอบครัว / ปัญหาสุขภาพกาย / ปัญหาสุขภาพจิต

ชื่อนักศึกษา : ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีในครอบครัวและผลสืบเนื่องทางสุขภาพ : กรณีศึกษาสตรีที่สมรสแล้วในเขตจังหวัดพะเยา (SELECTED FACTORS INFLUENCE DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN AND THE HEALTH CONSEQUENCES : CASE STUDY

AMONG WOMEN IN PHAYAO PROVINCE) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : สมพร เตรียมชัยศรี, ประ.ด., ธานีรัฐ วัชรทัย, Dr.P.H., พิทยา จารุพูนผล,

M.D. 179 หน้า, ISBN 974-974-662-4

การศึกษานี้เป็นการวิจัยสำรวจเชิงวิเคราะห์ (Analytical Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคลของสตรีที่สมรสแล้วและสามี ปัจจัยครอบครัวที่มีผลต่อความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัว และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการถูกรังแกที่รุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีในครอบครัวกับการรับรู้บทบาททางเพศ ปัญหาสุขภาพกายและปัญหาสุขภาพจิต ประชากรที่ศึกษาคือกลุ่มสตรีที่สมรสแล้ว อายุระหว่าง 15 - 44 ปี และอาศัยอยู่ใน จังหวัดพะเยา จำนวน 350 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2542 ถึง 31 มีนาคม 2542 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของสตรี แบบวัดสัมพันธภาพระหว่างสตรีและสามี แบบวัดการรับรู้บทบาททางเพศ แบบสอบถามการถูกรังแกของสตรีจากสามี แบบสอบถามปัญหาสุขภาพกาย และปัญหาสุขภาพจิต ของสตรีหลังถูกรังแกจากสามี และ แบบวัดบุคลิกภาพของสามี ทำการวิเคราะห์โดยคำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลทั่วไป และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของสตรีและสามี ปัจจัยครอบครัว การรับรู้บทบาททางเพศ ปัญหาสุขภาพกาย ปัญหาสุขภาพจิต กับ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีในครอบครัวโดยใช้สถิติไคว์-สแควร์วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ กรณี ตัวแปรต้นเป็นข้อมูลกลุ่ม และใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันวิเคราะห์กรณีตัวแปรต้นเป็นข้อมูลแบบช่วง และหาความสามารถของปัจจัยในการทำนายการเกิดความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีในครอบครัวโดยใช้สถิติการจำแนกหมู่ (MCA)

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของสตรี ได้แก่ พฤติกรรมการเล่นการพนัน ปัจจัยส่วนบุคคลของสามี ได้แก่ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยครอบครัว ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างสตรีและสามี มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีในครอบครัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัญหาสุขภาพกายมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำ และปัญหาสุขภาพจิต มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีในครอบครัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ปัจจัยส่วนบุคคลของสตรีมีความสามารถพยากรณ์การเกิดความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีในครอบครัวได้เพียงร้อยละ 1.90 - 2.70 ปัจจัยส่วนบุคคลของสามีมีความสามารถพยากรณ์การเกิดความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีในครอบครัวได้ร้อยละ 18.30-20.20 และปัจจัยครอบครัวมีความสามารถพยากรณ์การเกิดความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีในครอบครัวได้ร้อยละ 15.60-22.10