

4037122 NSMC/M : สาขาวิชา: การพยาบาลแม่และเด็ก; พ.ย.ม.(การพยาบาลแม่และเด็ก)

คำสำคัญ : ความเครียด/หอบผื่นตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน

ศิรลักษณ์ สนนอ้อ : ผลการพยาบาลแบบประคับประคองต่อความเครียดในหอบผื่นตั้งครรภ์ที่เป็น

เบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล(EFFECT OF SUPPORTIVE NURSING CARE ON STRESS OF

PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES DURING HOSPITALIZATION) คณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์ : สุปรารถ อัษฎาเสรี, ค.ม., ชุพิน จันทร์ศักดิ์, ค.ม., เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร, พ.ย.ค. 70 หน้า 1. ISBN

974-664-434-3

โรคเบาหวานเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในกลุ่มหอบผื่นตั้งครรภ์ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ โดยเฉพาะทางด้านจิตใจและอารมณ์ เมื่อหอบผื่นตั้งครรภ์ทราบว่าตนเป็นเบาหวานและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะก่อให้เกิดความเครียด

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาผลการพยาบาลแบบประคับประคองต่อความเครียดในหอบผื่นตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง คือหอบผื่นตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานที่เข้ารับการรักษาที่หน่วยมาตรการแพทย์ซ่อน หอผู้ป่วยตึกจุฬาภูมิ 8 เนื้อโรงพยาบาลศิริราชจำนวน 60 คน โดยคัดเลือกและแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน เป็นหอบผื่นตั้งครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานครั้งแรกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นครั้งแรกและไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ก่อขึ้น กลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลแบบประคับประคองเป็นเวลา 5 วันติดต่อกันส่วนกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามกิจวัตร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความเครียด แผนการพยาบาลแบบประคับประคอง กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มตอบแบบสอบถามและแบบวัดความเครียดก่อนและหลังการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวนหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน รวม โดยมีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

ผลการศึกษาพบว่า หอบผื่นตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานกลุ่มทดลองภายหลังได้รับการพยาบาลแบบประคับประคองมีความเครียดลดลง ต่ำกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามกิจวัตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<.001$)

ผลการศึกษาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรนำการพยาบาลแบบประคับประคองไปใช้หลังหอบผื่นตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานที่รับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อลดความเครียด