

4037384 SHMS /M : สาขาวิชา : สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข; ศก.ม.

(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)

คำสำคัญ : การรับรู้/แรงสนับสนุนทางสังคม/พฤติกรรมการบำบัดรักษาของผู้เสพยาบ้า
 นฤกร ธรรมเกษม : ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบำบัดรักษาของผู้เสพยาบ้า

FACTOR RELATED TO AMPHETAMINE DEPENDENCE TREATMENT BEHAVIOR :

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : อรทัย รวยอาจิณ, Ph.D., ปกรณ์ ศิริยง, M.P.H., สมบัติ
 ฤพพิตชัย, ศก.ม. 91 หน้า. ISBN 974-04-2348-5

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบำบัดรักษาของผู้เสพยาบ้าทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ โดยการวิจัยเชิงปริมาณและการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) จากผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาบ้าแบบผู้ป่วยในจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ และสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 200 ราย และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 6 ราย ได้ผลการวิจัยสรุปดังต่อไปนี้

ผู้เสพยาบ้าที่เข้ารับการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยในส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เกือบครึ่งหนึ่งว่างงาน งานที่ทำเป็นงานชั่วคราว รายได้เฉลี่ย 4,300 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่เสพยาบ้ามาเกินกว่า 2 ปี สาเหตุที่ทำให้เสพยาบ้าครั้งแรกเป็นเพราะเพื่อนชวน การเข้ารับการบำบัดรักษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นครั้งแรก และที่เข้ารับการบำบัดรักษาครั้งนี้เพราะต้องการเลิกเสพยาบ้าเอง ผู้เสพยาบ้าเข้ารับการบำบัดรักษาโดยแผนปัจจุบันและแผนโบราณ คละเคล้ากันไปประมาณครึ่งหนึ่ง

ผู้เสพยาบ้าที่เข้ารับการบำบัดรักษาส่วนใหญ่รับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเสพยาบ้า รับรู้ความรุนแรงของยาบ้าและรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันการเสพติดยาบ้าได้อย่างถูกต้อง และแรงสนับสนุนของครอบครัวและเพื่อนส่งผลให้ผู้เสพยาบ้าเข้ารับการบำบัดรักษายาบ้าทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ พฤติกรรมการบำบัดรักษายาบ้าแผนปัจจุบัน พบว่าผู้เสพยาบ้ามีพฤติกรรมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ วิธีการของสถานบำบัดรักษาค่อนข้างดีแตกต่างจากพฤติกรรมการบำบัดรักษาแผนโบราณพบว่าผู้เสพยาบ้าปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ วิธีการของสถานบำบัดรักษาค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยเสนอแนะให้ความรู้ความสำคัญแก่ครอบครัวและเพื่อนเพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้ผู้เสพยาบ้าเข้ารับการบำบัดรักษาให้สามารถเลิกเสพยาบ้าได้ และแนะนำให้มียาทดแทนในระยะแรกแก่ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาแผนโบราณ

4037384 SHMS /M : MAJOR : MEDICAL AND HEALTH SOCIAL SCIENCES : M.A.

(MEDICAL AND HEALTH SOCIAL SCIENCES)

KEY WORDS : PERCEIVE / SOCIAL SUPPORT / AMPHETAMINE DEPENDENCE
TREATMENT BEHAVIOR

NARUKORN THAMKASEM : FACTORS RELATED TO AMPHETAMINE
DEPENDENCE TREATMENT BEHAVIOR. THESIS ADVISORS : ORATAI RAUYAJIN,
Ph.D., PAKORN SIRIYONG, M.P.H., SOMBAT SUPPATCHAI, M.A. p.91 ISBN 974-04-
2348-5

The object of this survey was to study the factors affecting treatment behavior regarding both modern treatment and folk treatment. The methods used in this survey were both questionnaire and in-depth interview. The sample size consisted of 200 persons for questionnaire and 6 persons for in-depth interview. They asked the inpatients of Tanyaluk Hospital and Thamkabok Temple about amphetamine dependence.

In conclusion the sample mostly finished school at the secondary level 50 percent were unemployed and worked part-time, The average salary was 4,300 baht/month. They have abused amphetamines more for than 2 years. They first abused amphetamine on advise from a friend. Most are in the hospital for the first time. The reason for treatment was to quit.

Factor related to amphetamine dependence treatment

Furthermore the three main factors, which related to amphetamine dependence treatment, were socioeconomic, knowledge about drug abuse, and families and friends support. We found that there were no difference impact in socioeconomic and knowledge about drug abuse among the modern treatment and folk treatment. However, the last factor, willing of families and friends were the most important for treatment. In addition, the way of treatment in modern one was significant better than the folk one.

Finally, we recommended encouraging the families and friends of the drug abuser learn more on drug abuse knowledge and give more chance for them to treatment.