ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อชะลอภาวะกระดูกพรุนของสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือนเขต กรุงเทพมหานคร

FACTORS RELATED TO HEALTH PROMOTION BEHAVIORS FOR DELAYING OSTEOPOROSIS AMONG PRE-MENOPAUSAL WOMEN IN BANGKOK

สาวิตรี นิโรภาส 4736284 PHPH/M

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ Ph.D., นิรัตน์ อิมามี Ph.D., ธวัชชัย วรพงศธร Ph.D.

บทคัดย่อ

โรคกระดูกพรุน กำลังเป็นปัญหาที่สำคัญในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งพบ ปัญหามากในสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน การวิจัยเชิงสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อชะลอภาวะกระดูกพรุน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านการรับรู้กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อชะลอภาวะกระดูกพรุน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ประจำเคือน กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีวัยก่อนหมดประจำเคือน ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานกร ได้มาโดยวิธีการ สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 368 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบ สัมภาษณ์เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพเพื่อชะลอภาวะกระดูกพรุน ซึ่งผ่านการทดสอบ ความถูกต้องและหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือตามหลักวิชาการ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square test และ วิธีการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุขั้นตอน (multiple regression analysis)

ผลการศึกษา พบว่า

- ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อชะลอ ภาวะกระดูกพรุน (p = 0.284, 0.087 และ 0.499 ตามลำดับ) ส่วนการได้รับข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อชะลอภาวะกระดูกพรุน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.014)
- 2. การรับรู้ความสามารถตนเองเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อชะลอ ภาวะกระดูกพรุนสูงสุด รองลงมาได้แก่อายุ คัชนีมวลกาย และการรับรู้ความรุนแรงต่อภาวะกระดูกพรุน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.470, 0.197, -0.178 และ 0.165 ตามลำคับ และตัวแปร คังกล่าวสามารถร่วมกันทำนายความผันแปรของคะแนนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยก่อนหมด ประจำเดือนได้ ร้อยละ 32.70

คำสำคัญ: กระดูกพรุน/สตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน

126 หน้า

FACTORS RELATED TO HEALTH PROMOTION BEHAVIORS FOR DELAYING OSTEOPOROSIS AMONG PRE-MENOPAUSAL WOMEN IN BANGKOK

SAWITREE NIROPAS 4736284 PHPH/M

M.Sc. (PUBLIC HEALTH) MAJOR IN HEALTH EDUCATION AND BEHAVIORAL SCIENCE

THESIS ADVISORY COMMITTEE: MANIRAT THERAWIWAT, Ph.D., NIRAT IMAMEE, Ph.D., THAVATCHAI VORAPONGSATHORN, Ph.D.

ABSTRACT

Presently, osteoporosis, which has been found most among premenopausal women, is a major problem in various countries around the world including Thailand. This survey research aimed to study the factors relating to health promotion behaviors for delaying osteoporosis and the relationship of perception and health promotion behaviors for delaying osteoporosis in premenopausal women. The samples were composed of 368 premenopausal women residing in Bangkok Metropolis who were selected by employing a multi-stage sampling method. The instrument used for collecting data was the interviewing questionaires regarding factors relating to health promotion behaviors for delaying osteoporosis. This instrument has been academically tested for its correctness and reliability. The data were analyzed by computing the following statistics: percentage, arithmetic mean, standard deveiation, Chi-square test, and multiple regression analysis.

The results of the study showed that:

- 1. There was no significant relationship between educational level, occupation, income, and health promotion behaviors for delaying osteoporosis (p=0.284, 0.087, and 0.499). However, a significant relationship was found between receiving information and health promotion behaviors for delaying osteoporosis (p=0.014).
- 2. Perceived self-efficacy was found to influence health promotion behaviors for delaying osteoporosis, whereby the other factors that were found to influence health promotion behaviors were age, body mass index, and perceived severity of osteoporosis, Beta = 0.470, 0.197, -0.178, and 0.165 respectively. All of these factors together could be able to predict the variance of health promotion behaviors of premenopausal women at the predictability rate of 32.70 percent.

KEY WORDS: OSTEOPEROSIS / PREMENOPAUSAL WOMEN

126 pages