

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การรับรู้ของผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน (Warfarin) ในโรงพยาบาลยะลา
ผู้วิจัย	นายอำพล รังสิมาพงศ์
สาขา	สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปีการศึกษา	2549

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน ใน โรงพยาบาลยะลา 2) ศึกษาระดับการรับรู้ ของผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน ในโรงพยาบาลยะลา 3) ศึกษาระดับการเปิดรับการสื่อสารเกี่ยวกับยาวาร์ฟารินของผู้ป่วย ในโรงพยาบาลยะลา 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดรับการสื่อสาร กับ การรับรู้ของผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลยะลา 5) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการรับรู้ของผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน ในโรงพยาบาลยะลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นผู้ป่วยนอกที่มารับยาวาร์ฟารินจากกลุ่มงาน เกสัชกรรม โรงพยาบาลยะลา จำนวน 142 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าไค-สแควร์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และค่าสถิติแบบถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี นับถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น มีอาชีพแม่บ้าน ระยะเวลาการรับยาอยู่ในช่วง 1-12 เดือน มีการเปิดรับการสื่อสารอยู่ในระดับต่ำ มีการรับรู้เกี่ยวกับยาวาร์ฟาริน อยู่ในระดับปานกลาง และ มีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับดี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม คือ เพศและการศึกษามีความสัมพันธ์กับการรับรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระยะเวลาได้รับยา มีความสัมพันธ์กับการรับรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน อายุ ศาสนา และ อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 การเปิดรับการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้ และ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลยะลาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ เพศชาย และการเปิดรับการสื่อสาร มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 0.147

ปัญหาในการรับรู้เกี่ยวกับยาวาร์ฟาริน มีหลายประการ เช่น ต้องการข้อมูลมากขึ้น ประเภทของ ยา อาหาร และ สมุนไพร ที่ห้ามรับประทานร่วมด้วย ต้องการทราบอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ต้องการทราบภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น และต้องการทราบการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ข้อเสนอแนะ คือ อยากให้มีการแนะนำการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกวิธี อยากให้มีคลินิกพิเศษ และอยากให้แพทย์มีเวลาคุยกับผู้ป่วยมากขึ้น

Abstract

177501

Thesis Title : Perception of Patients used Warfarin in Yala Hospital
Researcher : Mr. Amphol Rungsimaphong
Degree : Master of Art (Social Sciences for Development)
Academic Year : 2006

The Purposes of this study were: 1) to study personal characteristics of patients used warfarin in Yala hospital ; 2) to study perception's level of patients used warfarin in Yala hospital ; 3) to study level of communication exposure of patients used warfarin used in Yala hospital ; 4) to study the relationship between personal characteristics, communication exposure and perception of patients used warfarin in Yala hospital and 5) to study problems and suggestions about perception of patients used warfarin in Yala hospital. Quota sampling was used to OPD's patient received warfarin from pharmacy department for 142 samples. Data were gathered from questionnaires. Computer program SPSS for windows was used in the analysis of survey data. Percentage, mean, standard deviation, Chi-square, Pearson product moment correlation and multiple regression analysis were presented in the finding.

The results of the analysis showed that most of the samples were females, ages between 41-50 years old, believed in Islam and education in elementary level. The majority of the samples were housewives, the duration of warfarin's receiving between 1-12 months, low levels of communication exposure, moderate perception's level of warfarin using and conducted themselves in satisfactory level.

In testing the formulated hypothesis, it was found that the independent variables were sex and education related to the dependent variable significantly at .05, time of receiving warfarin (anticoagulant) related to perception by significantly at .01. However age, religion and occupation related to perception by significantly at .05. Positive communication exposure related with perception and testing from the Multiple Regression Analysis showed that 2 factors might significantly affect perception of patients used warfarin in Yala hospital. There were sex (male) and communication exposure : title deed which coefficient of determination was 0.147.

Several problems of perception about warfarin were found, e.g. need more information. Some of drugs, food and herbs can not be taken, side effect of drug, the complication of the warfarin using and how to conduct themselves properly. Patients suggested that they need some counselling about how to use drug and practice, have counselling clinic and also have more time in seeing doctors.