229629

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สารนิพนธ์ / ง

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดทางจิตสังกมสำหรับเด็กสมาธิสั้น A SYNTHESIS OF RESEARCH ON PSYCHOSOCIAL THERAPY FOR CHILDREN WITH

ATTENTION DEFICIT/ HYPERACTIVITY DISORDERS

นุจรีย์ ภู่ระย้า 4937008 RAMH/M

พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

คณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์: พัชรินทร์ นินทจันทร์, Ph.D. (Nursing), สุธิคา มาสุธน, Ph.D. (Nursing)

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับ เด็กสมาธิสั้นโดยรวบรวมหลักฐานงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ มี งานวิจัยที่นำมาศึกษา 12 เรื่อง ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1) *วิธีการบำบัด*: พบว่าวิธีการบำบัดมีทั้งวิธีการ บำบัดกับเด็กสมาธิสั้นโดยตรง วิธีการบำบัดที่ส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดแลเด็กสมาธิสั้นและ วิธีการบำบัดที่ผสมผสานระหว่างเด็กสมาธิสั้นครอบครัว และโรงเรียน 2) *ผู้บำบัด*: อาจเป็นจิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา ครูการศึกษาพิเศษ นักกิจกรรมบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ หรือนักดนตรีบำบัด 3) กลุ่มตัวอย่าง: เป็นเด็กสมาธิสั้น อายุระหว่าง 4-16 ปี และมีสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผู้ปกครอง/ ผู้ดแล หลักของเด็กสมาธิสั้น และครู 4) *กิจกรรมที่ใช้ในการบำบัค*: ประกอบด้วย การใช้ศิลปะ การเสริมแรงด้วย เบี้ยอรรถกร การเล่นดนตรี การฝึกโยคะ การฝึกสมาธิ การฝึกทักษะทางสังคม การให้ความรู้ และการฝึก ทักษะให้กับครอบครัวและครูในการดูแลเด็กสมาธิสั้น 5) ระยะเวลา ความถี่และจำนวนครั้งในการบำบัด: พบว่า แต่ละครั้งใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง ความถี่ทุก 1- 2 สัปดาห์ จำนวนทั้งหมด 5-29 ครั้ง หรือขึ้นอย่กับ . ปัญหาของผู้ป่วย 6) *ผลลัพธ์ของการบำบัด:* เด็กสมาธิสั้นมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีขึ้น อาการสมาธิสั้น และ พฤติกรรมที่เป็นปัญหาลดลง มีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ปกครองและครูมีความรู้ ทัศนคติและทักษะในการดูแลเด็กสมาธิสั้นดีขึ้น มีระดับ ความเครียดน้อยลง ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปประชุกต์ใช้ในการดูแลเด็กสมาธิสั้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กำสำคัญ : การบำบัดทางจิตสังคม / เด็กสมาธิสั้น

228 หน้า

229629

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิคล

สารนิพนธ์ / จ

A SYNTHESIS OF RESEARCH ON PSYCHOSOCIAL THERAPY FOR CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT/ HYPERACTIVITY DISORDERS

NUCHAREE PURAYA 4937008 RAMH/M

M.N.S. (MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING)

THEMATIC PAPER ADVISORY COMMITTEE: PATCHARIN NINTACHAN, Ph.D. (NURSING), SUTHIDA MASUTHON, Ph.D. (NURSING)

ABSTRACT

The present study aimed at synthesizing research on psychosocial therapy for children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorders (ADHD). Existing research studies were searched and retrieved from electronic databases and information sources. A total of 12 studies were selected. The findings of the studies could be divided into six categories as follows: 1) Therapy methods: It was found that there were therapies conducted directly with the children with ADHD, therapies which promoted family participation in care of children with ADHD, and therapies which involved children with ADHD, family, and school. 2) Therapists: The persons who performed the therapy could be psychiatrists, psychiatric nurses, psychologists, special education teachers, activity therapists, social workers, or music therapists. 3) Clients: The clients were ADHD children with normal intellectual ability and ranging in age from 4 to 16 years old, along with their parents/ caregivers and teachers. 4) Activities: The activities used in the therapy included art, reinforcement, music, yoga, meditation, social skill practices, dissemination of knowledge and caregiving skill practices for teachers and family of children with ADHD. 5) Duration, frequency, and number of therapy: Each therapy session lasted from one to two hours and was conducted every week or every other week. The therapy sessions were conducted for five to 29 times in total, depending on the problems of children with ADHD. 6) Outcomes: Children with ADHD had better learning outcomes, the ADHD symptoms and problematic behaviors were reduced, and they had better ability to carry out daily living activities and improved social skills. Furthermore, their parents and teachers had better knowledge and skills and more positive attitudes toward caregiving of children with ADHD, so they had less stress. It can be concluded from the study findings that the knowledge derived in this study could be subsequently applied to more effectively provide care to children with attention deficit/hyperactivity disorders.

KEY WORDS: PSYCHOSOCIAL THERAPY / CHILDREN / ADHD / ATTENTION DEFICIT / HYPERACTIVITY DISORDERS

228 pages