

อัมมันดา ไชยกัญจน์. 2549. ปัญหา และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการคุ้มครองคุ้ม
แอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี.

วิทยานิพนธ์ปริญญาสาขาวรรณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. [ISBN 974-626-871-6]

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วงศ์ เลาหศิริวงศ์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัวบทว่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา และ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองคุ้มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 ในอำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี จำนวน 273 คน เก็บข้อมูลระหว่าง เดือนมกราคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2549
โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ คือ Chi – square Test และช่วงเชื่อมั่น 95 %

ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนร้อยละ 29.7 คุ้มแอลกอฮอล์ เมื่อแยกตามเพศ พบร้า นักเรียน
ชายคุ้มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 59.2 นักเรียนคุ้มแอลกอฮอล์ครั้งแรกเฉลี่ย อายุ 14.81 ปี (SD. = 1.79)
เครื่องคุ้มแอลกอฮอล์ที่นักเรียนเริ่มคุ้มครั้งแรกมากที่สุด คือ เบียร์ ร้อยละ 55.6 รองลงมา คือ ไวน์
(ร้อยละ 25.9) สาเหตุที่คุ้มอันดับแรก คือ อยากลอง (ร้อยละ 64.2) รองลงมา คือ คุ้มในงานเลี้ยง และ
เพื่อนชักชวน (ร้อยละ 18.5 และ 14.8) ตามลำดับ เครื่องคุ้มแอลกอฮอล์ที่นักเรียนส่วนใหญ่คุ้มใน
ปัจจุบัน คือ เบียร์ (ร้อยละ 67.9) รองลงมา คือ ไวน์และสุรา (ร้อยละ 21.0 และ 9.9) เหตุผลที่
นักเรียนยังคุ้มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน คือ เพื่อเข้าสังคม(ร้อยละ 37.0) รองลงมา คือ เพื่อนชักชวน
และ ติดใจในรสชาติ (ร้อยละ 23.5 และ 18.5) ส่วนใหญ่นักเรียนจะคุ้มแอลกอฮอล์กับเพื่อน (ร้อยละ
77.8) และคุ้มกับญาติ (ร้อยละ 12.3) โดยการที่คุ้มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่คุ้มในงานเลี้ยงสังสรรค์
ระหว่างเพื่อน (ร้อยละ 65.4) รองลงมา คือ เทศกาล งานต่างๆ (ร้อยละ 21.0) นักเรียนร้อยละ 20.2 ที่
คุ้มมีการใช้สารเสพติดร่วมด้วย สารเสพติดที่ใช้ร่วมกับการคุ้มแอลกอฮอล์ คือ บุหรี่ (ร้อยละ 19.8)
นักเรียนที่คุ้มแอลกอฮอล์มากกว่า 1 ปี (ร้อยละ 61.7) รองลงมาคือน้อยกว่า 3 เดือน (ร้อยละ 17.3)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคุ้มแอลกอฮอล์ของนักเรียนคือทัศนคติต่อการคุ้มแอลกอฮอล์
อิทธิพลของเพื่อน และ อิทธิพลจากสื่อ โฆษณา แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้ม
เครื่องคุ้มแอลกอฮอล์ที่นักเรียนเสนอ คือต้องรู้จักการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้คุ้ม การสร้างความรัก
ความอบอุ่นในครอบครัว การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ครอบครัวควรให้ความสำคัญกับการ
ควบคุมพฤติกรรมการคุ้มแอลกอฮอล์ของบุตร และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร

Amanda Chaikan. 2006. Problems and Measures in Solving and Preventing Alcohol Consumption Among High School Students in Muang District, Pathumthani Province. Master of Public Health Thesis in Public Health Administration, Graduate School, Khon Kaen University. [ISBN 974-626-871-6]

Thesis Advisor: Asst. Prof. Dr. Wongsa Laohasiriwong

ABSTRACT

The descriptive cross – sectional study aimed to identify problems and measures in solving and preventing alcohol consumption among high school students. Two hundred and seventy three student in secondary school grade 4, 5 and 6 Students in a school in Muang District, Pathumthani Province were responded to self reported questionnaire. This study was carried out from January to February 2005. The data was analyzed for descriptive statistics of frequency, percentages, mean, standard deviation, median, min, max and using inferential statistics of Chi-square, Odd Ratio(OR) and 95% confidence interval.

The result showed that 29.7 % of students were alcohol drinkers, of which 59.2% were male. More than half of drinkers had average age at first time drinking episode of 14.81 years old (S.D =1.79). Most of them drank beer (55.6%) at the first drink followed by wine (25.9 %). Main reasons for the first drinking were trying (64.2 %) followed by ceremony and persuasion of friends (18.5 % and 14.8 % respectively). Most of these student drinkers were mostly drank beer (67. 9%) followed by wine and whiskey (21.0 % and 9.9 % respectively). Reasons for present drinking were socialized (37.0%), friend's persuasion (23.5%) and taste 18.5% respectively). Most of these students drank alcohol with friends (77.8%) and relatives (12.3 %). Occasion of alcohol drinking were socialized with friends (65.4%) and festival (21.0%). About 20 percent of these students used illicit drug while drank alcohol 20.2%. About 19.8 percent of them smoke cigarette (19.8%). More than half of the drinking (61.7%) have been drinking for more than 1 years and 17.3 % just been drinking less than 3 months. Factors associated with alcohol consumption were attitude toward alcohol consumption, influence of friend and the influence of information received from media. Students' recommendation for solving and preventing alcohol consumption were, say no to alcohol from any persuasion, family's bonding, appropriate recreation activities Family should play key role in caring and being a role model for their offspring.