

การวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (i) ประเมินประสิทธิผลสัมพัทธ์ของเทอร์ปีนชนิดต่างๆ (menthol, thymol, carvacrol, menthone และ cineole) ในการเป็นสารเพิ่มการซึมผ่านทางไขมัน ของผิวหนัง (ii) ประเมินสิ่งแวดล้อม ณ ตำแหน่งที่สารเพิ่มการซึมผ่านออกฤทธิ์ในผิวหนังมนุษย์ชั้น ออพิเดอร์มิส (iii) ทดสอบสมมุติฐานที่ได้ศึกษามาเรื่อง “กลไกการออกฤทธิ์สารเพิ่มการซึมผ่าน ผิวหนัง” กับสารกลุ่มใหม่ คือ กลุ่มเทอร์ปีน และ (iv) ศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เรื่อง กลไกการออก ฤทธิ์ของเทอร์ปีนในการเป็นสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง ผลการทดลองของการนำส่งยาผ่านผิวหนัง พบว่าเทอร์ปีนเป็นกลุ่มสารที่มีประสิทธิผลในการเป็นสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังสำหรับสารกลุ่มที่ ขอบไขมัน ความแรงของการเป็นสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังของ menthol, thymol, carvacrol และ menthone เท่าเทียมกัน และมีความแรงมากกว่า cineole เมื่อเปรียบเทียบจากความเข้มข้นของ เทอร์ปีนดังกล่าวในรูปสารละลายใน diffusion cell chamber จากความเข้มข้นของสารเพิ่มการซึม ผ่านในผิวหนังชั้นสตราตัมคอร์ร์เนียมพบว่าความแรงที่แท้จริงของสารกลุ่มเทอร์ปีนนี้คล้ายคลึงกับ สารกลุ่มน้ำ n-alkanol และ n-alkylphenyl alcohol แต่สูงกว่า branched-chain alkanol ให้ ข้อเสนอแนะกลไกการออกฤทธิ์ของเทอร์ปีนในการเป็นสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังคล้ายคลึงกับสาร เพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่ได้ศึกษามาแล้ว ได้แก่ n-alkyl alcohols และการเพิ่มประสิทธิผลการ กระจายตัวต่อ β -estradiol ในผิวหนังของเทอร์ปีนสนับสนุนว่ากลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิผล การกระจายตัวของยาในผิวหนัง ความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์การกระจายตัวของเทอร์ปีนในน้ำ และผิวหนังชั้นสตราตัมคอร์ร์เนียม ($K_{\text{intercellular lipid/PBS}}$) กับค่าสัมประสิทธิ์การกระจายตัวของเทอร์ปีน ในน้ำและ octanol ($K_{\text{octanol/water}}$) อุบัติขึ้นเดียวกันของ 1-octanol และ 4-octanol แสดงให้เห็นว่า สิ่งแวดล้อม ณ ตำแหน่งที่เทอร์ปีนออกฤทธิ์เป็นสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังสามารถแสดงได้ด้วย น้ำ และ octanol จากผลการศึกษานี้สนับสนุนงานวิจัยผ่านมา

The present study was aimed at (i) assessing the relative effectiveness of various terpenes (menthol, thymol, carvacrol, menthone, and cineole) as skin permeation enhancers on drug transport across the stratum corneum (SC) lipoidal pathway, (ii) determining the environment of the site of enhancer action of the terpenes in human epidermal membrane (HEM), (iii) testing the previous hypotheses "Mechanism of action of chemical enhancers as skin permeation enhancers" with a new class of chemical enhancers—terpenes—and (iv) gaining additional insights into the skin permeation enhancing mechanisms of the terpenes. The results in the transport experiments suggest that the terpenes are effective in enhancing the permeation of lipophilic compounds. The enhancer potencies of menthol, thymol, carvacrol and menthone are essentially the same and higher than that of cineole based on their aqueous concentration in the diffusion cell chamber. The intrinsic potencies of the terpenes are similar to those of the n-alkanol and the n-alkylphenyl alcohol and higher than those of the branched-chain alkanol based on their concentration in the stratum corneum (SC), suggesting that the mechanisms of action of the terpenes are similar to the previously studied enhancers such as the n-alkyl alcohols. The β -estradiol data are consistent with drug partitioning enhancement being a major mechanism of terpenes to enhance skin permeation. The aqueous-to SC partition coefficients ($K_{\text{intercellular lipid/PBS}}$) vs. the octanol-PBS partition coefficients ($K_{\text{octanol/water}}$) values for the terpenes fall in the same range as those of 1-octanol and 4-octanol. This suggests that the microenvironment of the studied terpenes is well-mimicked by liquid n-octanol. The findings in the present study for the oxygen-containing terpenes, within the variability of the data, are generally consistent with those observed previously, which continues to support the hypotheses made in our previous studies on the mechanism of action of permeation enhancers.