

วัตถุประสงค์เพื่อประเมินระยะเวลาและความต้องการอุณหภูมิสะสมในการออกดอกของข้าวโพดหวาน การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำตาลและความหวาน (%brix) เพื่อประเมินวันเก็บเกี่ยวที่ทำให้ผลผลิตของข้าวโพดและความหวานที่มีความเหมาะสมที่สุดเมื่อปลูกในสองฤดู คือ ฤดูฝน (8 มิถุนายน ถึง 24 สิงหาคม 2547) และฤดูหนาว (23 พฤศจิกายน 2547 ถึง 1 มีนาคม 2548) การทดลองทำที่สถานีวิจัยการเกษตรเขตพื้นที่ทางภาคใต้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วางแผนการทดลองแบบ spit plot in RCB ทำซ้ำ 3 ครั้ง main plot ประกอบด้วย ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ AT55, HIBRIX10 และพันธุ์ CABARET sub plot ประกอบด้วยระยะเก็บเกี่ยวที่ 12, 15, 18, 20, 22 และ 24 วันหลังออกใหม่ การทดลองพบว่า ข้าวโพดหวานทุกพันธุ์ ใช้ระยะเวลาในการออกเท่ากัน ในทั้งสองฤดูปลูก สำหรับระยะของการตัวผู้และระยะออกใหม่ พันธุ์ CABARET ใช้เวลาเร็วที่สุด จึงมีอุณหภูมิสะสมถึงระดับดังกล่าวน้อยที่สุด ส่วนพันธุ์ HIBRIX10 ใช้เวลานานที่สุด จึงมีอุณหภูมิสะสมมากที่สุด ข้าวโพดที่ปลูกในฤดูฝนจะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าในฤดูหนาว จากการวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลและความหวาน พบว่า ในฤดูฝน วันเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของพันธุ์ คือที่ 17-20 วันหลังออกใหม่ โดยพันธุ์ AT55 มีปริมาณ reducing sugar และค่าความหวานเฉลี่ยเท่ากับ 10.8-11.3 mg/g และ 15-15.3 %brix ตามลำดับ พันธุ์ HIBRIX10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.5-11.1 mg/g และ 14.8-14.9 %brix ส่วนพันธุ์ CABARET มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.2-11.1 mg/g และ 15.8-16 %brix สำหรับฤดูหนาว วันเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของทุกพันธุ์ คือที่ 18-21 วันหลังออกใหม่ โดยพันธุ์ AT55 มีปริมาณ reducing sugar, ค่าความหวานและน้ำตาลซูโคสเฉลี่ยเท่ากับ 11.2-11.3 mg/g, 14.8-15.2 %brix และ 67.7-77 mg/ml ตามลำดับ พันธุ์ HIBRIX10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.6-11.2 mg/g, 14.8-14.9 %brix และ 57-60.6 mg/ml ส่วนพันธุ์ CABARET มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.9-11.5 mg/g, 15.3-15.7 %brix และ 105-111.1 mg/ml โดยพันธุ์ HIBRIX10 เมื่อปลูกในฤดูหนาว จะให้ผลผลิตฝัก硕ทั้งเปลือกต่ำกว่าในฤดูฝน ในขณะที่อีกสองพันธุ์มีค่าไกล์เคิงกันในสองฤดูปลูก แต่ในทุกพันธุ์จะให้ผลผลิตฝัก硕ปอกเปลือกในฤดูหนาวน้อยกว่าฤดูฝน

Abstract

180464

The objective is to evaluate the time requirement and growing-degree days for flowering of sweet corn; variation of sugars and sweetness (%brix) and harvesting time that would produce yield with an optimum sweetness of three sweet corn hybrids grown in two seasons, i.e. rainy season (8 June–24 August 2004) and winter season (23 November 2004–2 March 2005). The experiment was carried out at Multiple Cropping Center, Faculty of Agriculture, Chiangmai University. The layout of the experiment was a split plot with three replications; the main plot was cultivars (ATS5, HIBRIX10, and CABARET), and the subplot consisted of harvesting time (12, 15, 18, 20, 22, and 24 days after silking). The results showed that time to emergence was the same for all cultivars in both planting dates; for time to taselling and silking, CABARET had the shorter time, thus lowest growing-degree days; whereas HIBRIX10 had the longest time, and thus highest heat accumulation. All the hybrids grown in the rainy season grew faster than that in the winter. The evaluation of the levels of sweetness and other components of sugar showed that in the rainy season the appropriate harvesting times would range from 17 to 20 days after silking: ATS5 had the average reducing sugar and sweetness of 10.8-11.3 mg/g and 15-15.3 %brix, respectively; HIBRIX10 had 10.5-11.1 mg/g and 14.8-14.9 %brix; and CABARET had 10.2-11.1 mg/g and 15.8-16 %brix. For winter planting date, the harvesting time of all hybrids was between 18 and 21 days after silking: ATS5 had reducing sugar, %brix, and sucrose content of 11.2-11.3 mg/g, 14.8-15.2 %brix and 67.7-77 mg/ml, respectively; HIBRIX10 had 10.6-11.2 mg/g, 14.8-14.9 %brix and 57-60.6 mg/ml; and CABARET had 10.9-11.5 mg/g, 15.3-15.7 %brix and 105-111.1 mg/ml. HIBRIX10 hybrid grown in the winter had lower corn yield (with husk) than in the rainy planting date, whereas the other two hybrids had about the same yield in both planting dates. However, all hybrids produced lower yield (without husk) in the winter planting date.