

บทคัดย่อ

180847

โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับหนึ่งในสตรีไทย และมีอุบัติการณ์ของโรคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งๆที่โรคนี้น่าสามารถป้องกันได้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก กลุ่มตัวอย่างเป็นแรงงานสตรีที่ทำงานโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และไคสแควร์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัย พบว่า แรงงานสตรีส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกไม่ถูกต้อง ในระดับปฐมภูมิ (ร้อยละ 70.8) ในทุก ๆ ด้าน และในระดับทุติยภูมิ คือ การไม่ไปตรวจหาเซลล์ผิดปกติของปากมดลูกหรือแพปสเมียร์ ถึงร้อยละ 92.0 มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องใกล้เคียงกัน ด้านความสัมพันธ์ พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการรับรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากการวิจัย ยังพบอีกว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก และการรับรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ระดับปฐมภูมิ และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ระดับทุติยภูมิ

ผู้วิจัยเสนอแนะให้นุคลากรในทีมสุขภาพ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก แก่แรงงานสตรีด้วยวิธีการต่างๆที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อย่างสม่ำเสมอ และจัดบริการตรวจเซลล์ผิดปกติของปากมดลูกหรือแพปสเมียร์ ให้แก่แรงงานสตรีสามารถได้รับการตรวจอย่างครอบคลุม

ABSTRACT

180847

The incidence of cervical cancer is the highest among all type of cancer among Thai women. Although preventive means can be taken, the incidence of the disease is still increasing. This research is designed to identify both primary and secondary preventive health behavior cervical cancer and relationship between some select factors and preventive health behavior cervical cancer. The subject were 400 randomly chosen female factory workers in the Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province. The data were collected by interview technique with the structured questionnaire that was made by researcher. Percentage, Pearson Product Moment Correlation Coefficient and chi-square and Multiple Regression were employed for data analysis.

The results show that the subjects had undesirable health behavior in cervical cancer prevention. The majority of female factory workers in the Northern Region Industrial Estate, Lamphun possessed undesirable primary (70.8%) and secondary (92.0%) preventive health behavior. The perception of cervical cancer was correct (54.0%) and incorrect (46.0%). There were significant relationships between information known about cervical cancer and primary and secondary prevention. The perception of cervical cancer was statistically related to primary prevention

From researching, it found that receiving information about cervical cancer protection and the perception of cervical cancer affected to the behavior of the primary cervical cancer prevention, and receiving information about cervical cancer prevention affected to the behavior of the secondary cervical cancer protection.

Regarding the research finding, it is recommended that health teams should be encouraged to provide more information concerning cervical cancer and pap smear service for female factory workers to encourage them to continuously perform preventive health behavior.