

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสำนึกในคุณค่าแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคจิตจากสารแอมเฟตามีน ก่อนและหลัง ได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ป่วยโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนที่เข้ารับการรักษารูปแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีธัญญา ระหว่างเดือน เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2548 ได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจง ตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น โดยได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบวัดความสำนึกในคุณค่าแห่งตน แบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเอง และแบบประเมินแหล่งพลังอำนาจ ซึ่งมีค่าความเที่ยง เท่ากับ .79 และ .87 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบที (t-test)

ผลการศึกษาที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. คะแนนความสำนึกในคุณค่าแห่งตนของผู้ป่วยโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนหลัง ได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ ($\bar{X} = 113.65$, S.D. = 8.91) สูงกว่าก่อนได้รับ โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ ($\bar{X} = 85.70$, S.D. = 7.65) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ($t = 11.80$)
2. คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคจิตจากแอมเฟตามีนหลัง ได้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ ($\bar{X} = 4.16$, S.D. = .27) สูงกว่าก่อนได้รับ โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจ ($\bar{X} = 3.27$, S.D. = .53) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ($t = 9.76$)

The purpose of this study was to compare the score's on self-esteem and self-care behaviors of amphetamine induced psychosis patients in Srithanya Hospital before and after the utilization of the empowerment program. The subjects composed of 20 amphetamine induced psychosis patients who met the inclusion criteria and were admitted to the inpatient department of Srithanya Hospital during April to May 2004. The study instrument was the program of empowerment that was developed by the researcher and validated for content validity by experts. There were 3 instruments used for data collecting; the questionnaire of self-esteem, the questionnaire of self-care behaviors, and the questionnaire of Empowerment Resource. The internal consistency reliability of these instruments were .79, .87 and .87 respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and t- test.

The results of this study were as follow:

1. The self-esteem score of amphetamine induce psychosis patients after the utilization of the empowerment program were significantly higher ($\bar{X} = 113.65$, S.D. = 8.91) than before ($\bar{X} = 85.70$, S.D. = 7.65) at p-value .05 ($t = 11.80$).
2. The self-care behaviors scores of amphetamine induce psychosis patients after the utilization of the empowerment program were significantly higher ($\bar{X} = 4.16$, S.D. = .27) than before ($\bar{X} = 3.27$, S.D. = .53) at p-value .05 ($t = 9.76$).