การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิ่งบรรยาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการปรับตัวต่อการเจ็บปวยของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง แผนกผู้ปวยนอก และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการเจ็บปวย การรับรู้เกี่ยวกับการ เจ็บปวย การรับรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาของครอบครัวต่อการเจ็บปวย การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้เกี่ยวกับการบริการสุขภาพ การแชิญปัญหาแบบมุ่งเก้ไขปัญหา การเชิญปัญหาแบบมุ่งปรับอารมณ์ กับการปรับตัวต่อการเจ็บปวยของผู้สูงอายุโรค เรื้อรังแผนกผู้ปวยนอก กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปวยสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรังที่มารับการรักษาในแผนกผู้ปวยนอกโรงพยาบาลประจำ จังหวัด เขตภาคใต้ตอนบน จำนวน 140 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับการเจ็บปวย การรับรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาของครอบครัวต่อการเจ็บปวย การ สนับสนุนทางสังคม การรับรู้เกี่ยวกับการบริการสุขภาพ การเชิญบัญหาแบบมุ่งแก้ไขบัญหา การเหนิญบัญหาแบบมุ่งปรับ อารมณ์ และแบบสอบถามการปรับตัวต่อการเจ็บป่วย ผ่านการตรวจลอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หาความเที่ยงโดยวิธีสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ .84, .69, .87, .85, .91, .74 และ .91 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเลลี่ย ร้ายละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์ของเพียร์สังนิ

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

- 1. การปรับตัวต่อการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังแผนกผู้ป่วยนอกโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง $(\overline{x}=$ 1.91)
- 2. อายุมีความสัมพันธ์ทางลบกับการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 (r = .214)
- เพศ ระยะเวลาในการเจ็บป่วย การรับรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วย การเผชิญปัญหาแบบมุ่งปรับอารมณ์ ไม่มี
 ความสัมพันธ์กับการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังแผนกผู้ป่วยนอก
- 4. ระดับการศึกษา การรับรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาของครอบครัวต่อการเจ็บปวย การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ เกี่ยวกับการบริการสุขภาพ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวต่อการเจ็บปวยของ ผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (C = .344, r = .527, .280, .384, .240, ตามลำดับ)

The purposes of this descriptive research were to study the adjustment to illness of chronically ill elderly patients and the relationships between age, sex, education, length of illness, perception of illness, perception of family reaction to illness, social support, perception of health service, problem - focused coping, emotional -focused coping and adjustment to illness of chronically ill elderly patients at out patient department. Subject consisted of 140 chronically ill elderly patients at out patient department in Provincial hospital, Upper Part of Southern Region and was selected by multi-stage random sampling technique. Research instruments were demographic questionnaires, perception of illness, perception of family reaction to illness, social support, perception of health service and problem-focused coping, emotional - focused coping and adjustment questionnaires which were tested for content validity and reliability. The reliability were .84, .69, .87, .85, .91, .74 and .91 respectively. Data were analyzed using statistic methods, including mean, percentage, standard deviation, Biserial correlation, Chi – square and Pearson's correlation.

Major findings were as follows:

- 1. Adjustment to illness of chronically ill elderly patients at out patient department was at moderate level. $(\bar{x}=1.91)$
- 2. Age was significantly negative correlated with adjustment to illness of chronically ill elderly patients at level of .05 (r = .214)
- 3. Sex, length of illness, perception of illness and emotional focused coping were not correlated with adjustment to illness of chronically ill elderly patients at out patient department.
- 4. Education, perception of family reaction to illness, social support, perception of health service, problem focused coping were significantly positive correlated with adjustment to illness of chronically ill elderly patients at out patient department at level of .05 (C = .344, r = .527, .280, .384, .240 respectively)