

การประยุกต์ใช้แกนกระบอกฉีดยาตามภายในโพรงกระดูกเพื่อรักษากระดูกหักในสัตว์ปีก



นางสาวมธุ บำรุงคุณากร

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2549

ISBN 974-14-2582-1

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**APPLICATION OF TUBERCULIN SYRINGE PLUNGER FOR THE
INTRAMEDULLARY FIXATION OF AVIAN FRACTURE**



Miss Mathu Bumrungkunakorn

**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**
A thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science Program in Veterinary Surgery

Department of Veterinary Science

Chulalongkorn University

Acedemic Year 2006

ISBN 974-14-2582-1

Copyright of Chulalongkorn University

490248

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การประยุกต์ใช้แกนกระดูกซี่โครงตามภายในโพรงกระดูกเพื่อรักษากระดูกหักในสัตว์ปีก
โดย	นางสาว มธุ บำรุงคุณากร
สาขาวิชา	สัตวศาสตร์ทางสัตวแพทย์
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. กัมปนาท สุนทรวีภาต
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ อติชาติ พรหมมาสา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทบัณฑิต

..... คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
(ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อรรถพร คุณาวงษ์ภักดิ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วรพันธุ์ ณ สงขลา)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. กัมปนาท สุนทรวีภาต)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ อติชาติ พรหมมาสา)

..... กรรมการ
(ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. มาริษค์กร์ กัลล์ประวิทย์)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. อนุเทพ รังสีพิพัฒน์)

มรุ บำรุงคุณากร : การประยุกต์ใช้แกนกระดูกนดึยตามภายในโพรงกระดูกเพื่อรักษากระดูกหักในสัตว์ปีก. (APPLICATION OF TUBERCULIN SYRINGE PLUNGER FOR THE INTRAMEDULLARY FIXATION OF AVIAN FRACTURE): อ. ที่ปรึกษา ผศ.นสพ. ดร. กัมปนาท สุนทรวินาต, อ. ที่ปรึกษาร่วม ศ.นสพ. อติชาต พรหมาสา, 63 หน้า. ISBN 974-14-2582-1.

การวิจัยนี้ศึกษาในไก่ไข่เพศผู้จำนวน 19 ตัว ซึ่งเป็นตัวแทนของสัตว์ปีก ไก่ทุกตัวได้รับการวางยาสลบและเปิดผ่าบริเวณส่วนของหน้าแข้งด้วยเทคนิคการปลอดเชื้อเพื่อให้เกิดการหักของกระดูกทึบิโธทาร์ซัสด้านขวาบริเวณ 1/3 จากปลายล่าง แบ่งไก่ออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อรักษากระดูกหักโดยใช้วัสดุยึดตรึงในโพรงกระดูก กลุ่มที่ 1 (10 ตัว) รักษาโดยใช้แกนกระดูกนดึยตามภายในโพรงกระดูกและใส่แท่งเหล็กเล็ก ๆ ตรึงขวางกระดูกและแกนกระดูกนดึย และกลุ่มที่ 2 (9 ตัว) ยึดตรึงกระดูกโดยใช้แท่งเหล็กไม่เป็นสนิมยึดตามภายในโพรงกระดูก ประเมินผลการวิจัยจากการใช้ขาของไก่ การตรวจทางรังสีวิทยา และการตรวจตัวอย่างทางจุลพยาธิวิทยา จากการประเมินผลดังกล่าวพบว่าไก่กลุ่มที่ 1 ทุกตัวสามารถใช้ขาลงน้ำหนักได้อย่างปกติที่ 12 สัปดาห์ ส่วนการประเมินผลจากภาพถ่ายทางรังสีวิทยาในแต่ละสัปดาห์พบการต่อติดของกระดูกที่หักอย่างสมบูรณ์ในไก่ทุกตัวที่ 10 สัปดาห์และมีการต่อติดของกระดูกอย่างปกติในไก่กลุ่มที่ 1 สำหรับไก่กลุ่มที่ 2 มีการต่อติดของกระดูกอย่างปกติยกเว้นไก่ 1 ตัวที่พบการติดเชื้ที่โพรงกระดูกในสัปดาห์ที่ 4 ภายหลังการทำศัลยกรรม การวิเคราะห์ผลทางสถิติพบการใช้ขาของไก่ทั้งสองกลุ่มที่ 8 สัปดาห์แตกต่างกันมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) สำหรับสัปดาห์ที่ 4, 10, 12 และ 48 พบการใช้ขาของไก่ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) การวิเคราะห์ผลทางสถิติเปรียบเทียบการต่อติดของกระดูกในไก่ทั้งสองกลุ่ม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นกัน ($p < 0.05$) จากการศึกษาดังกล่าว ไก่ทั้งสองกลุ่มพบการต่อติดของกระดูก และการใช้ขาของสัตว์ที่ใกล้เคียงกันโดยไก่กลุ่มที่ 1 ไม่พบปฏิกิริยาต่อต้านใดๆของร่างกายต่อแกนกระดูกนดึย รวมทั้งไม่พบการติดเชื้ในโพรงกระดูก ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า การใช้แกนกระดูกนดึยตามภายในโพรงกระดูก สามารถใช้เป็นทางเลือก ในการรักษากระดูกทึบิโธทาร์ซัสหักได้

ภาควิชา ศัลยศาสตร์
สาขาวิชา ศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์
ปีการศึกษา 2549

ลายมือชื่อณิสิต.....
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

4775571131 : MAJOR VETERINARY SURGERY

KEY WORD: INTRAMEDULLARY POLYPROPYLENE ROD FIXATION/ AVIAN FRACTURE/
TUBERCULIN SYRINGES

MATHU BUMRUNKUNAKORN : APPLICATION OF TUBERCULIN SYRINGE
PLUNGER FOR THE INTRAMEDULLARY FIXATION OF AVIAN FRACTURE.
THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. KUMPANART SOONTORNVIPART, D.V.M., Ph.D.,
THESIS CO-ADVISOR : PROF. ATICHAT BRAHMASA, D.V.M., M.S., 63 pp. ISBN 974-
14-2582-1.

Fractures at the distal third of right tibiotarsus were surgically induced under general anesthesia in 19 layer chicken which were divided into 2 groups. Tibiotarsal fracture of chicken in group 1 (n = 10) was intramedullary stabilized with tuberculin syringe plunger whereas group 2 (n = 9) was stabilized with intramedullary pin. Clinical outcomes, as investigated by limb function, radiological and histopathological evaluations at 4, 8, 10, 12 and 48 week postoperatively showed normal bone healing in every individual except one chick in group 2 which showed osteomyelitis in week 4 postoperatively. All chicken had complete weight bearing in 12 weeks and complete radiological bone healing in 10 weeks. There were no statistical significance in the gait and radiological evaluations between groups, however at eight week of gait evaluation, chicken in group 1; gait evaluation in 8 weeks had significantly better lameness score than those in group 2 ($P < 0.05$). It may be concluded that tuberculin syringe plunger had less stability and axial load shearing than intramedullary pin. Bone stabilized with tuberculin syringe plunger had normal bone healing and limb functions the same as bone stabilized with stainless steel pin. Moreover, tuberculin syringe plunger did not induced bone reaction and osteomyelitis. Tuberculin syringe plunger appears to represent an alternative for the repaired of tibiotarsal avian fracture.

Department Veterinary Surgery
Field of Study Veterinary Surgery
Academic Year 2006

Student's Signature... *Mathu Bumrungkunakorn*
Advisor's Signature... *K. Soontornvipart*
Co-advisor's Signature... *Atichat Brahmasa*

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก ศาสตราจารย์ น.สพ. อติชาติ พรหมาสา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. กัมปนาท สุนทรวิภาต ที่ได้กรุณาช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ มาโดยตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. มาริยศักดิ์ กัลป์ประวิทย์ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. อนุเทพ รังสีพิพัฒน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. วรพันธุ์ ฌ สงขลา คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาใช้เวลาให้คำแนะนำ ทำให้วิทยานิพนธ์มีคุณค่าและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ อัจฉรา ธวัชสิน ที่กรุณาใช้เวลาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องสถิติ ทำให้วิทยานิพนธ์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณอาจารย์ ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการทำวิจัย

ขอขอบคุณ คุณ รังสิมา ทิมอรุณ บุคลากรห้องผ่าตัด ห้องตรวจโรค ห้องเอ็กซเรย์ และ ห้องธุรการ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกๆท่าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยครั้งนี้

ขอขอบคุณ สพ.ญ. พัลลภา ว่องเสริมบุญชัย ที่ให้ความช่วยเหลือและและให้กำลังใจ มาโดยตลอด

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ สมาชิกในครอบครัว และเพื่อนๆทุกคน ที่ให้กำลังใจ และสนับสนุนการทำวิจัยครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ช
สารบัญภาพ.....	ฉ
บทที่	
1. บทนำ	
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	2
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย.....	2
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
2.1 สาเหตุของโรค.....	3
2.2 อาการของโรค.....	4
2.3 การตรวจวินิจฉัยโรค.....	4
2.4 การรักษาโรค.....	5
3. ระเบียบวิธีวิจัย.....	22
3.1 ขั้นตอนการทำศัลยกรรม.....	22
3.2 การประเมินผล.....	29
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล.....	30
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	31
4.1 ผลการศึกษา.....	31
5. อภิปรายผล.....	35
รายการอ้างอิง.....	42
ภาคผนวก.....	44
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	63

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความเจ็บปวดในไก่ ภายหลังจากรักษากระดูก tibiotarsus หักโดยการใส่แกนกระดูกชนิดตามภายในโพรงกระดูก และ แทงเหล็กยึดตามภายในกระดูก	32
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนการหายของกระดูกในไก่ ภายหลังจากรักษากระดูก tibiotarsus หักโดยการใส่แกนกระดูกชนิดตามภายในกระดูก และ แทงเหล็กยึดตาม ภายในกระดูก	33
ตารางที่ 3 คะแนนความเจ็บปวดของไก่อุ่มที่ 1 ซึ่งรักษากระดูก tibiotarsus หักโดยการใส่แกน กระดูกชนิดตามภายในกระดูก.....	61
ตารางที่ 4 คะแนนความเจ็บปวดของไก่อุ่มที่ 2 ซึ่งรักษากระดูก tibiotarsus หักโดยการใส่ แท่ง เหล็กยึดตามภายในกระดูก	61
ตารางที่ 5 คะแนนระดับการหายของกระดูกของไก่อุ่มที่ 1 ซึ่งรักษากระดูก tibiotarsus หักโดยการ ใส่แกนกระดูกชนิดตามภายในกระดูก.....	61
ตารางที่ 6 คะแนนระดับการหายของกระดูกของไก่อุ่มที่ 2 ซึ่งรักษากระดูก tibiotarsus หักโดยการ ใส่ แท่งเหล็กยึดตามภายในกระดูก ตามภายในกระดูก.....	62

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
ภาพที่ 1 การเตรียมบริเวณศัลยกรรมโดยเทคนิคปลอดเชื้อ.....	25
ภาพที่ 2 การเปิดผิวหนังทางด้านใน (medial approach) ของกระดูก tibiotars.....	25
ภาพที่ 3 ก แสดงลักษณะทางกายวิภาคบริเวณกระดูก tibiotarsus.....	25
ภาพที่ 3 ข แสดงกระดูก tibiotarsus เมื่อเปิดแบบ medial approach.....	26
ภาพที่ 4 การเหนี่ยวนำให้เกิดกระดูกหักที่ส่วนล่าง (distal third).....	26
ภาพที่ 5 การเตรียมแกนกระดูกนิตยา.....	26
ภาพที่ 6 ก แสดงวิธีการใส่แกนกระดูกนิตยาเข้าไปทางด้าน ส่วนบนของกระดูกที่หัก.....	27
ภาพที่ 6 ข การจัดกระดูกกลับเข้าที่ให้อยู่ในแนวแกนเดิม.....	27
ภาพที่ 6 ค การดึง วัสดุผูกเย็บที่ติดกับแกนกระดูกนิตยา เพื่อให้แกนกระดูกนิตยา.....	27
เลื่อนลงมาอยู่ที่ด้าน ส่วนล่างของกระดูกที่หัก	
ภาพที่ 7 การใช้ kirschner wire ทำ transfixation pin ที่เหนือและใต้รอยหักของกระดูก.....	28
ด้านละ 1 เซนติเมตร	
ภาพที่ 8 การเย็บปิดชั้นกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อพังผืด.....	28
ภาพที่ 9 การพันเฝือกอ่อน.....	28
ภาพที่ 10 แสดงการใส่ แท่งเหล็กยึดตามภายในกระดูก แบบ normograde.....	29
ภาพที่ 11 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนความเจ็บปวดใน ไม้ทั้ง 2 กลุ่ม ที่รักษากระดูก.....	33
tibiotarsus หักโดยการใส่แกนกระดูกนิตยาตามภายในโพรงกระดูก	
(กลุ่มที่ 1) และกลุ่มที่ใส่ แท่งเหล็กยึดตามภายในกระดูก (กลุ่มที่ 2)	
ภาพที่ 12 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยา ทันที ภายหลังการรักษากระดูกtibiotarsusหัก โดย	45
การใส่แกนกระดูกนิตยาตามภายในโพรงกระดูก	
ภาพที่ 13 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 4 สัปดาห์ ภายหลังการรักษากระดูก tibiotarsus หัก.....	45
โดยการใส่แกนกระดูกนิตยาตามภายในโพรงกระดูก	
ภาพที่ 14 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 8 สัปดาห์ ภายหลังการรักษากระดูก tibiotarsus หัก.....	46
โดยการใส่แกนกระดูกนิตยาตามภายในโพรงกระดูก	
ภาพที่ 15 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 10 สัปดาห์ ภายหลังการรักษากระดูก tibiotarsus หัก	46
โดยการใส่แกนกระดูกนิตยาตามภายในโพรงกระดูก	
ภาพที่ 16 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 12 สัปดาห์ ภายหลังการรักษากระดูก tibiotarsusหัก.....	47
โดยการใส่แกนกระดูกนิตยาตามภายในโพรงกระดูก	

ภาพประกอบ	หน้า
ภาพที่ 17 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 48 สัปดาห์ ภายหลังจากการรักษากระดูก tibiotarsus หัก.....	47
โดยการใส่แกนกระบอกฉีดตามภายในโพรงกระดูก	
ภาพที่ 18 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาทันที ภายหลังจากการรักษากระดูก tibiotarsus หัก.....	48
โดยการใส่ แท่งเหล็กยึดตามจากภายในกระดูก	
ภาพที่ 19 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 4 สัปดาห์ ภายหลังจากการรักษากระดูก tibiotarsus หัก.....	48
โดยการใส่ แท่งเหล็กยึดตามจากภายในกระดูก	
ภาพที่ 20 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 8 สัปดาห์ ภายหลังจากการรักษากระดูก tibiotarsus หัก.....	49
โดยการใส่ แท่งเหล็กยึดตามจากภายในกระดูก	
ภาพที่ 21 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 10 สัปดาห์ ภายหลังจากการรักษากระดูก tibiotarsus หัก.....	49
โดยการใส่ แท่งเหล็กยึดตามจากภายในกระดูก	
ภาพที่ 22 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 12 สัปดาห์ ภายหลังจากการรักษากระดูก tibiotarsus หัก.....	50
โดยการใส่ แท่งเหล็กยึดตามจากภายในกระดูก	
ภาพที่ 23 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 48 สัปดาห์ ภายหลังจากการรักษากระดูก tibiotarsus หัก.....	50
โดยการใส่ แท่งเหล็กยึดตามจากภายในกระดูก	
ภาพที่ 24 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับการหายของกระดูก ในไก่ 2 กลุ่ม	34
ที่รักษากระดูก tibiotarsus หักโดยการใส่แกนกระบอกฉีดตามภายใน	
โพรงกระดูก (กลุ่มที่ 1) และการใส่ แท่งเหล็กยึดตามจากภายในกระดูก	
(กลุ่มที่ 2)	
ภาพที่ 25 ก - ข ภาพชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยาในไก่กลุ่มที่ 1 ที่ 4 สัปดาห์	51
ภายหลังจากการทำศัลยกรรม	
ภาพที่ 26 ก - ง ภาพชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยาในไก่กลุ่มที่ 1 ที่ 8 สัปดาห์	52
ภายหลังจากการทำศัลยกรรม	
ภาพที่ 27 ก - ง ภาพชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยาในไก่กลุ่มที่ 1 ที่ 10 สัปดาห์.....	53
ภายหลังจากการทำศัลยกรรม	
ภาพที่ 28 ก - ง ภาพชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยาในไก่กลุ่มที่ 1 ที่ 12 สัปดาห์.....	54
ภายหลังจากการทำศัลยกรรม	
ภาพที่ 29 ก - ง ภาพชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยาในไก่กลุ่มที่ 1 ที่ 48 สัปดาห์.....	55
ภายหลังจากการทำศัลยกรรม	

ภาพประกอบ

หน้า

ภาพที่ 30 ก - ง ภาพชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยาในไ้กลุ่มที่ 2 ที่ 4 สัปดาห์ 56

ภายหลังการทำศัลยกรรม

ภาพที่ 31 ก - ง ภาพชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยาในไ้กลุ่มที่ 2 ที่ 8 สัปดาห์ 57

ภายหลังการทำศัลยกรรม

ภาพที่ 32 ก - ง ภาพชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยาในไ้กลุ่มที่ 2 ที่ 10 สัปดาห์ 58


ภายหลังการทำศัลยกรรม

ภาพที่ 33 ก - ง ภาพชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยาในไ้กลุ่มที่ 2 ที่ 12 สัปดาห์ 59

ภายหลังการทำศัลยกรรม

ภาพที่ 34 ก - ง ภาพชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยาในไ้กลุ่มที่ 2 ที่ 48 สัปดาห์ 60

ภายหลังการทำศัลยกรรม



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 1

บทนำ

ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ปัจจุบันการเลี้ยงนกเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามในประเทศไทย มีความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 5-10 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นการรักษาสัตว์ปีกในกลุ่มนี้จึงมีความสำคัญและได้รับความสนใจ โรคต่างๆที่พบในสัตว์ปีกนั้นร้อยละ 30.14 เกิดจากการบาดเจ็บ ซึ่งร้อยละ 70.04 ของการบาดเจ็บเกิดจากกระดูกหัก (McCartney, 1994) สาเหตุของการเกิดกระดูกหักในนก ได้แก่ การบาดเจ็บ การขาดสารอาหาร ความไม่สมดุลของภาวะโภชนาการ และการติดเชื้อ สัตว์ปีกที่มีกระดูกหักที่ขา มักจะยกขา หรือเดินขาจะเผลก ถ้าปีกหักจะพบปีกตกหรือปีกหย่อนกว่าข้างปกติ และสัตว์ไม่สามารถบินได้ การวินิจฉัยกระดูกหักที่เกิดในสัตว์ปีก ทำได้จากการตรวจร่างกายทั่วไป และการตรวจทางรังสีวิทยา (Burr, 1987; Redig, 2000; Blass, 1987) วิธีการและหลักการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกส่วนใหญ่ มักประยุกต์มาจากการรักษากระดูกหักในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยนำปลายกระดูกที่หักมาต่อกันให้สมบูรณ์ แล้วยึดส่วนที่หักด้วยอุปกรณ์ที่มั่นคงและไม่มีการติดเชื้อซึ่งทำให้สัตว์สามารถกลับมาใช้งานส่วนที่หักได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว (Bennett, 1997; Bush *et al.*, 1976; Olmstead *et al.*, 1996) วิธีการรักษากระดูกหัก ในสัตว์ปีก แบ่งเป็น 2 วิธีหลักๆ คือ การยึดคานจากภายนอกกระดูก (external immobilization) และการยึดคานจากภายในกระดูก (internal immobilization) ซึ่งแต่ละวิธีมีความเหมาะสมต่อการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกต่างกัน ในอดีตมักทำการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกโดย การยึดคานจากภายนอกกระดูก ซึ่งอาจมีผลให้มีการต่อต้านของกระดูกผิดรูป (malunion) และมีความผิดปกติทางกายวิภาค ซึ่งทำให้นกสวยงามหมดคุณค่า และ รบกวนการดำรงชีวิตของสัตว์ การยึดคานจากภายในกระดูกมีหลายวิธี ได้แก่ การรักษาโดยใช้แท่งโลหะไม่เป็นสนิมคานภายในโพรงกระดูก (intramedullary pin, IM pin) แผ่นโลหะคานกระดูก (bone plate) และอุปกรณ์ ยึดกระดูกภายนอก (external fixation) ซึ่งปัญหาสำคัญสำหรับการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีก คือ อุปกรณ์ไม่สามารถยึดภายในโพรงกระดูก หรือ ยึดกับผิวกระดูก ได้อย่างมั่นคง อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่มีน้ำหนักมาก ทำให้อัตว์ปีกเสียสมดุลในการทรงตัว และต้องผ่าตัดนำอุปกรณ์ออกจากหลังกระดูก ต่อติดแล้ว ทำให้อัตว์ต้องเสี่ยงต่อการวางยาสลบ (Coles, 1985; Levitt, 1989; Wander *et al.*, 2000; MacCoy and Haschek, 1988; Rupley, 1999) จากเหตุผลสำคัญ ดังกล่าว จึงได้มีการคิดค้นนำวัสดุที่น้ำหนักเบา และไม่จำเป็นต้องนำออกภายหลังจากการต่อต้านของกระดูก เช่น ซิเมนต์เชื่อมกระดูก (polymethylmethacrylate, PMMA) แท่งโพลิโพรพิลีน (polypropylene) หรือ โพลีไดออกซานอน (polydioxanone, PDS) ยึดภายใน

โพรงกระดูก และ การใช้ xenograft cortical bone (Maccoy and Haschek, 1988) สำหรับการใส่ซีเมนต์กระดูกในการยึดกระดูกหักในสัตว์ปีกจะใช้ได้ดีกับสัตว์ปีกที่มีขนาดเล็ก แต่การเกิดความร้อนจากกระบวนการ polymerization มีผลต่อหลอดเลือดภายในโพรงกระดูก (endosteal blood supply) หรือมีผลต่อการหายของกระดูก การใช้งานยุ่งยาก วัสดุหายาก และราคาแพง (Borman and Putney, 1978) ส่วนการใส่แท่ง polypropylene หรือแท่ง polydioxanone ยึดภายในโพรงกระดูก โดยการใส่แบบ shuttle พบว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีน้ำหนักเบา ราคาถูกกว่าวิธีอื่น สามารถจัดกระดูกกลับเข้าที่ตามแนวแกนเดิม (axial alignment) ได้ดี โดยเฉพาะถ้ากระดูกหักแบบขวาง (transverse fracture) จะสามารถต้านแรงงอได้ดี มีความมั่นคงเพียงพอที่จะทำให้เกิดการหายของกระดูกได้ไม่รบกวน การทำงานของข้อต่อ และไม่ต้องเปิดแผลผ่าตัดกว้าง (MacCoy, 1983; MacCoy, 1991; MacCoy, 1996) ปัจจุบันในประเทศไทยพบว่า อุปกรณ์ที่ใช้ยังหายากและราคาสูง จากปัญหาต่างๆ ดังกล่าว ผู้ศึกษาวิจัยมีความคิดว่า ควรศึกษาถึงการนำอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบา ราคาถูก หาได้ง่าย ไม่รบกวนการทำงานของข้อต่อ ไม่จำเป็นต้องนำออกภายหลังกระดูกต่อติด ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการวางยาสลบและการผ่าตัดซ้ำ มาใช้ในการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ศึกษาผลของการใช้แกนกระดูกนิตยาคตามภายในโพรงกระดูกหักของสัตว์ปีกและศึกษาปฏิกิริยาของร่างกายต่อแกนกระดูกนิตยาคที่ใช้ในการดามภายในโพรงกระดูก

คำถามการวิจัย

1. การใช้แกนกระดูกนิตยาคตามภายในโพรงกระดูก tibiotarsus ของสัตว์ปีกที่หักจะสามารถทำให้เกิดการต่อติดของกระดูกได้หรือไม่ และเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับ การรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกโดยใช้แท่งโลหะไม่เป็นสนิมตามภายในโพรงกระดูก
2. การใช้แกนกระดูกนิตยาคตามภายในโพรงกระดูก tibiotarsus มีผลต่อ กระบวนการซ่อมแซมของกระดูกอย่างไร และมีปฏิกิริยาด้านต่อวัสดุหรือไม่

คำสำคัญ (Key words)

Intramedullary polypropylene rod fixation, avian fracture, tuberculin syringes

การใส่แท่ง polypropylene ตามภายในโพรงกระดูก กระดูกหักในสัตว์ปีก กระบอกฉีดยาทูเบอร์คูลิน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย

วัสดุที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีก ที่หาได้ง่าย ราคาถูก และสามารถใช้งานได้ในการรักษาทางคลินิก

วิธีการทำศัลยกรรมกระดูก รยางค์ของสัตว์ปีกโดยการยึดภายในโพรงกระดูก ซึ่งไม่มีผลต่อการทำงานของข้อต่อ สัตว์สามารถกลับมาใช้งานกระดูกส่วนที่หักได้อย่างสมบูรณ์

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกได้มีการประยุกต์มาจากการรักษากระดูกหักในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งการรักษาทางด้านศัลยกรรมในสัตว์ปีก เริ่มแรกมีรายงานในปี 1960 (Amand, 1977) การรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกในขณะนั้นมักทำโดยการยึดตามจากภายนอกกระดูกของสัตว์ โดยเฉพาะเมื่อมีการหักแบบง่าย สำหรับการหักของกระดูกแบบหลายชิ้น ที่มีรายงานการรักษาโดยการผ่าตัด เช่น การใส่เหล็กยึดตามภายในโพรงกระดูก (intramedullary pin) การใส่แผ่นโลหะตามกระดูก (bone plate) หรือการใส่แท่งเหล็กตามกระดูกจากภายนอก (external fixation) มักพบปัญหาต่างๆในการรักษากระดูกหักภายหลังการผ่าตัด เช่น ปัญหาการเกิดถุงน้ำที่กระดูก (bone cyst) ปัญหาความไม่มั่นคงของอุปกรณ์ใส่กระดูก ซึ่งในขณะนั้นยังไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด การแก้ไขปัญหาดังกล่าวทำได้เพียงแค่เสริมความแข็งแรงของอุปกรณ์ตามกระดูก โดยการตามกระดูกจากภายนอก (Altman, 1977) ในปี 1976 เริ่มมีการนำซีเมนต์กระดูกมาใช้ในการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีก ซึ่งจากผลการศึกษาในปี 1978 ในการรักษากระดูกปีกของนกพิราบพบว่า ผลของการรักษาค่อนข้างดี แม้ว่าจะไม่สามารถทำนายได้ว่าอายุการใช้งานของซีเมนต์กระดูกมีระยะเวลาเท่าใด (Borman and Putney, 1978) การใช้แท่งเหล็กตามกระดูกจากภายนอก จากรูปแบบเดิมที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากซึ่งรบกวนการเคลื่อนไหวของสัตว์ Marlow และ Seibels ได้คิดค้นนำอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักน้อย เช่น ใช้เข็มฉีดยา และกระบอกฉีดยา มาประยุกต์ใช้ในการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกโดยการยึดตามจากภายนอก ซึ่งพบว่าได้ผลในการรักษาดี (Marlow and Seibels, 1981) การเริ่มหาอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบา ไม่รบกวนการเคลื่อนไหวของสัตว์ปีก เป็นหลักการที่สำคัญในการประยุกต์และหาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้เกิด ความเหมาะสม ในการรักษากระดูกหักแต่ละชนิดในสัตว์ปีกในเวลาต่อมา

สาเหตุของการเกิดกระดูกหักในสัตว์ปีก

การบาดเจ็บมักเป็นสาเหตุหลักของการเกิดกระดูกหักในสัตว์ปีก (28%) สัตว์มักเกิดการบาดเจ็บได้โดย การถูกยิง ถูกตี ขาดตกกับกรง โค่นสัตว์อื่นทำร้าย ส่วนสาเหตุอื่นๆเช่น มีความไม่เหมาะสม ของสารอาหาร หรือ ความไม่เหมาะสมของภาวะ โภชนาการ มีความผิดปกติของระบบเมตาบอลิซึม หรือ อาจเกิดกระดูกหักเนื่องจากการติดเชื้อ (Blass, 1987)

อุบัติการณ์การเกิดกระดูกหักในสัตว์ปีก

ลักษณะทางกายวิภาคของสัตว์ปีก จะป้องกันการหักของกระดูกที่มีโพรงอากาศอยู่ด้านใน โดยจะพบว่า กระดูกท่อนบนสุด เช่น กระดูกฮิวเมอร์ส (humerus) หรือ กระดูกฟีเมอร์ (femur) ที่ติด

กับลำตัวจะแนบกับลำตัวมากกว่าในสัตว์อื่นๆ และมีมวลของกล้ามเนื้อขา อย่างไรก็ดีตาม กระดูกที่มีโพรงอากาศอยู่ภายในและกระดูกที่มีกล้ามเนื้อปกคลุมน้อย เช่น กระดูก tibiotarsus คือกระดูกที่เสี่ยงกับการหักมากกว่ากระดูกท่อนอื่นๆ เนื่องจากกระดูกที่มีโพรงอากาศอยู่ภายในนั้น เปราะและมีผิวกระดูกที่บางกว่ากระดูกอย่างค้ำปกติ ส่วนกระดูกที่มีกล้ามเนื้อปกคลุมน้อยนั้นเมื่อได้รับแรงกระแทกจากภายนอก จะมีการรองรับแรงของเนื้อเยื่อโดยรอบต่ำ ทำให้แรงนั้นกระทบกับกระดูกโดยตรงการหักของกระดูก tibiotarsus พบได้บ่อยในนกพิราบ และนกตระกูล psittacine (Redrobe, 2002; Harcourt-Brown, 2005) ในขณะที่กระดูกท่อนอื่นๆ ยังไม่มีรายงานอุบัติการณ์การเกิดกระดูกหักในแต่ละท่อนออกมาชัดเจน

อาการ

สัตว์ปีกที่กระดูกหัก มักไม่สามารถใช้ร้อยละส่วนที่หักได้ กรณีที่ปีกหัก สัตว์จะมีปีกตกหรือปีกห้อย กรณีที่ขาหัก สัตว์จะไม่ใช้ขาและยกขา เนื่องจากผิวหนังของสัตว์ปีกบาง จึงมักพบกระดูกที่หักเปิดออกมานอกผิวหนัง ซึ่งมักจะเกิดเนื้อตายได้ง่าย ถ้าการหักของกระดูกนั้นเป็นแบบปิดและ มีการเคลื่อนไม่มาก สัตว์อาจแสดงอาการกะเผลก หรือ เจ็บ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยอื่นๆร่วม เพื่อยืนยันการหักของกระดูกดังกล่าว

การตรวจวินิจฉัย

การซักประวัติที่ครบถ้วน การสังเกตอาการ และการตรวจร่างกายทั่วไป จะสามารถตรวจกระดูกที่หักได้ ในการตรวจร่างกายของสัตว์ปีกต้องอาศัยความระมัดระวังมากกว่าสัตว์อื่น เนื่องจากสัตว์มีขนาดเล็ก อัตราการเมตาบอลิซึมสูง เกิดความเครียดจากการจับบังคับได้ง่าย โดยทั่วไปมักตรวจสัตว์โดยการดูจากภายนอก จากนั้นจึงตรวจร่างกายทั่วๆ ไป และคลำตรวจตัวสัตว์เป็นลำดับสุดท้าย สำหรับกรณีที่มียีกหัก อาจพบว่าสัตว์นั้นไม่มีปีกตก หรือปีกห้อย แต่พบว่าปีกอยู่ในลักษณะปกติได้ การคลำตรวจที่แรงเกินไปอาจเพิ่มการบาดเจ็บกับสัตว์ การจับบังคับสัตว์ต้องใช้ความนุ่มนวล ควรให้สัตว์นั้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น มีค ในกรณีที่สัตว์นั้นรอกการตรวจ หรือรอกการผ่าตัด อาจต้องตรวจเลือด หรือเพาะเชื้อในกรณีที่จำเป็น (Splink, 1987) สำหรับการตรวจทางรังสีวิทยามักใช้เพื่อยืนยันว่ามีการหักของกระดูก เพื่อให้ทราบว่าการหักของกระดูกแบบไม่แสดงอาการหรือไม่ และเพื่อให้ทราบชนิดของการหัก ตำแหน่งที่หัก เพื่อวางแผนในการรักษาต่อไป บางกรณีที่สัตว์ตื่นกลัว อาจจำเป็นต้องให้ยาซึมหรือยาสลบกับสัตว์ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดเพิ่มขึ้น เนื่องจากการตรวจร่างกายทั่วไป และการจับบังคับเพื่อถ่ายภาพทางรังสีวิทยา (Coles, 1985; Galvin, 1980)

การตรวจทางรังสีวิทยา

การตรวจทางรังสีวิทยามีประโยชน์มากในการตรวจวินิจฉัยการหักของกระดูก ทั้งในกรณีที่สัตว์แสดงอาการทางคลินิก และกรณีที่สัตว์ไม่แสดงอาการ การถ่ายภาพทางรังสีวิทยาในสัตว์ปีกขนาดเล็กทำได้ยากกว่าสัตว์ปีกขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการจัดท่าและการจับบังคับ เนื่องจากสัตว์ปีกขนาดเล็กนั้นหายใจเร็ว เวลาที่ใช้ในการถ่ายภาพจึงควรกำหนดให้สั้นที่สุด เพื่อป้องกันภาพไหวเมื่อสัตว์หายใจเข้า ออก โดยปกติ จะตั้งค่า exposure time ที่ 0.015-0.05 วินาที 200-300 mA และค่า kV ต่ำๆ เช่น 45-55 kV เพื่อให้เห็นความแตกต่างของอวัยวะได้ชัดเจน ปกติกระดูกของสัตว์ปีกจะบางกว่ากระดูก ของสัตว์อื่นและมีการพอกของกระดูกภายในน้อยกว่า ภาพรังสีวิทยากระดูกที่หักจะถ่าย 2 ท่า คือท่า anterior posterior และท่า lateral อาจจำเป็นที่จะต้องถ่ายทำเฉียง (oblique) เพิ่มเพื่อการวินิจฉัย ที่ถูกต้อง (Dolphin and Olsen, 1979)

การรักษา

หลักการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีก

หลักการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกนั้นคล้ายคลึงกับในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม แต่คุณสมบัติของกระดูกสัตว์ปีกแตกต่างจากกระดูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอย่างมาก กระดูกของสัตว์ปีกบางและเปราะ โครงสร้างภายในประกอบด้วยไฮดรอกซีแอปพาไต์ (hydroxyapatite) และร่างแหของคอลลาเจน (collagen) ที่ไม่แข็งแรงและสานกันไม่หนาแน่น ทำให้มีลักษณะเหมือนเปลือกไข่ถึงแม้จะแข็ง แต่ก็แตกได้ง่าย ทำให้การรักษากระดูกทำได้ลำบาก (Coles, 1985; Stocker, 2005; Redig, 2000) เป้าหมายหลักของการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกคือ การพยายามจัดเรียงโครงสร้างทางกายวิภาค (anatomical alignment) ให้ใกล้เคียงกับกระดูกปกติให้มากที่สุด ทั้งในด้าน ความยาว ตำแหน่ง การบิดหมุน มุม ของกระดูก โดยเฉพาะในนกที่ปล่อยบินอิสระ การบิดหมุนของกระดูกแม้เพียงเล็กน้อยก็จะส่งผลต่อการบินได้ (Blass, 1987) ในการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกจะต้องกำจัดแรง (neutralized) ที่กระทำต่อกระดูกที่หักให้ได้มากที่สุด โดยแรงดังกล่าว คือ แรงงอ (bending force) แรงหมุน (rotational force) แรงเฉือน (shearing force) และแรงกด (compressive force) การรักษาจะมีความลำบากมากขึ้นเมื่อการแตกของกระดูกมีหลายชิ้น เนื่องจากต้องกำจัดแรงต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด เพื่อให้การหายของกระดูกเกิดได้เร็วและดี (Redig, 2000) แม้ว่าการบินหรือเดินในนกเลี้ยงภายหลังการรักษาใหม่ๆ อาจไม่มีความจำเป็นต่อสัตว์ในการดำรงชีวิต แต่ในนกปล่อยหรือนกป่า การบินหรือเดินมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการหาอาหาร การรักษากระดูกหักในสัตว์เหล่านี้ จึงต้องให้มีการใช้งานของส่วนที่หักให้ได้เร็วที่สุด (Blass, 1987) นอกจากนี้ ไม่ควรดัดรั้งเนื้อเยื่ออ่อนหรือรบกวนหลอดเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณรอบๆ กระดูก เนื่องจากจะทำให้กระดูกหายช้า กรณีที่มีการหักของกระดูกแบบหลายชิ้น

และมีการแยกของกระดูกออกมาจากเนื้อเยื่ออ่อน ถ้ากระดูกที่แยกออกมาไม่มีการติดเชื่อ หรือเป็นเนื้อตาย สามารถที่จะใส่กระดูกนั้นกลับเข้าไปได้ เพื่อให้ลักษณะทางกายวิภาคใกล้เคียงกับกระดูกปกติ เป็นโครงร่างที่ช่วยพยุงบริเวณที่หัก และช่วยเหนี่ยวนำเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูก และการพอกของกระดูกเข้ามาบริเวณนั้น (Bennett, 1997; Newton, 1977; Samour, 1992; Olmstead et al., 1996) โดยส่วนมากการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกนั้นมักจะแยกตามชนิดของการหัก บริเวณที่เกิดกระดูกหัก และการเกิดปัญหาแทรกซ้อน อย่างไรก็ตามความสำเร็จของการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกนั้น 50% ขึ้นกับอุปกรณ์และวิธีการรักษา ส่วนที่เหลือขึ้นกับตัวสัตว์เอง (Redig, 2000) กระดูกรยางค์แต่ละท่อนของสัตว์ปีก มักพบการหักเกิดขึ้นได้บ่อยในส่วนที่มีกล้ามเนื้อปกคลุมน้อย เช่น กระดูกเรเดียส (radius) กระดูกอัลนา (ulna) กระดูก tibiotarsus และกระดูกที่มีโพรงอากาศอยู่ด้านใน เช่น กระดูก humerus กระดูก femur สำหรับอุบัติการณ์การเกิดกระดูกหักในแต่ละท่อนนั้นยังไม่มีรายงาน ที่แน่ชัด (Bennett, 1997)

ระยะเวลาการหายของกระดูก

ระยะเวลาการต่อติของกระดูกมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องค่อนข้างจำกัด โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อระยะเวลาการต่อติของกระดูกหลายปัจจัย ปัจจัยเหล่านั้นได้แก่ ความรุนแรงของการเคลื่อนของกระดูก (degree of displacement) การเคลื่อนไหวของบริเวณที่หัก (motion at the fracture site) การติดเชื้อ (present infection) และความเสียหายของหลอดเลือด (damage of blood supply) ซึ่งทำให้อัตราการต่อติของกระดูกแตกต่างกัน เชื่อว่าการต่อติของกระดูกในสัตว์ปีกเกิดเร็วกว่าการต่อติของกระดูกในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แม้ว่ากลไกในการต่อติของกระดูกจะเหมือนกัน คือ มีการสร้างเส้นใยไฟเบอร์ และกระดูกอ่อนมาพอก (cartilaginous callus) ซึ่งสร้างมาจากทั้งด้านนอก (periosteal membrane) และด้านใน (endosteal membrane) จากนั้นจึงสร้างไฟโบบลาส (fibroblast) รวมทั้งคอลลาเจน (collagen) ตามมา ซึ่งจะสร้างในอัตราที่เร็วกว่าการสร้างกระดูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเล็กน้อย ทำให้อัตราการต่อติของกระดูกในสัตว์ปีกเกิดขึ้นเร็วกว่า (Stocker, 2005)

การต่อติของกระดูกนั้นจะแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ การต่อติแบบปฐมภูมิ (primary bone healing) ซึ่งการต่อติแบบนี้เกิดจากการรักษากระดูกหักโดยใช้แผ่นเหล็กตามกระดูก (bone plate) ยึดกระดูกเอาไว้ ทำให้ปลายของกระดูกที่หักทั้งสองปลายมาชิดกัน ไม่มีการเคลื่อนของปลายกระดูกที่หัก การต่อติแบบนี้ มีการสร้างกระดูกมาพอก (callus) ในปริมาณน้อย การต่อติแบบทุติยภูมิ หรือการต่อติแบบมีการพอกของกระดูก (secondary bone healing or callus healing) เกิดจากการที่กระดูกนั้นมีระยะห่างระหว่างกระดูกที่หักกว้าง และมีการเคลื่อนเล็กน้อย (micro motion) ในบริเวณที่มีการหัก ทำให้มีการสร้างกระดูกมาพอกในปริมาณมาก

เซลล์ที่เข้ามาบริเวณที่เกิดกระดูกหักนั้นจะเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานด้วยน้ำมัน ยกเว้นกระดูกที่มีโพรงอากาศอยู่ภายใน จะพบการเกิดกระดูกพอกภายในโพรงกระดูก (endosteal callus) เป็นส่วนที่สำคัญในการพุงกระดูกที่หัก ส่วนกระดูกที่มาพอกด้านนอก (periosteal callus) นั้นจะเกิดค่อนข้างน้อยและมีผลต่อการพุงบริเวณที่เกิดกระดูกหักแบบทุติยภูมิ กระดูกที่หักแบบไม่ซับซ้อน (simple fracture) และไม่มีทางต่อดัดต่อกับภายนอก (closed fracture) จะมีความมั่นคงของบริเวณที่หักที่ตรวจพบได้ทางคลินิก (clinical union) ใน 2 - 3 สัปดาห์ ในขณะที่การต่อดัดของกระดูกที่เห็นได้จากภาพรังสีวิทยาจะเกิดช้ากว่า สามารถเห็นการต่อดัดกันของกระดูกจากการพอกของกระดูกได้ในระยะเวลา 3 - 6 สัปดาห์ (Bennett, 1997) การนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการยึดตามกระดูกออกก่อนจะเห็นการหายจากภาพรังสีวิทยาสารทำได้ ถ้าสัตว์แพทย์คลำตรวจทางคลินิกแล้วพบว่าบริเวณที่หักนั้นมีความมั่นคงเพียงพอ

ข้อพิจารณาในการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีก

การพิจารณาการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีก สิ่งที่สำคัญ คือ พฤติกรรมปกติของสัตว์ปีกที่มีการหักของกระดูกว่าเป็นสัตว์ที่มีการเคลื่อนไหวมากหรือไม่ เป็นนกที่บินอิสระหรือถูกขังในกรง บริเวณที่หักมีการเคลื่อนไหวมากหรือน้อย ชนิดของการบาดเจ็บ กระดูกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระดูกที่หักและลักษณะทางกายวิภาคเดิมของสัตว์ปีกนั้นๆ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงบริเวณที่หักนั้นมีขนปีกที่ใช้ในการบิน (flight feather) เกี่ยวข้องอยู่ด้วยหรือไม่ เนื่องจากขนทุติยภูมิของปีก (secondary feather) ที่เกี่ยวข้องกับการบินนั้นจะติดกับส่วนของเยื่อหุ้มกระดูก (periosteum) ของกระดูก ulna และขนปฐมภูมิของปีก (primary feather) นั้นติดกับส่วนของกระดูก metacarpus ที่ตำแหน่งนี้จึงไม่ควรที่จะใช้ที่แฉะกระดูก (periosteal elevator) ในการแฉะ เนื่องจากจะไปทำลายส่วนของรูขุมขน และทำให้ขนนั้นไม่งอกออกมาตามปกติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการกลับมาบินได้ของนก นอกจากนี้กระดูกที่หักหลายชิ้นแบบรุนแรง มักพิจารณาการรักษาโดยการพันคัมมากกว่าแต่ถ้าพบการหักของกระดูกแบบเปิด (open fracture) การรักษาต้องทำโดยการผ่าตัดแก้ไขเท่านั้น และควรเพาะเชื้อเพื่อตรวจดูการติดเชื้อ และเพื่อพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะรักษาต่อไป

การตัดสินใจจากเจ้าของสัตว์ว่าต้องการให้มีการใช้งานของบริเวณที่หักอย่างสมบูรณ์หรือไม่เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเช่นกัน ซึ่งจะมีวิธีการพิจารณาที่แตกต่างกันออกไป ในกรณีที่มีการหักของกระดูกปีกในสัตว์ปีกที่ปล่อย หรือ นกป่า การรักษาควรให้สัตว์สามารถใช้งานส่วนที่หักได้เร็วที่สุด ในขณะที่ในนกเลี้ยง การบินได้นั้นไม่จำเป็นกับเจ้าของ สิ่งที่สำคัญคือความสวยงาม ดังนั้นจึงไม่ควรพบลักษณะของกระดูกผิดปกติหลังจากการต่อดัดของกระดูก และควรให้มีลักษณะของปีกที่ดูปกติทั้งในขณะที่หุบและกางปีกแม้ว่าสัตว์จะไม่สามารถบินได้ก็ตาม

ระยะเวลาตั้งแต่กระดูกหักจนถึงระยะเวลานำมาตรวจรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาเช่นกัน กระดูกที่หักมาเป็นระยะเวลานาน ก่อนผ่าตัดรักษา มักทำการรักษาได้ลำบาก เนื่องจากจะมีการยึดติดของเนื้อเยื่อ การสร้างเนื้อเยื่อ granulation การหดตัวของกล้ามเนื้อ ทำให้มีการชันกันของกระดูก การรักษากระดูกที่หักมานานจึงทำได้ยากกว่าการรักษากระดูกที่หักใหม่ๆ และจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ในการยึดกระดูกที่มั่นคง

สิ่งที่สำคัญอีกประการในการพิจารณาตัดสินใจของเจ้าของ คือราคาของการรักษากระดูกหัก โดยเฉพาะในนกขนาดเล็ก นกที่ราคาไม่แพง และนกปล่อย อย่างไรก็ตามเจ้าของสัตว์มักไม่เห็นความสำคัญในการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกเท่าที่ควร เนื่องจากไม่ทราบว่า การต่อติดของกระดูกผิดปกติ และการที่สัตว์ไม่สามารถบินได้ ทำให้สัตว์เครียด และจะส่งผลต่อความทุกข์ทรมานต่อสัตว์ตลอดชีวิต นอกจากนี้การใช้วิธีการรักษาที่มีราคาแพงยังส่งผลให้เจ้าของสัตว์ตัดสินใจไม่ยินยอมรักษาสัตว์ต่อ

การรักษาทางอายุกรรม

การรักษาทางอายุกรรมจะพิจารณาทำในสัตว์ที่มีการหักของกระดูกแบบไม่เคลื่อนที่ หรือมีการหักแบบมั่นคง (stable fracture) การรักษาทางอายุกรรม ประกอบด้วย การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาการติดเชื้อเมื่อเกิดการบาดเจ็บ การให้ยาลดอักเสบ ให้สารน้ำในกรณีที่สัตว์ขาดน้ำ รวมถึงการพันตามกระดูกที่หัก ซึ่งเป็นทั้งวิธีการรักษาและเป็นวิธีป้องกันการบาดเจ็บก่อนการผ่าตัดรักษา

แรกเริ่มของการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกนั้น มักทำการรักษาโดยการพันตามส่วนที่หัก ในกรณีที่ปีกหักจะพันส่วนปีกให้ติดกับลำตัวสัตว์ เพื่อให้ลำตัวช่วยตามกระดูกไว้ ให้แนวของกระดูกหักใกล้เคียงกับแนวของกระดูกปีกเดิม วิธีการนี้สามารถใช้ในการรักษาระดุกปีกหักทั้งชนิดมั่นคงและไม่มั่นคง ในขณะที่กรณีกระดูกขาหัก การรักษาโดยการพันตามมักทำไม่ได้ ยกเว้น กรณีที่มีการหักแบบมั่นคงเท่านั้น ส่วนมากการพันตามกระดูกในลักษณะนี้ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างปลายกระดูกทั้งสองด้าน และไม่มี ความมั่นคงที่ปลายกระดูกที่หัก ในขณะที่เกิดกระบวนการต่อติดของกระดูกจึงเกิดการพอกของกระดูกทั้งสองด้านในปริมาณที่มาก เมื่อมีการต่อติดของกระดูกที่สมบูรณ์ ปริมาณกระดูกที่พอกนั้นจะเป็นผลเสียกับโครงสร้างของกล้ามเนื้อ นอกจากจะเปื่อยคดกล้ามเนื้อทำให้การทำหน้าที่ผิดปกติแล้ว ยังส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของข้อต่อ การทำงานของเส้นประสาท และหลอดเลือด การจัดการของร่างกายเพื่อเรียงให้กระดูกใกล้เคียงกับขนาดปกติ (remodelling) ต้องใช้เวลานาน มักเกิดกระดูกต่อติดผิดปกติจากการรักษาโดยวิธีการดังกล่าว วิธีการรักษาโดยการพันตามกระดูกสามารถทำได้ง่ายและใช้อุปกรณ์ไม่มาก โดยเฉพาะสัตว์ที่มีขนาดเล็กที่ไม่สามารถยึดตามกระดูกได้ด้วยวิธีการอื่น การยึดตามกระดูกโดยวิธีการนี้ยังมีการใช้กันในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกรณีที่มีการหักแบบง่ายและกระดูกไม่เคลื่อน

แต่ในกรณีที่พบการหักแบบหลายชิ้นและไม่สามารถแก้ไขให้แนวของกระดูกกลับเข้าที่เดิม จำเป็นต้องทำการผ่าตัดเพื่อดึงและยึดกระดูกจากภายใน แต่กรณีที่สัตว์ปีกมีขนาดเล็กมาก ๆ โดยเฉพาะสัตว์ปีกที่มีน้ำหนักไม่ถึง 50 กรัม มักไม่มีกระดูกที่มีโพรงอากาศอยู่ภายในซึ่งเป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติ เนื่องจากน้ำหนักที่น้อยมากนั้นไม่ส่งผลต่อการบินของสัตว์ ดังนั้นการฟื้นดามกระดูกจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมมากกว่าการรักษาโดยการศัลยกรรม

การฟื้นดามกระดูก (External Immobilization)

การฟื้นดามกระดูกภายนอกทำได้โดยใช้เทปขาวหรือผ้าพันแผล ในกรณีที่สัตว์นั้นมีขนาดเล็ก หรืออาจจะใช้ ไฟเบอร์กลาสในกรณีที่สัตว์มีขนาดใหญ่ เริ่มจากดึงกระดูกกลับเข้าที่โดยการคลำและดึงจากภายนอกจากนั้นพันผ้าพันแผลยึดตามส่วนที่หักเอาไว้ กรณีกระดูกปีกหักจะจัดทำสัตว์ให้ปีกหุบชิดกับลำตัวเหมือนกับปีกสัตว์ปกติที่หุบปีก จากนั้นพันดามกระดูกปีกเป็นรูปเลขแปด เพื่อยึดส่วนของกระดูกให้แนบติดกับลำตัว และให้ลำตัวช่วยดามปีกที่หัก การฟื้นดามในลักษณะนี้ใช้ได้กับการหักของกระดูกทุกท่อนที่ปีก ทั้งกระดูก humerus กระดูก radius กระดูก ulna กระดูก metacarpus และกระดูกนิ้ว ส่วนการหักของกระดูกขา ต้องจัดขาให้อยู่ในท่าปกติและใช้อุปกรณ์เช่นผ้าพันแผล หรือไฟเบอร์กลาส

การดูแลภายหลังการรักษา ควรให้สัตว์ได้พักอยู่ในห้องที่มีดม เงียบ โดยไม่มีการรบกวนจากมนุษย์ จากนั้นตรวจสอบสัตว์เป็นระยะ เพื่อดูว่าสัตว์นั้นสามารถทนต่อการใส่ที่ยึดดามกระดูกได้หรือไม่ ตรวจสอบแนวกระดูกและการเรียงตัวของกระดูก ในขณะที่มีที่ยึดดามกระดูกอยู่ โดยส่วนมากจะตรวจสอบแนวของกระดูกและการพอกของกระดูกทุกๆ 2-3 สัปดาห์ จนมีการต่อติดของกระดูกเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ภายหลังมีการต่อติดเกิดขึ้นแล้วสามารถนำที่ยึดดามกระดูกออกได้ และเริ่มทำกายภาพบำบัดทีละน้อย เพื่อลดอัตราการเกิดกล้ามเนื้อลีบ และเส้นเอ็นฝ่อ

สำหรับข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ ได้แก่ ไม่ควรติดเทปขาวเหนียวกับขนโดยตรง ควรหลีกเลี่ยงการพันผ้าพันแผลที่แน่นเกินไป เนื่องจากจะทำให้เลือดไม่ไหลเวียนและปีกบวม ถ้าเป็นรุนแรงจะเน่า เป็นเนื้อตายและติดเชื้อได้ ถ้ากระดูกปีกหักเพียงข้างเดียว ไม่ควรพันปีกอีกข้างเพื่อให้สัตว์สามารถรักษาสมดุลในการทรงตัวได้ ไม่ควรใช้วิธีนี้ในการรักษากระดูกหักแบบเปิด เนื่องจากมีการติดเชื้อบริเวณกระดูก การพันผ้าพันแผลทับ นอกจากจะไม่สามารถคุมการติดเชื้อได้แล้ว ยังทำให้กระดูกที่ติดเชื้อไม่ได้รับการรักษา จนเป็นต้นเหตุเชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือด ไม่ควรทำในกรณีที่กระดูกหักแบบไม่มั่นคง หรือมีการหักหลายชิ้น โดยเฉพาะถ้าสัตว์จำเป็นต้องบินเพื่อหาอาหารและดำรงชีวิต กล้ามเนื้อบริเวณปีกที่แข็งแรงจะดึงปลายกระดูกที่หักให้แยกออกจากกันจนไม่มีการต่อติดของกระดูกเกิดขึ้นหรือมีการต่อติดของกระดูกผิดรูป และส่งผลต่อการดำรงชีวิต

การรักษาทางศัลยกรรม

จุดประสงค์ ของการรักษากระดูกหักโดยการผ่าตัดเพื่อ ยึดส่วนที่หักกลับเข้าที่ ทำให้สัตว์สามารถรับน้ำหนักในส่วนที่หักได้ มีความมั่นคงเพียงพอที่จะทำให้เกิดการหายของกระดูกได้ และหายได้เร็วที่สุด เมื่อกระดูกหาย สามารถใช้งานส่วนที่หักได้เหมือนปกติ ไม่รบกวนการทำงานของข้อต่อ (Bush, 1983) สำหรับการรักษาทางศัลยกรรมนั้นในสัตว์ปีก จะต้องระมัดระวัง ตั้งแต่การเตรียมตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัด การวางยาสลบ การผ่าตัด และการดูแลหลังการผ่าตัด

การผ่าตัดเพื่อรักษากระดูกหัก

การใช้แท่งเหล็กยึดกระดูกจากภายนอก (External fixation, Modified Kirschner Splints)

การใช้แท่งเหล็กยึดตามกระดูกจากภายนอก (external fixator) ประยุกต์มาจากการใช้รักษากระดูกหักในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งชุดอุปกรณ์สำหรับใช้ยึดกระดูกภายนอกมีหลายชนิด ชนิดที่เป็นที่รู้จักและใช้มากที่สุดคือ Kirschner-Ehmer splint ซึ่งประกอบด้วย แท่งเหล็กยึดกระดูก ตัวยึด (clamp) ยึดแท่งเหล็กติดกับ connecting bar (Borman, 1978; Samour, 1992) สำหรับการใช้ในสัตว์ปีก สามารถประยุกต์ใช้กับกระดูกได้แทบทุกชิ้น โดยไม่รบกวนการทำงานของข้อต่อ ไม่ทำให้เกิดเนื้อเยื่อพังผืดรอบๆ ข้อต่อ (periarticular fibrosis) สัตว์กลับมาใช้กระดูกที่หักได้เร็ว นอกจากนี้ยังสามารถใช้ยึดกระดูกที่มีแนวโน้มหายช้า ในระยะเวลานาน ข้อดีของการใช้แท่งเหล็กยึดกระดูกจากภายนอก คือ แผลผ่าตัดน้อย ไม่ต้องผ่าตัดเป็นบริเวณกว้างเพื่อจัดกระดูกกลับเข้าที่ สามารถต้านแรงที่เกิดเนื่องจากการหักได้ทุกแรง และมีประโยชน์มากในกรณีที่การหักของกระดูกเป็นแบบเปิด มีการติดเชื้อหรือ มีการเสียหายของเนื้อเยื่ออ่อน ซึ่งสามารถที่จะรักษาการหักของกระดูก และรักษาการติดเชื้อของเนื้อเยื่อไปพร้อมๆ กับการหายของกระดูกได้โดยไม่รบกวนอุปกรณ์ที่ใช้ยึดกระดูก สามารถถอดอุปกรณ์ออกโดยที่ไม่ต้องวางยาสลบสัตว์ (Bush, 1977) จากรายงานของ Maccoy พบว่าในการรักษาทางคลินิกในสัตว์ปีก 100 ตัว ไม่พบปัญหาในการใช้ แต่พบปัญหาของแท่งเหล็กหลุดออกในสัตว์ปีก 4 ตัว 3-5 สัปดาห์ ภายหลังจากการรักษา ในปี 1981 Satterfield และ O'Rourke ได้คิดค้นการนำวิธี Modified Through and Through Kirschner-Ehmer Splint มาใช้ในการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกซึ่งเป็นการประยุกต์การตามกระดูกโดยใช้แท่งเหล็กจากภายนอก ชนิด 2 (type II external fixator) โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมแท่งเหล็กด้านนอกนั้นทำมาจากเปลือกอ่อนที่อ่อนตัวเมื่ออุณหภูมิสูง (Hexcelite®) ซึ่งพบว่าสามารถใช้ในการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกได้ดี และมีความแข็งแรงพอเพียงไม่พบการหลุดของอุปกรณ์ก่อนกำหนด นอกจากนี้ผู้รายงานยังแนะนำถึงการใช้วิธีนี้ร่วมกับการใส่แท่ง polypropylene เพื่อให้สามารถจัดแนวกระดูกได้ (Willer R.L. et al., 1991) ข้อด้อยของวิธีการนี้คือ การยื่นของอุปกรณ์ออกมาจากตัวสัตว์ ทำให้สัตว์เกะกะรำคาญและอาจครูดกับตัวสัตว์ทำให้เกิดบาดแผล หรืออาจเกิดการเกี่ยวของอุปกรณ์กับสิ่งต่างๆ

และดึงให้อุปกรณ์ถอนออกมา (Satterfield and O'Rourke, 1981) หลังจากปี 1981 ได้มีการใช้แท่งเหล็กยึดตามกระดูกจากภายนอกในอีกหลายรายงาน ซึ่งมักพบข้อเสียหลักๆอีกหลายประการคือ การแตกของกระดูกภายหลังจากการใส่อุปกรณ์ซึ่งพบทั้ง กระดูกแตกจากรอยหักเดิม หรือเกิดจากการใส่แท่งเหล็กเพิ่ม การติดเชื้อ ความไม่มั่นคงของอุปกรณ์ การพอกของกระดูกที่มากเกินไปทำให้มีการเคลื่อนไหวผิดปกติ การจัดแนวกระดูกไม่ดี มีการต่อต้านของกระดูกผิดปกติ การต่อต้านของกระดูกข้าง เนื่องจากกระบวนการสร้าง callus ภายในและความไม่มั่นคงของกระดูกบริเวณที่หัก อุปกรณ์มีน้ำหนักมาก กระดูกที่บางไม่สามารถยึดอุปกรณ์ไว้ได้ ทำให้จำเป็นต้องนำออกก่อนกำหนด อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดกระดูกหักแบบเปิดหรือกระดูกหักแบบละเอียด วิธีการนี้ยังคงเป็นวิธีการหลักในการรักษา (Bush, 1983; Bush, 1977)

แผ่นเหล็กตามกระดูก (Bone plate)

การรักษากระดูกหักโดยวิธีการใส่แผ่นเหล็กตามกระดูก เป็นที่นิยมมากในการรักษากระดูกหักที่เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื่องจากเป็นวิธีการยึดกระดูกหักได้เกือบทุกชนิด มีการยึดกระดูกที่มั่นคง และทำให้เกิดการหายของกระดูกแบบปฐมภูมิ การเกิดกระดูกพอกน้อย ไม่รบกวนการทำงานของข้อต่อ สามารถกลับมาใช้งานของขาและปีกได้เร็ว แม้ว่าการใช้แผ่นเหล็กตามกระดูก ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะเป็นที่นิยม แต่การรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกโดยการใช้แผ่นเหล็กตามกระดูก ทำได้ลำบาก เนื่องจากกระดูกในสัตว์ปีกเปราะ และบาง ผิวของกระดูกจึงไม่สามารถยึดสกรูเอาไว้ได้ ทำให้สกรูหลวม หลุด ตัวแผ่นเหล็กที่มีใช้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ จึงสามารถใช้ได้กับนกที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการรักษากระดูกหักแบบเปิดได้ อุปกรณ์หายากและมีราคาแพง ต้องอาศัยสัตวแพทย์ที่มีความชำนาญ ต้องเปิดแผลผ่าตัดและดัดรีดเนื้อเยื่ออ่อนเป็นบริเวณกว้าง ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดนานทำให้สัตว์ต้องได้รับยาสลบนาน (Howard, 1990) มีรายงานการใช้แผ่นเหล็กยึดกระดูกร่วมกับ polymethylmethacrylate (PMMA) เพื่อรักษากระดูกหักโดยการใส่ polymethylmethacrylate เข้าไปในโพรงกระดูกเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรง ต่อการต้านแรงงอ และแรงหมุน ซึ่งผู้วิจัยรายงานถึงผลของการศึกษา ซึ่งมีการหายของกระดูกได้ดีและสมบูรณ์ (Kuzma, 1991; Howard, 1990)

สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม การใส่แผ่นเหล็กยึดกระดูกเอาไว้ตลอดชีวิตของสัตว์นั้นเป็นสิ่งปกติ ถ้าตัวแผ่นเหล็กยึดกระดูกไม่มีปัญหาการเคลื่อนไหว หรือการดำรงชีวิตของสัตว์ ขณะที่ในสัตว์ปีกตัวแผ่นเหล็กยึดกระดูกมีน้ำหนักมากเมื่อเทียบกับตัวสัตว์ และมักส่งผลขัดขวางการบิน หรือ การเดิน และยังเป็นสิ่งกระตุ้นให้สัตว์ไวต่อความเครียดและความเย็น ภายหลังจากใส่แผ่นเหล็กยึดกระดูก เมื่อกระดูกมีการต่อต้านกันจึงจำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อนำอุปกรณ์ออกเสมอ ซึ่งทำให้สัตว์ มีความเสี่ยงต่อการวางยาสลบซ้ำ (Bennett, 1997)

ลวดยึดกระดูก (Orthopedic wire)

การใช้ลวดยึดกระดูกไม่สามารถใช้รักษาการหักของกระดูกโดยไม่ใช้อุปกรณ์อื่นๆช่วยได้ เนื่องจากไม่มีความมั่นคงเพียงพอ จึงต้องใช้วิธีการนี้ควบคู่กันกับวิธีการอื่นๆ นอกจากนี้ การใช้ลวดยึดกระดูกไม่สามารถใช้ด้านแรงงอได้ การใช้ลวดยึดกระดูกมักใช้รักษากระดูกที่หักแบบเฉียง โดยส่วนที่เฉียงนั้นจะต้องมีความกว้างมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของกระดูก อย่างน้อย 2 เท่า หรือใช้ยึดกระดูกที่แตกรูปผีเสื้อ (butterfly fragment) กลับเข้าที่เดิม ถ้ามีการแตกของกระดูกเป็นรู (fissure fracture) อาจใช้ลวดเส้นเดียวในการยึดกระดูกกลับเข้าที่ได้

การใช้ลวดยึดกระดูกแบบ hemicerclage จะใช้เพื่อด้านแรงหมุนโดยเฉพาะในกรณีที่กระดูกหักแบบเฉียงสั้นๆ (short oblique) หรือแบบขวาง (transverse) สามารถด้านแรงหมุน และแรงเฉือนเพียงทิศทางเดียว ถ้าต้องการให้ด้านแรงหมุนและแรงเฉือนได้ทุกทิศทางต้องการใช้ลวดยึดกระดูกแบบยัดระหว่างชิ้นที่แตกเป็นรูปเลข 8 (interfragmentary figure eight) ลวดที่ใช้ในการยึดกระดูกนั้นมีหลายขนาดให้เลือกใช้ และพัฒนาเป็นวัสดุผูกเย็บที่สามารถละลายได้ (absorbable suture) และควรใช้ในสัตว์ปีกขนาดเล็ก (Howard, 1990)

แท่งเหล็กไม่เป็นสนิมยึดตามภายในโพรงกระดูก (Stainless steel intramedullary pin)

ข้อได้เปรียบของการใช้แท่งเหล็กไม่เป็นสนิมยึดตามภายในโพรงกระดูก ได้แก่ ราคาถูก แผลผ่าตัดไม่กว้าง การจัดแนวกระดูกที่หักทำได้ดี สามารถด้านแรงงอได้ดี แต่ข้อเสียก็คือความสามารถในการด้านแรงหมุนและแรงเฉือนต่ำ (Putney et al., 1983; Kuzma and Hunter, 1991; Newton and Zeitlin, 1977; Bush, 1977; Bush and James, 1975) ถ้าการยึดกระดูกที่หักไม่มีความมั่นคง จะมีการพอกของกระดูกในปริมาณมากและเหนียวนำไปเกิดโรคของกระดูกหักตามมา การพอกของกระดูกที่มากจะมีผลมากต่อการบินของนกที่ปล่อยอิสระ (Splink, 1987; Bennett, 1997)

เมื่อกระดูกของสัตว์ปีกก่อนข้างบางทำให้มีพื้นที่ในการใส่แท่งเหล็กยึดภายในโพรงกระดูกน้อย และแท่งเหล็กน้ำหนักค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลต่อการบินและการเคลื่อนไหวของขา ข้อต่อและทำให้เกิดพังผืดยึดบริเวณโดยรอบข้อต่อ (periarticular fibrosis) ซึ่งควรทำการผ่าตัดแก้ไขออกโดยเร็วที่สุด หลากๆกรณีจำเป็นที่จะต้องเอาอุปกรณ์ที่ใส่ไว้ออก เนื่องจากตัวแท่งเหล็กที่ยึดภายในโพรงกระดูกเลื่อน การนำเอาแท่งเหล็กออกทำได้สะดวก โดยการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ แล้วกรีดเปิดบริเวณเล็กๆ ที่ปลายแท่งเหล็กซึ่งมักยื่นออกมาในข้อต่อ เพื่อดึงเอาแท่งเหล็กออก

การใส่แท่งเหล็กไม่เป็นสนิมยึดตามภายในโพรงกระดูกในสัตว์ปีกต้องทำด้วยความนุ่มนวลเนื่องจากกระดูกบางและเปราะ ถ้าใช้แรงในการใส่มากเกินไปจะทำให้กระดูกแตกและแท่งเหล็กไปทิ่มบริเวณอื่นได้รับความเสียหาย การใช้ปลายแท่งเหล็กแบบหัวแหลม

ง่ายต่อการใส่ตัวแท่งเหล็ก ยึดตามภายในโพรงกระดูกและการถอนออก ในขณะที่การใช้แท่งเหล็กไม่เป็นสนิมยึดตามภายในโพรงกระดูกแบบหั่วเกลียวจะช่วยให้ในเรื่องการป้องกันการยุบของกระดูกที่หักได้

เนื่องจากการต้านแรงหมุนและแรงเฉือนนั้นเป็นข้อด้อยของการรักษากระดูกหักโดยใช้แท่งเหล็กไม่เป็นสนิมยึดภายในโพรงกระดูก จึงมีการเพิ่มความมั่นคงโดยการใส่ลวดมัดแบบ cerclage, hemicerclage, interfragmentary wire, external skeletal fixation หรือ stack pin โดยเฉพาะกรณีที่มี การหักของกระดูก humerus และ femur มักใช้ stack pin ในการรักษา อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้แท่งเหล็กควบคู่กับการพันตามกระดูกภายนอก เนื่องจากจะเป็นการรวมเอาข้อเสียของทั้งสองวิธีไว้ด้วยกันซึ่งทำให้เกิด การยึดของข้อต่อ เกิดพังผืดยึดบริเวณโดยรอบข้อต่อได้ง่าย (Kuzma and Hunter, 1991) แต่ในบางกรณีก็จำเป็นต้องใช้ทั้ง 2 วิธีร่วมกันในการรักษา ซึ่งต้องนำแท่งเหล็กหรืออุปกรณ์ ที่ใช้ตามกระดูกภายนอกออกภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากการรักษา ซึ่งกระดูกที่หักนั้นสามารถที่จะสร้างเนื้อเยื่อพังผืด และกระดูกที่มาพอกได้พอเพียงที่จะสามารถพุงบริเวณที่หักได้ (Bennett, 1997) เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งเหล็กไม่เป็นสนิมควรมีขนาดประมาณ 50-70 เปอร์เซ็นต์ ของโพรงกระดูก เพื่อให้สามารถสร้างกระดูกพอกภายในโพรงกระดูก นอกจากนี้ยังทำให้น้ำหนักของแท่งเหล็กไม่เป็นสนิมที่ใช้น้อยลง ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงของหลอดเลือดภายในกระดูก (nutrient artery) ลดความเสี่ยงของการเกิดการหักของกระดูกที่เกิดจากความผิดพลาดของสัลลัสตัวแพทย์ มีความแข็งแรงพอเพียงที่จะต้านแรงงอได้ และทำให้กระดูกนั้นจัดเรียงตัวอยู่ในแนวได้

วิธีการใส่แท่งเหล็กไม่เป็นสนิมยึดภายในโพรงกระดูกแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ แบบ normograde และแบบ retrograde การใส่แท่งเหล็กทั้งสองแบบนี้ต้องให้ปลายของแท่งเหล็กอย่างน้อย 1 ด้านฝังตัวอยู่ในส่วนของ metaphysis ของกระดูก ซึ่งส่วน metaphysis ของกระดูกของสัตว์ปีกจะบางกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม โอกาสที่จะใส่แท่งเหล็กแล้วเกินส่วน metaphysis ของกระดูกจนทะลุผิวของข้อต่อจึงเกิดได้ง่าย ทั้งในขณะที่ทำศัลยกรรม หรือ ภายหลังจากการทำศัลยกรรม ส่วน ส่วนปลายของแท่งเหล็กอีกด้านนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทะลุเข้าไปในข้อต่อ ดังนั้นความเสี่ยงของข้อต่อ จะเกิดขึ้นได้ทั้งด้านเดียว หรือเกิดทั้งสองด้าน ของกระดูกที่หัก

การใส่แท่งเหล็กไม่เป็นสนิมยึดตามผิวกระดูกแบบขวาง (cross pin) จะใช้ในกรณีที่มีการ หักของกระดูกที่ metaphysis ปลายของแท่งเหล็กไม่เป็นสนิมที่ใช้ยึดกระดูกต้องตัดให้ติดกับผิวของกระดูก หรือใช้ counter sink กรอผิวกระดูกให้ลึกเข้าไปแล้วจึงตัดแท่งเหล็กที่ใช้ยึดกระดูกให้ชิดที่สุด เนื่องจากบริเวณที่ทำการรักษานั้นเป็นบริเวณที่ใกล้กับข้อต่อ จึงอาจมีการรบกวนการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้ การใส่อุปกรณ์ยึดตามกระดูกภายนอกเช่นการพันเฟือกตาม

มักนิยมทำภายหลังการศัลยกรรม โดยเชื่อว่าสามารถเพิ่มความมั่นคงให้มากขึ้น ส่วนมากจะใส่เฟือกอ่อนเพื่อกันไม่ให้สัตว์นั้นใช้ขา แต่เฟือกอ่อนที่ใส่นั้นไม่สามารถป้องกันการเคลื่อนไหวของขาได้ (Olsen and Orosz, 2000)

แท่งยึดตามจากภายในกระดูกที่สามารถละลายได้ (Absorbable intramedullary pin)

วัสดุที่ใช้ผลิตเป็นแท่งยึดกระดูกคือ polydioxanone (PDS) ซึ่งได้มีการศึกษาถึงการใช้ PDS rod ในการรักษาการหักของ กระดูก humerus ในสัตว์ปีก โดยคุณสมบัติของ PDS rod นั้นจะสามารถละลายโดยสมบูรณ์ในระยะเวลา 6 เดือน ภายหลังจากที่ใส่อุปกรณ์ดังกล่าวเข้าไป ข้อเสียของ PDS rod คือมีความแข็งแรงไม่เท่าแท่งเหล็กไม่เป็นสนิมยึดภายในกระดูก

ในการศึกษาการยึดกระดูก humerus ของนกพิราบและยึดภายในโพรงกระดูกด้วย PDS rod เปรียบเทียบกับการใช้ แท่งเหล็กไม่เป็นสนิมยึดภายในโพรงกระดูก จะพบว่ากระดูกที่หักและรักษาโดยใช้ PDS rod ในการตรึง มีการพอกของกระดูกมากกว่าการใช้แท่งเหล็กไม่เป็นสนิมยึดภายในโพรงกระดูก ซึ่งอาจเกิดจากการที่ตัวของ PDS rod มีความแข็งแรงน้อยกว่า ข้อดีของการใช้ PDS rod คือไม่จำเป็นที่จะต้องนำเอาตัว rod ออกเยื้องจากน้ำหนักเบา ไม่รบกวนการทำงานของ ข้อต่อ ส่วนข้อเสียคือ วิธีการใส่นั้นยุ่งยากและต้องอาศัยความชำนาญ (Bennett, 1997)

การใช้แท่ง Polypropylene rods

Polypropylene rods มีจำหน่ายในรูปแบบการค้าโดยผลิตออกมาหลายขนาด (3/32, 1/8, 5/32, 3/16 นิ้ว) ซึ่งเหมาะกับสัตว์ปีกที่น้ำหนักไม่น้อยกว่า 75 กรัม มีคุณสมบัติทางชีวภาพที่เฉื่อย (biological inert) สามารถผ่านการฆ่าเชื้อโดยใช้วิธีสเตอริไลเซชัน ในเครื่องอบไอน้ำฆ่าเชื้อ (autoclave) มีน้ำหนักเบาเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แท่งเหล็กไม่เป็นสนิมยึดตามภายในโพรงกระดูก มีราคาถูก สามารถตัดให้ได้ขนาดเท่าที่ต้องการได้ และใส่ในโพรงกระดูกโดยใช้ shuttle technique ซึ่งตัวแท่ง polypropylene rods จะไม่สามารถต้านแรงหมุน และแรงเฉือนได้เช่นเดียวกับการใช้แท่งเหล็กไม่เป็นสนิมยึดภายในโพรงกระดูก จึงต้องใช้วิธีการอื่นช่วยในการต้านแรงดังกล่าว วิธีการที่ใช้ ได้แก่ การใช้ อุปกรณ์ยึดตามกระดูกจากภายนอก (external skeletal fixator) หรือการใช้ intramedullary polymethylmethacrylate อุดเข้าไปในโพรงกระดูกเพื่อต้านการหมุน (Bennett, 1997)

การใช้ polypropylene rods รักษากระดูกหักในสัตว์ปีกโดยวิธี shuttle technique นั้นใช้ได้ดีเมื่อมีการหักตรงกลางท่อน กระดูกที่ไม่มีการติดเชื้อหรือมีการแตกของกระดูกออกเป็นหลายๆชิ้น ความยาวของ polypropylene rods ที่ใช้จะยาวเท่ากับความยาวของกระดูกหักชิ้นที่ยาวที่สุด โดย จะตัด polypropylene rods ให้ยาวกว่าชิ้นกระดูกหักที่ยาวที่สุดนั้นเล็กน้อย แล้วจึงใส่วัสดุผูกเย็บผ่านรูที่เจาะที่ปลายด้านหนึ่งของ polypropylene rods (ความยาวของวัสดุผูกเย็บควรต้องยาวกว่าความยาวของ polypropylene rods เพียงพอสำหรับจับดึงได้สะดวก) แล้วจึงใส่ปลายด้านที่มี

วัสดุผูกเย็บร้อยอยู่นั้นเข้าไปในโพรงกระดูกของชิ้นกระดูกหักที่ยาวที่สุด แล้วดันให้ polypropylene rods ไปชิดกับ metaphyseal cancellous bone ของกระดูกชิ้นนั้น ดึงและจัดกระดูกที่หักกลับเข้าที่ ให้ปลายของวัสดุผูกเย็บนั้นออกมาทางช่องว่างระหว่างรอยหักของกระดูก (fracture gap) แล้วดึงปลายทั้ง 2 ของวัสดุผูกเย็บในทิศทางตรงกันข้ามกับตอนแรก เพื่อให้ส่วนของ polypropylene rods ถูกดึงไปยังส่วนของกระดูกที่หักอีกชิ้น จึงจนกว่าตัว polypropylene rods จะชิดกับ metaphyseal cancellous bone ของกระดูกชิ้นนั้น จากนั้นอาจจะตัด หรือ ดึงวัสดุผูกเย็บออก

เนื่องจาก polypropylene rods มีความแข็งแรงไม่เท่ากับแท่งเหล็กไม่เป็นสนิมที่ใช้ยึดตามภายในโพรงกระดูก การใช้ polypropylene rods ในการยึดกระดูกจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์อย่างอื่นช่วยในการยึดตามกระดูก เพื่อป้องกันการเกิดการเคลื่อนเล็กน้อย (micromotion) ของบริเวณปลายที่หัก ซึ่งจะมีผลทำให้การหายของกระดูกช้าลง (delayed union) (Maccoy, 1996; Bennett, 1997)

การใช้ polypropylene rods มีข้อได้เปรียบ คือ ไม่ทำให้ผิวของข้อต่อเกิดความเสียหาย สัตว์กลับมาใช้งานได้เร็ว สามารถทำกายภาพบำบัดภายหลังจากการผ่าตัด 7 วัน ส่วนข้อจำกัดของ polypropylene rods คือ มีความแข็งแรงน้อยกว่าแท่งเหล็ก ไม่สามารถใช้รักษากระดูกหักที่เกิดใกล้กับข้อต่อมากๆ หรือมีชิ้นที่หักของกระดูกชิ้นใดชิ้นหนึ่งสั้นมากๆ หรือมีการหักของกระดูกออกเป็นหลายๆชิ้น โดยเฉพาะห้ามใช้ในการรักษาการหักของกระดูกแบบเปิด เนื่องจากไม่สามารถนำ polypropylene rods ออกจากกระดูกได้ภายหลังที่เกิดการติดของกระดูก ถ้ามีการติดเชื้อจากแผลเปิดในบริเวณที่ทำการผ่าตัด อาจเป็นทางให้เชื้อปนเปื้อนกับอุปกรณ์เข้าไปสู่โพรงกระดูกได้ ซึ่งสัตว์จะเกิดการอักเสบและติดเชื้อของกระดูก (osteomyelitis) ตามมา (Maccoy, 1996; Bennett, 1997)

การใช้แท่งเหล็กที่มีเกลียวทั้งอัน (Threaded steel shuttle pins)

การใช้แท่งเหล็กที่มีเกลียวทั้งอันแทนการใช้ polypropylene rods เนื่องจาก polypropylene rods มีความแข็งแรงน้อยกว่าแท่งเหล็ก ส่วนแท่งเหล็กธรรมดานั้นมีความสามารถในการยึดติดกับพื้นผิวของกระดูกได้ดีไม่เท่าแท่งเหล็กที่มีเกลียว จึงได้มีการพัฒนาแท่งเหล็กที่มีเกลียวทั้งอันในการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกแทน (Bennett, 1997)

ซีเมนต์กระดูกเชื่อมภายในกระดูก (Intramedullary polymethylmethacrylate; PMMA)

โพลีเมทิลเมทาครีเลต (PMMA) เป็นซีเมนต์ที่ใช้กับกระดูกที่ผลิตจำหน่ายในรูปของของเหลว 20 มิลลิลิตร กับผงโพลีเมอร์ซึ่งมีแบเรียมซัลเฟต (barium sulfate) เป็นองค์ประกอบ 40 กรัม ซึ่งแยกจากกันและเตรียมในรูปที่ปราศจากเชื้อ เมื่อผสมแล้วจะเป็นสารทึบแสงสำหรับรังสีวินิจฉัย (radiopaque) ส่วนที่เป็นของเหลวนั้นค่อนข้างไวต่อแสงจึงควรเก็บไว้ในที่มืดหรือที่ทึบแสง เมื่อผสมวัสดุทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกันแล้วปริมาตรจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์

การใช้ PMMA อาจจะใช้ในการยึดกระดูกโดยไม่ใช้อุปกรณ์อื่นหรือใช้อุปกรณ์อื่นร่วมด้วยในการรักษาก็ได้ คุณสมบัติของ PMMA นั้นเหมาะสมกับการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีก เนื่องจากตัววัสดุมีน้ำหนักเบา มีความคงตัวเร็ว ไม่รบกวนการทำงานของข้อต่อ ช่วยให้สัตว์สามารถกลับมาใช้กระดูกส่วนที่หักได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีรายงานอัตราการหายของกระดูกโดยการใช้ PMMA เทียบเท่ากับการหายของกระดูกที่รักษาโดยการพันปีก (Kuzma and Hunter, 1989) อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระวังในการใช้ PMMA ในการรักษากระดูกหักคือต้องระวังการติดเชื้อเนื่องจากการใส่ PMMA เข้าไปในโพรงกระดูกนั้นไม่สามารถที่จะนำตัว PMMA ออกได้ ภายหลังจากการเกิดการหายของกระดูก ดังนั้นถ้ามีการติดเชื้อเกิดขึ้น PMMA จะเป็นส่วนที่สะสมเชื้อเอาไว้ และทำให้การติดเชื้อนั้นเกิดอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการใช้ยาปฏิชีวนะที่ทนต่อความร้อนผสมกับส่วนผสมของ PMMA ในการยับยั้งการเจริญ ของเชื้อแบคทีเรียแต่ยาก็สามารถที่จะออกฤทธิ์ได้ในระยะเวลา 5 ปีเท่านั้น ดังนั้นถ้ากระดูกที่หักนั้นเป็นแบบเปิด หรือมีการติดเชื้อเกิดขึ้นแล้ว ก็ไม่ควรที่จะใช้ PMMA ในการรักษา นอกจากนี้ PMMA ยังเปราะและแตกได้ง่าย โดยเฉพาะบริเวณที่มีการหักของกระดูก จึงไม่แนะนำให้ใช้ PMMA รักษากระดูกหักในสัตว์ปีกที่มีน้ำหนักมากกว่า 500 กรัม (Putney et al., 1983; Bennett, 1997) มีรายงานถึงการใช้ PMMA ในการรักษาการหักของกระดูก humerus ในนกพิราบ พบว่ามีการหายของกระดูกอย่างสมบูรณ์โดยที่ตัว PMMA นั้นไม่มีความเป็นพิษเกิดขึ้น (Borman and Putney, 1978) แต่การรักษาการหักของกระดูกโดยการใช้ PMMA เพียงอย่างเดียวนั้นอาจมีข้อเสียหลักคือ บริเวณที่เป็นรอยต่อของกระดูกที่หัก ทั้งสองท่อนนั้นจะเป็นจุดอ่อนซึ่งจะทำให้มีการแตกของ PMMA ได้ ไม่ควรให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของ PMMA อยู่ระหว่างรอยต่อของกระดูกเนื่องจากจะเป็นตัวขัดขวางการต่อต้านกันของกระดูกและทำให้บริเวณที่เชื่อมกันเป็นโพรง ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่อาจเกิดการแตกของกระดูกขึ้นได้อีก และการเกิดความร้อนในขณะที่ตัว PMMA เกิดกระบวนการ polymerization อาจเป็นสาเหตุของการเกิดการตายของกระดูกตามมา ซึ่งจากการทดลองของ Yamazoe และคณะนั้นไม่พบว่าการเกิดความร้อนจากกระบวนการ polymerization ไปมีผลรุนแรงต่อหลอดเลือดภายในโพรงกระดูก (endosteal blood supply) หรือการหายของกระดูก (Yamazoe et al., 1994)

จากรายงานการวิจัย พบว่ามีการแนะนำให้ใช้ซีเมนต์กระดูกเชื่อมภายในกระดูก (PMMA) ร่วมกับอุปกรณ์ยึดกระดูกอื่นๆ เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการต้านแรงหมุนและแรงงอ ซึ่งข้อจำกัดของการใช้คือ กระดูกหักแต่ละชิ้นนั้นต้องมีความยาวมากกว่า 1-2 เซนติเมตร เพื่อให้มีความมั่นคงพอเพียง และ ต้องใช้เทคนิคอื่นๆในการเพิ่มการยึดเกาะระหว่างส่วนของอุปกรณ์และ ซีเมนต์กระดูก (Samour, 1992; Bennett, 1997)

The Doyle Technique

Doyle Technique ได้พัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของการเกิดแรงกดที่บริเวณรอยหักของกระดูก ทำให้กระดูกมีการหายได้เร็วขึ้น จึงใช้เทคนิคของการใส่ rush pin ร่วมกับการใช้ external fixation โดยปลายของ pin ที่ยื่นออกมานอกผิวหนังเชื่อมกันโดยใช้ dental impact rubber band เพื่อให้มีแรงกดเพิ่มขึ้นที่บริเวณที่เกิดการหัก และต้านแรงหมุน Doyle system นั้นมีน้ำหนักเบากว่า external fixation เนื่องจาก rush pin มีขนาดเล็ก และใช้ pin จำนวนน้อย แต่ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้เทคนิคนี้เปรียบเทียบกับเทคนิคอื่นๆ (Bennett, 1997)

เทคนิคการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกโดยใช้ Shuttle pinning

เทคนิคนี้เริ่มใช้ในการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกตั้งแต่ปี 1985 โดย Coles และในปี 1986 โดย Redig และปี 1991 โดย Tom และ Norbet ซึ่งทั้งหมดใช้วิธีการรักษาที่เหมือนกัน หรือมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย Coles, Tom และ Norbet ใช้ polypropylene ที่ได้จากการประยุกต์นำกระบอกฉีดยาชนิด 1 มิลลิลิตร และ 2 มิลลิลิตร มาใช้แทน polypropylene ที่ผลิตขายในรูปแบบทางการค้า ซึ่ง Coles ใส่ shuttle pin ในโพรงกระดูก humerus และใช้ ลวดมัดเป็น orthopedic wire เพื่อด้านแรงหมุน และทำให้ปลายกระดูกติดกันมากขึ้น ส่งผลให้กระดูกหายเร็วขึ้น ในขณะที่ Tom และ Norbet ใส่ shuttle pin พร้อมกับการใช้ซีเมนต์กระดูก (Coles, 1985) การรักษาโดยใช้เทคนิคนี้ อาศัยหลักของการใส่แท่งเหล็กเพื่อยึดตามภายในโพรงกระดูก จึงมีข้อดีที่คล้ายกัน ในขณะที่วิธีการนี้ ก็สามารถกำจัดข้อเสียเรื่อง การรบกวนการทำงานของข้อต่อได้ การรักษาโดยใช้วิธีนี้ที่ปีกของสัตว์อาจไม่จำเป็นต้องพันผ้าพันแผลเพื่อค้ำไว้ แต่สัตว์อาจต้องพักในกรง โดยปีกที่หักเริ่มขยับได้ใน 24-48 ชั่วโมง ภายหลังการทำศัลยกรรม ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดข้อยึดตามมา ส่วนมากการรักษากระดูกหัก โดยการใช้ shuttle pin มักใช้กับกระดูก humerus เนื่องจากเป็นกระดูกที่มีโพรงอากาศ อยู่ภายใน จึงมีขนาดของโพรงกระดูกที่ใหญ่ ไม่เหมาะสมกับการใช้ แท่งเหล็ก ซึ่งจะรบกวนการสร้างกระดูกพอกภายใน รบกวนการทำงานของข้อต่อ และอาจเกิดโรคของกระดูกหัก (fracture disease) ตามมา การรักษาโดยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว เนื่องจากมีน้ำหนักเบาจึงสามารถทิ้งไว้ในกระดูกได้ แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงผลของการรักษากระดูกหักในระยะยาว และยังไม่มีการนำวิธีนี้มารักษาในกระดูก tibiotarsus เนื่องจากเชื่อว่าจะมีความมั่นคงไม่เพียงพอที่จะทำให้การหายของกระดูกได้

เทคนิคนี้ถ้าใช้แทนกระบอกฉีดยาแทนการใช้ polypropylene ที่ผลิตขายในรูปแบบทางการค้า เชื่อว่าจะไม่รบกวนการหายของกระดูกและการสร้างกระดูกพอกภายใน เนื่องจากรูปร่างของ

แกนกระดูกซี่โครงที่มีร่องอยู่ (cruciform shape) ทำให้มีการสร้างของกระดูกภายในโพรงกระดูกเกิดขึ้นได้ดีกว่าแท่ง polypropylene ที่ผลิตขายในรูปแบบทางการค้าซึ่งเป็นทรงกระบอก

การใช้ shuttle pin ในการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกนั้นอาจใช้กระดูกที่เป็น biodegradable bone ทดแทนได้ ซึ่งได้ผลดีในการรักษากระดูกหัก แต่ยังมีราคาสูงอยู่

ปัญหาแทรกซ้อนภายหลังการรักษา

การต่อติดของผิดรูป (misalignment) สัตว์ปีกที่มีกระดูกหัก จะเห็นการต่อติดของกระดูกผิดรูปได้ด้วยตาเปล่า ในระดับที่ต่าง ๆ กัน เนื่องจากกล้ามเนื้อของสัตว์ดึงปลายกระดูกที่หักให้แยกออกจากกัน แม้การเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นเกิดในระดับมหภาค แต่การต่อติดของกระดูกโดยเนื้อเยื่อพังผืดและกระดูกพอกยังคงเกิดขึ้นได้โดยมีการสร้างเนื้อเยื่อพังผืดที่แข็งแรงและมีปริมาณมากเพื่อรักษาแนวกระดูกหักเอาไว้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงกระดูกที่หักกลับเข้าที่ให้สมบูรณ์ใกล้เคียงกับลักษณะทางกายวิภาคเดิมให้มากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยง การเกิดกระดูกพอกมากเกินไป ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการทำงานของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นจากการถูกกดทับ

การต่อติดของกระดูกโดยมีการยึดติด (entrapment) การสร้างเนื้อเยื่อไฟบรอสรอบๆ บริเวณกระดูกหักเพื่อเป็นโครงร่างของกระดูกที่จะต่อติด อาจไปยึดติดกับเนื้อเยื่ออื่นๆข้างเคียง และส่งผลต่อการทำงานของเนื้อเยื่อโดยรอบ

การบิด หมุน (deviation) ของกระดูกส่งผลต่อการบินและการทรงตัวของสัตว์ปีกเป็นอย่างมาก เนื่องจากการไหลของอากาศผ่านปีก เพื่อยกตัวสัตว์และพุงในการบินนั้น จำเป็นต้องใช้มุมที่พอเหมาะของปีก เพื่อให้มวลอากาศไหลผ่านปีกอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การหมุนของปีกเพียงเล็กน้อยส่งผลอย่างมากต่อการบินของสัตว์ เช่นเดียวกับการเดิน ซึ่งส่งผลให้สัตว์ลดประสิทธิภาพในการหาอาหาร และความสามารถในการดำรงชีวิต

ข้อต่อยึด (ankylosis) ส่วนมากการเกิดปัญหานี้มักถูกกละเลยมองข้ามจากสัตวแพทย์ จนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว ก็หมดหนทางที่จะรักษาการทำหน้าที่ของข้อต่อบริเวณนั้นเอาไว้ได้ โดยส่วนมากการเกิดข้อยึดนั้นมักพบบ่อยภายหลังการรักษา 5 วันขึ้นไป โดยพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น เกิดได้จากการหักของกระดูกที่เกิดขึ้นใกล้กับข้อต่อ ทำให้มีการสร้างเนื้อเยื่อพังผืดและเนื้อเยื่อของแผลเป็นขึ้นบริเวณข้อต่อ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่การเกิดข้อยึดจะเกิดขึ้นเนื่องจากสัตว์ไม่ได้ใช้งานหรือไม่ได้เคลื่อนไหวข้อต่อที่มีเนื้อเยื่อพังผืดนั้น ดังนั้นการป้องกันการเกิดข้อยึดจึงทำได้โดยใช้การรักษาที่ทำให้สัตว์สามารถกลับมาบินหรือเดินได้เร็วที่สุด การเกิดข้อยึดมักเป็นปัญหาที่พบบ่อยกว่าที่ขา การขยับข้อต่อหรือบริเวณที่หัก แม้ว่าจะช่วยป้องกันข้อยึดได้ แต่การเคลื่อนของปลายกระดูกที่หักจากการขยับ จะส่งผลต่อการพอกของกระดูกในปริมาณมากเช่นกัน

ซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้ ดังนั้นการรักษากระดูกหักโดยการยึดปลายกระดูกหักอย่างมั่นคง ในขณะที่ข้อต่อสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเป็นสิ่งจำเป็น

การเคลื่อนของแท่งเหล็ก (pin migration) มักส่งผลกระทบต่อการทำงานของข้อต่อหรือทิ่มแทงอวัยวะอื่นๆ ได้รับความเสียหาย เมื่อเกิดการเคลื่อนของแท่งเหล็กขึ้น อาจรักษาได้โดยการดักแท่งเหล็กกลับเข้าที่เดิม หรือการถอนแท่งเหล็กออกเมื่อพิจารณาแล้วว่า บริเวณที่หักมีความมั่นคงพอเพียง การดักแท่งเหล็กกลับเข้าไปใหม่มักมีความแข็งแรงน้อยกว่าแท่งเหล็กที่ใส่ไว้ครั้งแรก และเสี่ยงต่อการเคลื่อนของแท่งเหล็กซ้ำ แต่ถ้าสัตวแพทย์พิจารณาเห็นว่ายังมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทำให้เกิดการหายของกระดูกได้ก็จะยังไม่พิจารณานำแท่งเหล็กออก

การอักเสบจากการติดเชื้อในโพรงกระดูก (osteomyelitis) การเกิดการอักเสบจากการติดเชื้อนั้นเกิดได้จากการใส่อุปกรณ์ยึดกระดูกที่ไม่สะอาด และใช้การยึดภายในกระดูกในการรักษากระดูกที่หักแบบเปิด โดยในสัตว์ปีกนั้นจะไม่ค่อยมีการแสดงอาการทางระบบ และบริเวณที่เกิดโรคนั้นจะเป็นก้อนหนองแข็งๆ (caseous) และที่ปลายของกระดูกจะเป็นกระดูกที่ตาย ทำให้กระบวนการหายของกระดูกนั้นช้าหรือหยุดไป ซึ่งในการรักษาการติดเชื้อที่โพรงกระดูก จำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดขูด รื้อเอากระดูกและส่วนที่มีการติดเชื้อออก เพาะเชื้อบริเวณที่มีการติดเชื้อใส่อุปกรณ์ยึดกระดูกที่มีความแข็งแรงมาก ซึ่งมักพิจารณาใช้แท่งเหล็กยึดกระดูกจากภายนอก ในการรักษา (Bennett, 1997; Coles, 1985)

การรักษากระดูก ทิเบียทาร์ซัส (tibiotarsus) หักในสัตว์ปีก

กระดูก tibiotarsus เป็นกระดูกที่เกิดจากการต่อติดของกระดูก tibia และ กระดูก proximal tarsal การต่อติดของกระดูก เกิดขึ้นในกระดูกหลายๆ ท่อนทั่วร่างกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกแต่ละท่อน และลดมวลรวมของกระดูกทั้งหมด อีกทั้งเพื่อให้ลักษณะทางกายวิภาคเหมาะสมกับการทรงตัวและการบิน ส่วนของกระดูก fibula มีความยาวสิ้นสุดประมาณกึ่งกลางของกระดูก tibiotarsus ด้านบนของกระดูก tibiotarsus คือกระดูก femur ส่วนด้านล่างคือกระดูก metatarsus การหักของกระดูก tibiotarsus มีอุบัติการณ์การเกิดดังที่กล่าวไปแล้ว โดยส่วนมากการหักของกระดูกท่อนนี้ มักจะเป็นชนิดขวาง ทั้งกรณีที่หักตรงกลาง (midshaft) ซึ่งการหักของกระดูกมักเกิดตรงจุดที่กระดูก fibula สิ้นสุด และหักด้านล่าง (distal) มักมีแผลเปิดหรือการทะลุของกระดูกออกมานอกผิวหนัง การบิดหมุนของกระดูกที่หัก มักเกิดจากกล้ามเนื้อ digital flexor ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่สำคัญในการตะครุบเหยื่อ การรักษากระดูกท่อนนี้จึงต้องรักษาโดยการผ่าตัด การรักษากระดูกท่อนดังกล่าวมีรายงานโดย Coles ซึ่งเสนอว่าวิธีการรักษากระดูก humerus หัก สามารถรักษากระดูกท่อนนี้ได้เช่นกัน แต่ปัญหาที่พบบ่อยๆ ในการรักษากระดูก tibiotarsus หัก คือการบิดหรือหมุนของกระดูก การรักษาโดยใช้แท่งเหล็กยึดตามกระดูกภายในจึงยังไม่ประสบความสำเร็จ

เท่าที่ควร วิธีการอื่นๆที่นำมาใช้ในการรักษาได้แก่ การใช้แผ่นเหล็กยึดตามกระดูก การใช้แท่งเหล็กยึดตามกระดูกจากภายนอก การพันตามกระดูก เป็นต้น

การรักษากระดูกหักโดยการใส่แท่งเหล็กยึดตามภายในโพรงกระดูก มักใส่แท่งเหล็กแบบ normograde ซึ่งเริ่มต้นใส่จากด้านบนของกระดูก tibiotarsus และกรีดเปิดเข้าถึงกระดูกเพื่อดึงกระดูกกลับและจัดแนวโดยการเปิดผ่าทาง craniomedial ระหว่างกล้ามเนื้อ cranial tibial และ medial gastrocnemius ซึ่งกล้ามเนื้อทั้งสองมัดนั้นเชื่อมกันโดยเนื้อเยื่อฟาสเซียผิวๆเท่านั้น สามารถแยกออก จากกันและเข้าสู่กระดูก tibiotarsus ได้โดยง่าย การใส่แท่งเหล็กนั้นจะใส่แบบ retrograde ก็ได้ ซึ่งทั้งสองวิธีนั้นจะพบว่าแท่งเหล็กยื่นเข้าไปในข้อเข่า (stifle joint) เสมอ ในขณะที่ถ้าใส่แท่งเหล็กไม่ดี หรือทะลุเข้าข้อด้านล่าง จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของ tarsal joint ด้วย ผิวของข้อต่อ ทั้งทางด้านบนและทางด้านล่างจึงมักได้รับความเสียหาย และอาจไปรบกวนการทำงานของเส้นเอ็นสำหรับงอ (flexor tendons) ซึ่งทำให้สัตว์ไม่สามารถใช้ขาได้ชั่วคราวหรือถาวร (Hacourt-Brown, 2005) เมื่อกระดูกต่อติดแล้ว มักต้องนำแท่งเหล็กออกเสมอเพื่อรักษาหรือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทำให้สัตว์เสี่ยงในการวางยาสลบซ้ำ

จากรายงานการวิจัย หลายๆรายงานแนะนำให้ใช้แท่งเหล็กยึดตามกระดูกจากภายนอกชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ซึ่งเชื่อว่าเป็นวิธีการหลักในการรักษากระดูกท่อนี้หัก เนื่องจากมีความเหมาะสมในหลายๆด้าน กระดูก tibiotarsus มักหักที่บริเวณกึ่งกลางกระดูกจนถึงด้านล่างของกระดูก และมักพบการหักแบบเปิดเนื่องจากผิวหนังของสัตว์ที่บางและมีกล้ามเนื้อปกคลุมอยู่น้อย โดยเฉพาะด้านล่างของกระดูก การใส่แท่งเหล็กยึดกระดูกท่อนี้ เพื่อให้มีความมั่นคงมากที่สุดแนะนำให้ใส่อย่างน้อย 3 อันด้านบนของรอยหัก และ 3 อันด้านล่างของรอยหัก ปลายแท่งเหล็กควรทะลุผิวกระดูกทั้งสองด้านจะเห็นได้ว่าวิธีนี้สามารถรักษากระดูกหักได้มั่นคงและดีที่สุดเมื่อมีการหักตรงกลางกระดูกกรณีที่กระดูกหักตรงปลายนั้น หลักเลียงไม่ได้ที่จะต้องใส่แท่งเหล็กตามกระดูกจากภายนอกผ่านข้อต่อ (transarticular fixation) เพื่อให้มีความแข็งแรง มั่นคง และมีพื้นที่ในการใส่อุปกรณ์พอเพียง ซึ่งเมื่อเกิดกระดูกต่อติด มักจะเกิดข้อยึดทั้งแบบชั่วคราว ซึ่งอาจรักษาได้โดยการทำกายภาพบำบัด และแบบถาวร หลักการใส่แท่งเหล็กในสัตว์ปีก เป็นเช่นเดียวกับหลักการรักษาในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการใส่แท่งเหล็กยึดตามกระดูกจากภายนอกจะเป็นวิธีการที่แนะนำ แต่ปัญหาจากการรักษากระดูกหักโดยใช้วิธีนี้ที่พบได้ เช่น การครูดของอุปกรณ์กับผิวหนัง อุปกรณ์ยึดกระดูกได้ไม่มั่นคง เนื่องจากกระดูกบาง อุปกรณ์หลุดก่อนกำหนด กระดูกแตกจากการเจาะรูเพื่อใส่อุปกรณ์ การติดเชื้อ การหายของกระดูกช้า อุปกรณ์น้ำหนักมาก รบกวนการเคลื่อนไหวของสัตว์ ไม่สามารถแก้ปัญหากระดูกบิดหมุนได้สมบูรณ์ การจัดเรียงแนวกระดูกทำได้ไม่ดี ทำให้สัตว์ไม่สามารถใช้ขารับน้ำหนักได้เต็มที่ เป็นต้น ปัญหาต่างๆดังกล่าวนี้ จึงทำให้มี

การพัฒนานาอุปกรณ์อื่นมาทดแทนอุปกรณ์แบบเดิม เพื่อให้มีน้ำหนักเบา เช่น การใช้เข็มฉีดยาและ hexcelite เพื่อให้มีความมั่นคงมากขึ้น เช่น การนำแท่งเหล็กแบบมิกลิยมาใช้แทนแท่งเหล็กธรรมดา แม้ว่าจะมีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นมากมาย แต่ก็ยังได้รับผลการรักษาที่ไม่แน่นอน (Hacourt-Brown, 2005; Olsen and Orosz, 2000)

จากลักษณะทางกายวิภาค ปัญหาหลักของการรักษากระดูกท่อนี้จึงเกิดจากการบิดหมุนของกระดูก ซึ่งควรที่จะต้องใช้อุปกรณ์ที่สามารถต้านแรงหมุนได้ดี ส่วนปัญหาอื่นๆ มักเกิดจากความไม่เหมาะสมของอุปกรณ์ เช่น มีน้ำหนักมาก อุปกรณ์ยื่นออกมานอกตัวสัตว์และครูดกับผิวหนัง อุปกรณ์ยื่นออกมานอกกระดูกและทำลายผิวข้อต่อ และปัญหาเรื่องการวางยาสลบซ้ำ การรักษาด้านที่หักได้ ไม่สมบูรณ์และทำให้สัตว์ลงน้ำหนักได้ไม่เต็มที่ และจะเนี่ยวนำให้ขาอีกข้างเป็นโรค bumblefoot ตามมา (Hacourt-Brown, 2005)

จากการทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยพบว่า การรักษากระดูก tibiotarsus หักนั้นต้องอาศัยการต้านแรงที่เกี่ยวข้องกับการบิดหมุน ซึ่งเป็นแรงที่สำคัญเมื่อมีการหักของกระดูกท่อนี้ แบบขวาง วิธีการรักษาในปัจจุบันที่นิยมนั้นยังพบปัญหาต่างๆ เช่น การหลุดของอุปกรณ์ก่อนกำหนด กระดูกหักเพิ่มจากการเจาะรูเพื่อใส่อุปกรณ์ การรบกวนการทำงานของข้อต่อเมื่อเกิดการเคลื่อนของ แท่งเหล็ก ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าควรมีวิธีการรักษาที่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาแทรกซ้อนภายหลังการรักษาได้ จึงคิดว่าควรนำการรักษาโดยการประคบด้วย แกนกระบอกฉีดยาตามภายในกระดูกทดแทนการใส่ แท่งเหล็กยึดตามภายในกระดูก ในการรักษาร่วมกับการใช้แท่งเหล็กขนาดเล็กแทงขวางกระดูกเพื่อลดแรงหมุน โดยอาศัยหลักการของ interlocking nail ในการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกมาศึกษา

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 3

ระเบียบวิธีวิจัย

สัตว์ทดลอง

การวิจัยนี้ทำในไก่ ซึ่งใช้เป็นตัวแทนสัตว์ปีก โดยแบ่งไก่ออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่รักษากระดูก tibiotarsus ที่ตัดเพื่อให้หักโดยการใส่แกนกระดูกนิตยาคามภายในโพรงกระดูก

ไก่จำนวน 10 ตัว เพศผู้ อายุ 3 เดือนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญ ปลอดการติดเชื้อ reo virus และไม่มีภาวะผิดปกติทางคลินิก

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่รักษากระดูก tibiotarsus หักโดยการใส่ แท่งเหล็กนิตยาคามภายในโพรงกระดูก

ไก่จำนวน 9 ตัว เพศผู้ อายุ 3 เดือน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญ ปลอดการติดเชื้อ reo virus และไม่มีภาวะผิดปกติทางคลินิก

ไก่ทั้งสองกลุ่มได้รับการตรวจร่างกาย และถ่ายภาพทางรังสีวิทยา ก่อนได้รับการวางยาสลบเพื่อศัลยกรรมต่อไป

การวางยาสลบสัตว์ปีก

ไก่ทุกตัวได้รับการงดอาหารและน้ำเป็นเวลา 6 ชั่วโมงก่อนทำศัลยกรรม นิตยาคาม Gentamicin 1.25 มก./ตัว และ morphine 0.5 มก./กก. เข้ากล้ามเนื้อ แล้วชักนำการสลบด้วยก๊าซไอโซฟลูเรน (isoflurane) ความเข้มข้น 4% และควบคุมการสลบด้วยก๊าซไอโซฟลูเรน ความเข้มข้น 3% และก๊าซออกซิเจนอัตราการไหล 1.5 ลิตรต่อนาที ผ่านหน้ากากดมสลบสำหรับสัตว์

การทำศัลยกรรม

ไก่กลุ่มที่ 1 รักษากระดูก tibiotarsus หักโดยการใส่แกนกระดูกนิตยาคามภายในโพรงกระดูก ยึดคานภายในกระดูก

1. จัดให้ไก่อยู่ในท่านอนตะแคงขวา (right lateral recumbency) ถอนขนตั้งแต่บริเวณต้นขาจนถึงส่วนของกระดูก metatarsus ทั้งด้านในและด้านนอกของขา เตรียมบริเวณผ่าตัดโดยเทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic technique) และคลุมผ้าผ่าตัดโดยสอดส่วนปลายของขา ผ่านหน้าด่างของผ้าคลุม จากนั้นพันปลายเท้า โดยใช้ผ้ายึดปราศจากเชื้อ (รูปที่ 1)

2. ผ่าเปิดผิวหนังทางด้านใน (medial) ของกระดูก tibiotarsus โดยเปิดผิวหนังแค่ระดับปลายล่าง (distal third) ไปจนถึงเหนือข้อตาคุ่ม (รูปที่ 2)

3. ที่ด้านบนของกระดูก tibiotarsus แยกกล้ามเนื้อ fibularis longus ไปทางด้านหน้าและ medial head ของ gastrocnemius ไปทางด้านหลัง แยกกล้ามเนื้อออกจากกัน ดึงรั้ง medial head ของ gastrocnemius มาทางด้านหลังเพื่อที่จะได้เห็นกระดูก tibiotarsus ได้ชัดเจน (รูปที่ 3 ก และ 3 ข)

4. เหนี่ยวนาให้กระดูก tibiotarsus หักโดย ใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดกระดูกให้ขาดจากกันบริเวณเหนือ hock ประมาณ 3 เซนติเมตร (รูปที่ 4)

5. เตรียมแกนกระบอกฉีดยา (tuberculin syringe (Nipro®)) โดยดึงลูกยางออก และตัดส่วนท้าย ที่ใช้เป็นก้านของแกนกระบอกฉีดยาออก จากนั้น ใช้ polydioxanone ขนาด 3-0 USP พันรอบปลายทางด้านบนของแกนกระบอกฉีดยา (รูปที่ 5)

6. ดึงวัสดุผูกเย็บให้ตึงแล้วสอดแกนกระบอกฉีดยาที่เตรียมไว้เข้าไปในโพรงกระดูก (medullary canal) ของส่วนบน (proximal fragment) ของกระดูก tibiotarsus ที่หัก ดันตัวแกนไปจนชนกับ metaphysis ของ tibiotarsus ตัดแกนที่ยื่นออกมาโดยไม่ต้องตัดวัสดุผูกเย็บ แล้วจัดกระดูกกลับเข้าที่แล้วดึงปลายของวัสดุผูกเย็บทั้งสองปลายพร้อมกัน ลงมาตามแนวแกนของกระดูก เพื่อดึงรั้งให้ส่วนล่างของแกนกระบอกฉีดยาเข้าไปอยู่ในโพรงกระดูกชั้นล่างจนถึงส่วนของ metaphysis ของ tibiotarsus ด้านล่าง (shuttle technique) (Maccoy, 1996) (รูปที่ 6 ก, 6 ข, 6 ค)

7. ใช้แท่งเหล็กตามภายในโพรงกระดูก ขนาด 2.0 มิลลิเมตร และสว่านไฟฟ้าเจาะผ่านเปลือกกระดูกแกนกระบอกฉีดยาและเปลือกกระดูกอีกด้าน ทั้งทางด้านบน และด้านล่างของรอยหัก ให้ห่างจากรอยหักด้านละ 1 เซนติเมตร ตัด pin ให้เหลือปลายโผล่ออกมาจากผิวกระดูกเล็กน้อย กรณีที่แท่งเหล็กไม่สามารถยึดกระดูกได้อย่างมั่นคงใช้ลวดขนาดเหมาะสมในการรัดกระดูกและแกนกระบอกฉีดยาในโพรงกระดูกยึดเพื่อดันแรงหมุนแทน (รูปที่ 7)

8. เย็บกล้ามเนื้อ fibularis longus และกล้ามเนื้อ medial head ของ gastrocnemius แบบ simple continuous pattern ด้วย polydioxanone ขนาด 3-0 USP (รูปที่ 8)

9. เย็บปิดชั้นผิวหนังแบบ simple continuous suture โดยใช้ polyamide ขนาด 3-0 USP

10. คามขาช่วยพยุงภายนอกโดยใช้ ลำกล้องเฟือกและกระบอกฉีดยาพลาสติก (รูปที่ 9)

ไถ่กลุ่มที่ 2 รักษากระดูก tibiotarsus หักโดยการใส่ แท่งเหล็กตามภายในโพรงกระดูก


ขั้นตอนการวางยาสลบถึงขั้นตอนการผ่าตัด เพื่อตัดกระดูกเหมือนในไถ่กลุ่มที่ 1 ใช้แท่งโลหะ ขนาด 2.5 และ pin chuck แท่ง pin แบบ normograde โดยเริ่มแทงจาก ด้าน medial ที่ตำแหน่งเหนือ tibial tuberosity ค่อยๆแทงให้ pin เข้าไปในโพรงกระดูกจนถึงรอยหักของกระดูก จากนั้น ดึงกระดูกที่หักกลับเข้าที่ และแทง pin ค่อยๆจนปลาย pin ฝังใน metaphysis ด้านล่างของกระดูก tibiotarsus จากนั้นเย็บปิด กล้ามเนื้อผิวหนัง และพันคามขา เช่นเดียวกับกับ กลุ่มที่ 1 (รูปที่ 10)



รูปที่ 1 บริเวณทำศัลยกรรมที่ได้รับการเตรียมและคลุมผ้าโดยเทคนิคปลอดเชื้อ



รูปที่ 2 กรีดเปิดผิวหนังทางด้านใน (medial approach) ของกระดูก tibiotarsus เริ่มจากบริเวณ 1/3 ของขาด้านล่าง ไปจนถึงเหนือข้อต่าต่ม




รูปที่ 3 ก ลักษณะทางกายวิภาคบริเวณกระดูก tibiotarsus (n= fibularis longus muscle, g= medial head ของ gastrocnemius) (http://people.eku.edu/ritchisong/BirdBone_drawing.jpg)



รูปที่ 3 ข แยกกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านหน้าและด้านหลังกระดูก tibiotarsus เพื่อให้เห็นกระดูกได้อย่างชัดเจน



รูปที่ 4 การใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดกระดูก tibiotarsus เพื่อเหลี่ยมนำให้กระดูกหักที่ บริเวณ 1/3 ทางด้านล่างของกระดูก tibiotarsus



รูปที่ 5 แกนกระดูกชนิดที่ใช้ในการค้ำภายในโพรงกระดูกที่เหลี่ยมนำให้หัก



รูปที่ 6 ก วิธีการสอดแกนกระบอกนิตยาเข้าไปในโพรงกระดูกของ proximal fragment



รูปที่ 6 ข การจัดกระดูกกลับเข้าที่ให้อยู่ในแนวแกนปกติตามเดิม



รูปที่ 6 ค การดึงวัสดุผูกเย็บที่ติดกับแกนกระบอกนิตยาเพื่อให้แกนกระบอกนิตยาเลื่อนลงมาอยู่ในโพรงกระดูก distal fragment



รูปที่ 7 การใช้ kirschner wire ทำ transfixation pin ที่ 1 เซนติเมตรเหนือและใต้รอยหักของกระดูก



รูปที่ 8 การเย็บปิดชั้นกล้ามเนื้อ



รูปที่ 9 การพันตามขาช่วยพยุงภายนอก



รูปที่ 10 การใส่ แท่งเหล็กตามภายในโพรงกระดูก แบบ normograde

การดูแลภายหลังศัลยกรรม (Postoperative care)

ไก่ทุกตัวได้รับ Gentamicin 1.25 มก./ตัว และ morphine 0.5 มก./กก. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ภายหลังการทำศัลยกรรมทันที และได้รับ Gentamicin 1.25 มก./ตัว วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกันทุกวัน เป็นเวลา 10 วัน ภายหลังการทำศัลยกรรม และตัดไหมในวันที่ 14 ภายหลังทำศัลยกรรม

ตรวจการหายของกระดูกทางคลินิก โดยการคลำและการตรวจทางรังสีวิทยา และนำเอา อุปกรณ์ตามภายนอกออก เมื่อพบการติดของกระดูกทางคลินิก

การตรวจทางคลินิกและทางรังสีวิทยา

ถ่ายภาพรังสีวิทยาไก่ทุกตัวรวมทั้งหมด 6 ครั้ง คือ ก่อนทำศัลยกรรม ภายหลังจากการ ทำศัลยกรรมทันที และ ที่ 4, 8, 10, 12 และ 48 สัปดาห์ ภายหลังจากการทำศัลยกรรม

การตรวจทางจุลพยาธิวิทยา

เก็บตัวอย่าง จากกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 กลุ่มละ 1 ตัวอย่าง โดยเก็บ กระดูกบริเวณที่หัก เนื้อเยื่อบริเวณรอบๆ กระดูกที่หัก ที่สัปดาห์ที่ 4, 8, 10, 12 และ 48 ภายหลังการทำศัลยกรรม

การเก็บตัวอย่าง

ขั้นตอนการวางยาสลบสัตว์ และการผ่าตัด เข้าหากระดูก ทำเหมือนกับขั้นตอนการผ่าตัด เพื่อดูกระดูก

ไก่กลุ่มที่ 1: นำ transfexion pin และ orthopedics wire ออก ใช้เลื่อยไฟฟ้าตัด บริเวณที่ทำการรักษากระดูก โดยตัดเหนือ hock 3 เซนติเมตร ให้ส่วนที่ต้องการเก็บตัวอย่างมีความหนา 0.5 เซนติเมตร จากนั้น Euthanasia สัตว์ โดยการดมสลบ

ไก่อกลุ่มที่ 2: นำแท่งเหล็กออก แล้วใช้เลื่อยไฟฟ้าตัด บริเวณที่ทำการรักษากระดูก โดยตัดเหนือ hock 3 เซนติเมตรให้ส่วนที่ต้องการเก็บตัวอย่างมีความหนา 0.5 เซนติเมตร จากนั้น Euthanasia สัตว์ เช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1

การเตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจทางจุลพยาธิวิทยา

นำตัวอย่างที่เก็บได้ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา โดยใช้ 10% neutral-buffered formalin ในการถนอมสภาพตัวอย่าง จากนั้นนำส่วนที่เป็นกระดูกผ่านขั้นตอน decalcification ด้วยน้ำยา formic acid-sodium citrate solution นำตัวอย่างที่ผ่าน decalcification อย่างสมบูรณ์ (ประมาณ 2 สัปดาห์) แล้วผ่านขั้นตอนการเตรียมชิ้นเนื้อทางจุลพยาธิวิทยา โดยฝังลงใน paraffin เพื่อทำ section ขนาด 6-8 μ m และย้อมสี hematoxylin and eosin (H&E) เพื่อตรวจเนื้อเยื่อ

การประเมินผล

1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ขาของไก่ภายหลังทำศัลยกรรมที่ 4, 8, 10, 12 และ 48 สัปดาห์ภายหลังการประเมินผลการทำศัลยกรรม โดยให้คะแนนระดับความเจ็บปวดและความสามารถในการใช้ขาดังนี้

ระดับ 0 ไก่อไม่แสดงอาการเจ็บเดินและวิ่งได้อย่างปกติ

ระดับ 1 ไก่อเดินได้โดยไม่แสดงอาการเจ็บ แต่จะแสดงอาการเจ็บขณะวิ่ง

ระดับ 2 ไก่อแสดงอาการเจ็บขณะเดิน และวิ่ง

ระดับ 3 ไก่อแสดงอาการเจ็บขณะเดินหรือ ไม่สามารถใช้ขาข้างที่เจ็บแตะพื้นได้ หรือวิ่งได้

การประเมินผลจากประสิทธิภาพในการใช้ขาของไก่ภายหลังจากการทำศัลยกรรมโดยเปรียบเทียบระหว่างการรักษาโดยใช้แกนกระดูกชนิดตามภายในโพรงกระดูกและการรักษาโดยใช้แท่งเหล็กยึดตามจากภายในกระดูก ทำการวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยวิธี Mann-Whitney U test ที่ระดับความเชื่อมั่น $P < 0.05$

2. การประเมินผลจากภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 4, 8, 10, 12 และ 48 สัปดาห์ภายหลังจากการทำศัลยกรรม โดยดู การซ่อมแซม การเกิดการพอกของกระดูกภายในโพรงกระดูกและระหว่างปลายกระดูก แบ่งระดับคะแนนการหายของกระดูก ดังนี้

ระดับ 0 ไม่มีพบการพอกของกระดูกทั้งภายในและภายนอกโพรงกระดูก เห็นรอยหักของกระดูกชัดเจน ระยะห่างระหว่างปลายกระดูกหักเท่าเดิม (รูปที่ 11)

ระดับ 1 มีการพอกของ callus ภายในโพรงกระดูก เห็นรอยหักของกระดูกชัดเจน ระยะห่างระหว่างปลายกระดูกหักเท่าเดิม (รูปที่ 12)

ระดับ 2 มีการพอกของ callus ภายในโพรงกระดูกมากขึ้น เห็นรอยหักของกระดูกไม่ชัดเจน ระยะห่างระหว่างปลายกระดูกหักแคบลง (รูปที่ 13)

ระดับ 3 มีการพอกของ callus ภายในโพรงกระดูกและระหว่างปลายกระดูกอย่างสมบูรณ์ ไม่เห็นรอยหักของกระดูก มีการต่อติคของกระดูกที่หักอย่างสมบูรณ์ (รูปที่ 14)

การประเมินผลจากภาพถ่ายทางรังสีวิทยา เพื่อการประเมินการต่อติคของกระดูก โดยการให้คะแนนการต่อติคของกระดูกขาของไก่ ภายหลังจากการทำศัลยกรรมโดยเปรียบเทียบระหว่างการรักษาโดยใช้แกนกระดูกกึ่งคดภายในโพรงกระดูก และการรักษาโดยใช้แท่งเหล็กคดภายในโพรงกระดูก ทำการวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยวิธี Mann-Whitney U test ที่ระดับความเชื่อมั่น $P < 0.05$

3. ผลการวิเคราะห์ ปฏิกริยาการตอบสนองของร่างกายต่อแกนกระดูกกึ่งคด และ แท่งเหล็กคดภายในโพรงกระดูก ภาวะ bone lysis, sequestrum และ callus จากภาพทางรังสีวิทยาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

4. วิเคราะห์ปฏิกริยาการตอบสนองของร่างกายต่อ แกนกระดูกกึ่งคดและการตอบสนองของร่างกายต่อ แท่งเหล็กคดภายในโพรงกระดูก ภาวะการติดเชื้อ และ sequestrum ทางจุลพยาธิวิทยา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการศึกษา

การประเมินผลจากการใช้ขาของไก่ภายหลังการทำศัลยกรรม (ตารางที่ 1)

ภายหลังการทำศัลยกรรมกระดูกหัก ไก่กลุ่มที่ 1 ทุกตัวสามารถใช้ขาทั้งสองข้างในการรับน้ำหนักได้ภายใน 4 สัปดาห์ (100%) โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความเจ็บปวดที่ 4, 8, 10 และ 12 สัปดาห์ เท่ากับ 2, 1.67 ± 0.47 , 0.33 ± 0.47 และ 0 ตามลำดับ ไก่ทุกตัวสามารถใช้ขารับน้ำหนักได้อย่างปกติในสัปดาห์ที่ 12 (ค่าเฉลี่ยของคะแนนความเจ็บปวดเท่ากับ 0)

ไก่อีกกลุ่มที่ 2 ซึ่งรักษากระดูก tibiotarsus หักโดยการใส่แท่งเหล็กยึดตามภายในกระดูก พบว่าภายหลังการศัลยกรรม ไก่ทุกตัวสามารถใช้ขาทั้งสองข้างในการรับน้ำหนักได้ภายใน 8 สัปดาห์ (100%) โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความเจ็บปวดใน 4, 8, 10 และ 12 สัปดาห์เท่ากับ 2.4 ± 1.22 , 1.2 ± 0.71 , 0.8 ± 0.67 และ 0.2 ± 0.8 ตามลำดับ ไก่ทุกตัวสามารถใช้ขารับน้ำหนักได้อย่างปกติในสัปดาห์ที่ 48 (ค่าเฉลี่ยของคะแนนความเจ็บปวดเท่ากับ 0)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความเจ็บปวดในไก่ กลุ่มที่ 1 และ ไก่กลุ่มที่ 2


เวลาภายหลังการทำศัลยกรรม (สัปดาห์)	ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความเจ็บปวด(คะแนนเต็ม 3 คะแนน)	
	ไก่อีกกลุ่มที่ 1 (n=6)	ไก่อีกกลุ่มที่ 2 (n=5)
4	2 ^{a,a}	2.4 ± 1.22 ^{a,a}
8	1.67 ± 0.47 ^{a,b}	1.2 ± 0.71 ^{b,b}
10	0.33 ± 0.47 ^{a,a}	0.8 ± 0.67 ^{a,a}
12	0 ^{a,b}	0.2 ± 0.8 ^{a,b}
48	0 ^{a,b}	0 ^{a,b}

a,a ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

b,b ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

a,b มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

b,a มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)



รูปที่ 11 ค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดในไก่อกลุ่มที่ 1 และไก่อกลุ่มที่ 2

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความเจ็บปวดพบว่า ในสัปดาห์ที่ 8 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความเจ็บปวดในไก่อกลุ่มที่ 1 และไก่อกลุ่มที่ 2 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) โดยไก่อกลุ่มที่ 1 มีการใช้ยารับน้ำหนักไม่แตกต่างกับไก่อกลุ่มที่ 2 ส่วนในสัปดาห์ที่ 4, 10, 12 และ 48 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความเจ็บปวดไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

การประเมินการต่อต้านของกระดูกจากภาพถ่ายทางรังสีวิทยาโดยการแบ่งระดับการต่อต้านของกระดูกออกเป็น 4 ระดับ (ตารางที่ 2)

ไก่อกลุ่มที่ 1 มีการจัดเรียงแนวของกระดูกใกล้เคียงกับกระดูกปกติ (รูปที่ 12) ที่สัปดาห์ที่ 4 ภายหลังการทำศัลยกรรม คะแนนระดับการต่อต้านของกระดูกเฉลี่ยเท่ากับ 1.5 ± 0.5 พบว่าไก่ 3 ตัว มีการพอกของกระดูกเพียงเล็กน้อย และพบแนวของกระดูกผิดรูปไปจากเดิมเล็กน้อย (รูปที่ 13) สำหรับคะแนนเฉลี่ยระดับการต่อต้านของกระดูกในสัปดาห์ที่ 8 (รูปที่ 14) มีค่าเท่ากับ 2.83 ± 0.37 ไก่อทุกตัวพบการต่อต้านของกระดูกโดยสมบูรณ์ใน ระดับการต่อต้านของกระดูก เท่ากับ 3 ที่ 10 (รูปที่ 15), 12 (รูปที่ 16) และ 48 (รูปที่ 17)

ไก่อกลุ่มที่ 2 พบว่าภายหลังการทำศัลยกรรมทันทีปลายกระดูกมีการเคลื่อนเล็กน้อยเช่นเดียวกับไก่อกลุ่มที่ 1 (รูปที่ 18) ที่ 4 สัปดาห์ภายหลังการทำศัลยกรรมคะแนนเฉลี่ยระดับการต่อต้านของกระดูกเฉลี่ยเท่ากับ 1 ไก่อมีการพอกของกระดูกเพียงเล็กน้อย (รูปที่ 19) คะแนนระดับการต่อต้านของกระดูกในสัปดาห์ที่ 8 (รูปที่ 20) เฉลี่ยเท่ากับ 2.6 ± 0.49 ส่วนไก่อทุกตัวพบการต่อต้านของกระดูกโดยสมบูรณ์ในสัปดาห์ที่ 10 (รูปที่ 21), 12 (รูปที่ 22) และ 48 (รูปที่ 23) (ระดับการต่อต้านของกระดูก เท่ากับ 3, 100%)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนการต่อติคของกระดูกในไก่ กลุ่มที่ 1 และ ไก่กลุ่มที่ 2


เวลาภายหลังการทำศัลยกรรม (สัปดาห์)	ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนการหายของกระดูก	
	ไก่กลุ่มที่ 1 (n=6)	ไก่กลุ่มที่ 2 (n=5)
4	1.5 ± 0.5 ^{a,a}	1b ^{a,a}
8	2.83 ± 0.37 ^{a,b}	2.6 ± 0.49 ^{a,b}
10	3 ^{a,a}	3 ^{a,a}
12	3 ^{a,a}	3 ^{a,a}
48	3 ^{a,a}	3 ^{a,a}

a,a ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

b,b ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

a,b มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

b,a มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)



รูปที่ 24 ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับการต่อติคของกระดูก ในไก่ กลุ่มที่ 1 และไก่กลุ่มที่ 2

จากการเปรียบเทียบคะแนนระดับการต่อติคของกระดูกที่สัปดาห์ที่ 4, 8, 10, 12 และ 48 พบว่าการต่อติคของกระดูกในไก่ทั้งสองกลุ่ม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ระดับความเชื่อมั่น ($P < 0.05$))

การตอบสนองของร่างกายต่อแกนกระดูกติดเชื้อตามภายในโพรงกระดูก และการตอบสนองของร่างกายต่อ แท่งเหล็กยึดตามภายในกระดูก โดยการประเมินภาพถ่ายทางรังสีวิทยา ไม่พบการตอบสนองในลักษณะที่ผิดปกติของร่างกาย หรือ ปฏิกริยาต่อต้านของร่างกายต่อแกนกระดูกติดเชื้อ สำหรับไก่อกลุ่มที่ 2 พบการต่อต้านของกระดูกในไก่ 1 ตัวมีการอักเสบติดเชื้อในกระดูกเกิดขึ้นซึ่งไก่นั้นได้ส่งตรวจตัวอย่างทางจุลพยาธิวิทยาต่อไป สำหรับที่ 8, 10, 12 และ 48 สัปดาห์ ภายหลังจากการทำการศัลยกรรม ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาไม่พบภาวะ bone lysis หรือ sequestrum

การประเมินผลทางจุลพยาธิวิทยา

ไก่อกลุ่มที่ 1 พบว่าภาพถ่ายทางรังสีวิทยาทันทีภายหลังจากการทำการศัลยกรรม และที่ 4, 8, 10, 12 และ 48 สัปดาห์ภายหลังจากการทำการศัลยกรรมไม่พบภาวะ bone lysis หรือ sequestrum (100%) และพบว่าตัวอย่างทางจุลพยาธิวิทยาในสัปดาห์ที่ 4, 8, 10, 12 และ 48 มีกระบวนการสร้างและการพอกของกระดูกปกติ โดยที่ 4 สัปดาห์ (รูปที่ 25 ก-ข) ตัวอย่างที่ส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยายังไม่พบการเปลี่ยนแปลงและการสร้างกระดูกใหม่ ส่วนที่ 8 (รูปที่ 26 ก-ง), 10 (รูปที่ 27 ก-ง) และ 12 สัปดาห์ (รูปที่ 28 ก-ง) พบการสร้างและการพอกของกระดูกเกิดขึ้นอย่างปกติ มีการสร้างของเนื้อเยื่อพังผืดบริเวณเยื่อหุ้มกระดูกปริมาณมาก พบกระบวนการอักเสบ เซลล์อักเสบ เซลล์ osteoclast osteocyte และ หลอดเลือดใหม่ เข้ามาบริเวณที่มีการสร้างกระดูก ซึ่งเป็นลักษณะปกติเมื่อมีกระบวนการต่อต้านของกระดูกเกิดขึ้น และพบการพอกของกระดูกใหม่เกิดขึ้นปริมาณมาก ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงของแกนกระดูกติดเชื้อ ส่วนที่ 48 สัปดาห์ (รูปที่ 29 ก-ง) พบกระดูกสมบูรณ์จากตัวอย่างที่เก็บส่งตรวจ ซึ่งบ่งบอกถึงกระบวนการสร้างของกระดูกที่สมบูรณ์และไม่มีการต่อต้านของร่างกายต่อแกนกระดูกติดเชื้อ หรือพบการติดเชื้อเกิดขึ้น

ไก่อกลุ่มที่ 2 พบภาวะ osteomyelitis ในไก่ 1 ตัว (20%) จากภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 4 สัปดาห์ภายหลังจากการศัลยกรรม ซึ่งแยกออกมาและทำการส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยา พบภาวะ osteomyelitis โดยพบการติดเชื้อของโพรงกระดูกและเยื่อหุ้มกระดูก (รูปที่ 30 ก-ง) ซึ่งนอกจากไก่ตัวที่มีการติดเชื้อแล้ว ไก่อื่นๆในกลุ่มนี้ที่ส่งตัวอย่างตรวจที่ 8 (รูปที่ 31 ก-ง), 10 (รูปที่ 32 ก-ง), 12 (รูปที่ 33 ก-ง) และ 48 (รูปที่ 34 ก-ง) สัปดาห์ พบการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาในแต่ละสัปดาห์ใกล้เคียงกับการต่อต้านของกระดูกในไก่อกลุ่มที่ 1 โดยพบกระบวนการต่อต้านของกระดูกที่ปกติ สำหรับการพอกของเนื้อเยื่อพังผืดที่กระดูกพบว่ามีปริมาณมากเช่นเดียวกันกับกลุ่มที่ 1

บทที่ 5

การอภิปรายผล

การวิจัยนี้ศึกษาการรักษากระดูกหักแบบปิดโดยใช้วัสดุที่สามารถยึดตามภายในโพรงกระดูกได้ดี มีความแข็งแรงพอเพียงและสามารถยึดปลายกระดูกให้อยู่ใกล้กันจนกระดูกต่อติดได้อย่างสมบูรณ์ ไม่รบกวนการผ่าตัดของข้อต่อ ไม่จำเป็นต้องวางยาสลบสัตว์ซ้ำเพื่อผ่าตัดนำอุปกรณ์ออกภายหลังมีการต่อติดของกระดูกแล้ว โดยศึกษาในไก่ไข่เพศผู้จำนวน 19 ตัว ซึ่งเป็นตัวแทนของสัตว์ปีก ไก่ทุกตัวได้รับการวางยาสลบและเปิดผ่าบริเวณส่วนของหน้าแข้งด้วยเทคนิคการปลอดเชื้อ เพื่อทำให้เกิดการหักของกระดูกทibia ออาร์ทัสด้านขวาบริเวณ 1/3 จากปลายล่างซึ่งเป็นบริเวณที่พบการหักของกระดูกได้บ่อยในทางคลินิก ไก่ทั้งหมด 19 ตัวถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อรักษากระดูกหักโดยใช้วัสดุยึดตรึงในโพรงกระดูก โดยกลุ่มที่ 1 (10 ตัว) รักษากระดูก tibiotarsus โดยใช้แกนกระดูกนิตยาคยึดตามภายในโพรงกระดูก ใส่แท่งเหล็กเล็ก ๆ ตรึงขวางกระดูก และแกนกระดูกนิตยาคหรือมัดลวดผ่านรูที่เจาะผ่านแท่งเหล็กและแกนกระดูกนิตยาคเพื่อต้านแรงหมุน ส่วนกลุ่มที่ 2 (9 ตัว) ยึดตรึงกระดูกโดยใช้แท่งเหล็กไม่เป็นสนิมยึดตามภายในโพรงกระดูก จากนั้นประเมินผลการวิจัยจากการใช้ขาของไก่ การตรวจทางรังสีวิทยา และการตรวจตัวอย่างทางจุลพยาธิวิทยา จากการประเมินผลดังกล่าว พบว่าไก่กลุ่มที่ 1 ทุกตัวสามารถใช้ขาลงน้ำหนักได้อย่างปกติที่ 12 สัปดาห์ ส่วนการประเมินผลจากภาพถ่ายทางรังสีวิทยาในแต่ละสัปดาห์พบการต่อติดของกระดูกที่หักอย่างสมบูรณ์ในไก่ทุกตัวที่ 10 สัปดาห์และมีการต่อติดของกระดูกอย่างปกติในไก่กลุ่มที่ 1 สำหรับไก่กลุ่มที่ 2 มีการต่อติดของกระดูกอย่างปกติ ยกเว้นไก่ 1 ตัวที่พบการติดเชื้ที่โพรงกระดูกในสัปดาห์ที่ 4 ภายหลังการทำศัลยกรรม การวิเคราะห์ผลทางสถิติพบการใช้ขาของไก่ทั้งสองกลุ่มที่ 8 สัปดาห์แตกต่างกันมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) สำหรับที่ 4, 10, 12 และ 48 สัปดาห์พบการใช้ขาของไก่ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) การวิเคราะห์ผลทางสถิติเปรียบเทียบการต่อติดของกระดูกในไก่ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นกัน ($p < 0.05$) จากการศึกษาดังกล่าว ไก่ทั้งสองกลุ่มพบการต่อติดของกระดูก และการใช้ขาของสัตว์ที่ใกล้เคียงกันโดยไก่กลุ่มที่ 1 ไม่พบปฏิกิริยาต่อต้านใดๆของร่างกายต่อแกนกระดูกนิตยาค รวมทั้งไม่พบการติดเชื้อในโพรงกระดูก ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการใช้แกนกระดูกนิตยาคตามภายในโพรงกระดูก สามารถใช้เป็นทางเลือกในการรักษากระดูกทibia ออาร์ทัสหักได้อีกทั้งวิธีการที่ใช้ในการรักษาก็ไม่ยุ่งยาก วัสดุหาง่าย ราคาถูก และไม่ปรากฏผลข้างเคียงใดๆ ต่อสัตว์ในระยะยาว

ในการวิจัยเริ่มแรกผู้วิจัยได้ศึกษาในไก่ไข่ ซึ่งใช้เป็นตัวแทนของสัตว์ปีก 1 ตัว เพื่อดูความเป็นไปได้ในการยึดคานภายในโพรงกระดูก และศึกษาเทคนิคการทำสัลยกรรม โดยใช้ไก่ไข่เพศผู้ อายุ 3 เดือน เหนียวน่าให้เกิดกระดูก tibiotarsus บริเวณ 1/3 ทางด้านล่างหัก และใส่แกนกระดูกนิตยาคานภายในโพรงกระดูกเพื่อรักษากระดูกหักโดยใช้ shuttle technique ในขั้นตอนการทำสัลยกรรม พบว่าแกนกระดูกนิตยาคานนั้นสามารถใส่เข้าไปในโพรงกระดูกได้ค่อนข้างพอดี แต่ไม่สามารถต้านแรงหมุนได้ จึงจำเป็นต้องใช้แท่งเหล็กเล็กๆ แท่งขวางผิวกระดูกและแกนกระดูกนิตยาคานทั้งด้านบน และด้านล่าง เพื่อช่วยในการต้านแรงหมุน ภายหลังการทำสัลยกรรมได้ฟื้นคานขาด้วยพันคานภายนอก จากการศึกษพบว่าไก่สามารถใช้ขาในการรับน้ำหนักได้ภายใน 24 ชั่วโมงเนื่องจากตัวแกนกระดูกนิตยาคานและการพันคานภายนอกมีความมั่นคงพอเพียงและทำให้กระดูกจัดตัวเพื่อรับน้ำหนักได้ดี ไม่รบกวนการทำงานของข้อต่อ และการประเมินจากภาพถ่ายทางรังสีวิทยา พบว่ามีการต่อติของกระดูกเกิดขึ้นได้ดี และเร็ว โดยการประเมินจากการให้คะแนนความเจ็บปวด และการประเมินโดยการให้คะแนนการหายของกระดูก จากภาพถ่ายทางรังสีวิทยา เป็นการประเมินผลแบบนามธรรม (subjective evaluation) และใช้ผู้ประเมินเพียงคนเดียวเพื่อลดความแปรปรวนในการประเมินผล อย่างไรก็ตามในการประเมินผลการใช้ขาและการลงน้ำหนักของขา นั้น มีวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงได้แก่ gate analysis, ground force analysis และ peak vertical force (Harcourt-Brown, 2005) ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถวัดผลได้เป็นตัวเลข ได้ผลที่ถูกต้อง และนำมาแปลผลทางสถิติที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่า อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาสูง และยังไม่มีการนำมาใช้ในประเทศไทย

สำหรับการเตรียมตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัดการตรวจร่างกายทั่วไปและการตรวจทางโลหิตวิทยาเป็นสิ่งที่จำเป็นในการรักษากระดูกหักในสัตว์ปีก การตรวจร่างกายทั่วไป มักทำเพื่อประเมินสภาวะของสัตว์ในการวางยาสลบ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตัวสัตว์ สัตว์ที่อยู่ในภาวะขาดน้ำหรือน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia) ส่งผลอย่างรุนแรงต่อการวางยาสลบ (Forbes, 1999) จึงควรรักษาภาวะดังกล่าวให้สัตว์กลับมาอยู่ในภาวะปกติหรือใกล้เคียงกับปกติก่อนวางยาสลบ ก่อนการผ่าตัดจำเป็นต้องงดน้ำและอาหาร โดยเฉพาะในสัตว์ปีกที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กรัม ควรงดอาหารก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ถ้างดอาหารนานเกินไปจะเหนียวทำให้สัตว์อยู่ในภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้ง่าย ส่วนน้ำให้ดื่มน้ำก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 1 ชั่วโมง สำหรับสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่านี้ อาจลดระยะเวลาการงดอาหารและน้ำก่อนการผ่าตัดให้สั้นลง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ให้สัตว์ ดื่มน้ำ และอาหารก่อนการผ่าตัดเป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง เนื่องจากสัตว์มีขนาดค่อนข้างใหญ่ (น้ำหนักประมาณ 1000 กรัม) ส่วนการตรวจร่างกายทั่วไป และการตรวจค่าทางโลหิตวิทยาในไก่ทุกตัว อยู่ในเกณฑ์ปกติ

การวางยาสลบยาที่ใช้สำหรับการวางยาสลบในสัตว์ปีกแบ่งได้หลายกลุ่ม สำหรับยาเตรียมสลบ (premedication) นั้นจะใช้ยาซึมหรือยาแก้ปวด หรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกัน ยาที่ใช้สำหรับการเหนี่ยวนำการสลบในสัตว์ปีก อาจใช้ยาสลบแบบฉีดหรือแบบสูดดมผ่านหน้ากากก็ได้ ยาสลบแบบฉีดที่ปลอดภัยได้แก่ propofol ซึ่งจำเป็นต้องฉีดเข้าหลอดเลือดดำ จึงมีความลำบากในสัตว์ปีกขนาดเล็ก ส่วนยาสลบชนิดสูดดมที่เหมาะสมกับสัตว์ปีกคือ isoflurane สามารถใช้ได้กับสัตว์ปีกที่มีขนาดเล็ก และมักใช้เป็นยาคุมสลบเพื่อควบคุมระดับความลึกของการสลบด้วย ในสัตว์ปีกที่น้ำหนักมากกว่า 100 กรัม จำเป็นต้องสอดท่อเพื่อช่วยหายใจทุกครั้ง (Forbes, 1999) ในการทดลองนี้ ได้เห็นว่าการสลบโดยใช้ หน้ากากดมสลบสำหรับสัตว์ และใช้ isoflurane ในการเหนี่ยวนำการสลบ และ รักษาระดับการสลบตลอดการทดลอง โดยพบว่าในส่วนของการวางยาสลบนั้น ไม่พบปัญหาแทรกซ้อนใดๆ

ในขั้นตอนการทำศัลยกรรมพบว่า การนำแกนกระบอกฉีดยาใช้ตามภายในโพรงกระดูก แม้จะมีขนาดแกนกระบอกฉีดยาที่ค่อนข้างพอดีกับโพรงกระดูก แต่ผู้วิจัยก็พบว่าปลายกระดูกยังมีการหมุนเกิดขึ้นได้เล็กน้อย จึงจำเป็นต้องใช้แท่งเหล็กเล็กๆ แท่งขวางแบบ transfixation pin ทางด้านบนและด้านล่างของรอยหักโดยใช้หลักการเช่นเดียวกับ interlocking nail อย่างไรก็ตามไก่ที่ใช้แท่งเหล็กเล็กๆ แท่งขวางตรึงตัวกระดูกทั้งสองด้านและแกนกระบอกฉีดยาพบว่า มี 1 ตัวที่มีผิวของกระดูกที่ค่อนข้างบางกว่าตัวอื่น ตัวแท่งเหล็กที่แท่งขวางไว้เพื่อตรึงกับผิวกระดูกยึดกับผิวกระดูกไม่ได้และหลุดออกในขณะที่ทำการศัลยกรรมผู้วิจัยจึงแก้ไขปัญหาโดยการมัดลวดแทน (รูปที่ 12) สำหรับไก่ตัวอื่นๆ แท่งเหล็กเล็กๆ นั้นมีการตรึงที่ผิวกระดูกค่อนข้างดี แต่ภายหลังจากการศัลยกรรมก็สามารถพบการหลุดของแท่งเหล็กที่ตรึงขวางกระดูกได้ในไก่ 3 ตัวที่ 4 สัปดาห์ ภายหลังจากการศัลยกรรม โดยมีการหลุดของแท่งเหล็กตัวละ 1 อัน (ด้านบนของรอยหัก 1 ตัว และด้านล่างของรอยหัก 2 ตัว) แม้มีการหลุดของแท่งเหล็กเล็กๆ ที่ใช้ตรึงกระดูกก็ตามแต่ที่ 4 สัปดาห์พบการพอกของกระดูกในปริมาณมากและมีความมั่นคงที่ปลายของกระดูกจากการคลำตรวจพอสมควรและสามารถต้านแรงหมุนได้ จึงคิดว่าการหลุดออกของแท่งเหล็กไม่น่าจะมีผลรบกวนการต่อติของกระดูก ซึ่งก็พบว่าการต่อติของกระดูกในไก่ที่มีการหลุดของแท่งเหล็กเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับไก่ที่มีแท่งเหล็กแท่งขวางกระดูกครบทั้งสองอัน สำหรับไก่กลุ่มที่ 2 ในขณะที่ทำการตรึงกระดูกโดยการใส่แท่งเหล็กตามภายในโพรงกระดูกพบว่าการต้านแรงหมุนก็เกิดขึ้นได้ดี เนื่องจากการสัมผัสของแท่งเหล็กกับกระดูก 3 จุดนั้นเกิดขึ้นได้ดี แต่พบการหมุนของกระดูก ภายหลังจากการศัลยกรรมที่ 4 สัปดาห์ในไก่ 2 ตัวซึ่งเป็นสาเหตุให้สัตว์รับน้ำหนักได้ช้ากว่าไก่ตัวอื่นๆ

ผลของการศึกษาพบว่า ไก่กลุ่มที่ 1 ทั้งหมดสามารถใช้รับน้ำหนักทั้งสองข้างได้ภายใน 72 ชั่วโมง (6/6) เนื่องจากการผ่าตัดที่ไม่รบกวนการทำงานของข้อต่อ การบาดเจ็บที่เล็กน้อยกว่า

และการฟื้นคามาภายนอกร่วมกัน เป็นส่วนสำคัญให้สัตว์สามารถกลับมาใช้ขาได้เร็ว สำหรับในไก่กลุ่มที่ 2 มีไก่ 4 ตัว (4/6) สามารถใช้ขาทั้งสองข้างรับน้ำหนักได้ภายใน 1 สัปดาห์ แต่พบว่าไก่อีก 2 ตัว มีการบิดหมุนของขามากกว่าปกติ เป็นสาเหตุให้ใช้ขารับน้ำหนักได้ไม่ดี การปรับตัวในการใช้ขา รับน้ำหนักจึงช้ากว่าไก่ตัวอื่นๆ เมื่อสัตว์สามารถปรับตัวและใช้ขารับน้ำหนักได้ การเพิ่มแรงกดที่ บริเวณรอยหักของกระดูกจากการลงน้ำหนัก จะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการต่อติดของกระดูก และการพอกกระดูกระหว่างผิวกระดูกและภายในกระดูก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงบริเวณรอยหัก โดยพบว่าการใช้ ขารับน้ำหนักของไก่ทั้งสองกลุ่มภายหลังจาก 8 สัปดาห์ไปแล้วไม่พบความแตกต่าง และเมื่อคลำ บริเวณรอยหักพบว่ามีความแข็งแรงพอเพียงที่จะนำอุปกรณ์ฟื้นคามาภายนอกออกได้ (clinical union) โดยภายหลังการนำอุปกรณ์ฟื้นคามาภายนอก พบว่าสัตว์สามารถเดินได้เกือบเป็นปกติ โดยพบ การเดินกะเผลกบ้างเล็กน้อย สำหรับการใช้ขารับน้ำหนักของไก่ที่ 8 สัปดาห์ กลุ่มที่ใส่แกนกระบอก ฉีดตามภายในโพรงกระดูกพบว่าการใช้ขาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ใส่แท่งเหล็กยึดตามภายในโพรงกระดูก ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะเกิดจากการที่แกนกระบอก ฉีดมีความมั่นคงน้อยกว่าทำให้การรับน้ำหนักของขาเกิดได้ไม่สมบูรณ์ จึงพบอาการเจ็บได้ แต่เมื่อมีการจัดเรียงตัวของกระดูกจนแนวใกล้เคียงกับปกติและสัตว์มีปรับตัวใช้ขารับน้ำหนักโดย ไม่ต้องใส่อุปกรณ์ฟื้นคามาภายนอกได้แล้ว พบว่าการใช้ขารับน้ำหนักไม่แตกต่างกัน ไก่ที่ใช้ขา รับน้ำหนักได้ช้ากว่าตัวอื่นๆ บางตัวจะพบลักษณะเริ่มต้นของ ulcerative pododermatitis (bumble foot) โดยพบการหนาตัวของเท้าด้านที่ไม่ได้รับน้ำหนัก และมีการลอกออกของผิวหนังเล็กน้อย ซึ่งเมื่อไก่ ใช้ขารับน้ำหนักได้ อาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆ หายไปจนหายเป็นปกติ ซึ่งมีได้เป็นผลเสียหรือรบกวนการ แต่สำหรับสัตว์ปีกที่ไวกับการเกิดโรค ulcerative pododermatitis ถ้ามีการเจ็บขา หรือเป็นแผลร่วม ด้วย การใช้ขาลงน้ำหนักไม่ได้ หรือการเดินกะเผลกเป็นเวลานานๆ จะทำให้ความรุนแรงของโรค เพิ่มขึ้น (Hacourt-Brown, 2005)

การประเมินผลจากภาพถ่ายทางรังสีวิทยา พบว่าระยะเวลาของการต่อติดของกระดูกที่พบ จากภาพถ่ายทางรังสีวิทยาของกระดูก tibiotarsus ใกล้เคียงกับระยะเวลาการต่อติดของกระดูกที่พบ ทางคลินิก (ประมาณ 8-10 สัปดาห์) และพบว่าไก่ทั้งสองกลุ่มนั้น มีการต่อติดของกระดูกจาก ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาในแต่ละสัปดาห์ที่ใกล้เคียงกัน โดย 8 สัปดาห์ภายหลังการทำศัลยกรรม พบว่า มีการต่อติดของกระดูกเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ในไก่เกือบทุกตัว ไก่กลุ่มที่ 1 พบว่ากระดูกเริ่มมีการ ต่อติดที่ 4 สัปดาห์ภายหลังการทำศัลยกรรม โดยพบการพอกของแคลลัสในปริมาณมากทั้งภายใน โพรงกระดูก ภายนอกโพรงกระดูก และระหว่างผิวของกระดูก อย่างไรก็ตามพบไก่ 1 ตัวที่มีแนว ของกระดูกเคลื่อนไปจากแนวเดิม เนื่องจากสัตว์ใช้ขารับน้ำหนักได้ค่อนข้างเร็ว การเดินถ่ายแรง ผ่านอุปกรณ์ที่มีความมั่นคงน้อยจึงมีทำให้ปลายของกระดูกเคลื่อนที่ได้ แม้จะมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้น

และ พบไก่อ่ 1 ตัวมีการผิครูปของกระดูกแต่ร่างกายของสัตว์ปีกมีการปรับตัวสูง การปรับแนวของกระดูกใหม่ที่ใกล้เคียงกับแนวของกระดูกเดิมเกิดขึ้นได้ดีและรวดเร็ว ดังนั้นที่ 8 สัปดาห์ ภายหลังจากการทำศัลยกรรม ไก่อ่ทุกตัวจึงพบการพอกของแคลลัสจำนวนลดลง พบแนวกระดูกใหม่ และพบการต่อติคของกระดูกเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในไก่อ่ 5 ตัวจากทั้งหมด 6 ตัว ไก่อ่ทุกตัวที่ 10 สัปดาห์มีการต่อติคของกระดูกอย่างสมบูรณ์ทั้งสองกลุ่ม สำหรับภาพถ่ายทางรังสีวิทยาในไก่อ่กลุ่มที่ 2 พบไก่อ่ 4 ตัว มีการต่อติคของกระดูกโดยไม่มีการบิดหมุนของกระดูกส่วนล่าง การพอกของแคลลัสที่เกิดขึ้นภายนอกกระดูกมีปริมาณน้อยกว่าไก่อ่กลุ่มที่ 1 เนื่องจากแท่งเหล็กมีความมั่นคงมากกว่า แต่เนื่องจากแท่งเหล็กยึดตามภายในกระดูก นั้นไม่สามารถต้านแรงหมุนได้ จึงพบการต่อติคของกระดูกโดยมีการบิดหมุนของขาเล็กน้อยในไก่อ่ 2 ตัว ซึ่งไก่อ่ทั้ง 2 ตัวนั้นจะค่อยๆมีการปรับตัวจนสัตว์สามารถใช้ขาลงน้ำหนักได้ และพบการใช้ขาในไก่อ่ทั้งสองกลุ่มเป็นปกติภายหลังจากการศัลยกรรม 12 สัปดาห์

การประเมินผลทางจุลพยาธิวิทยาไก่อ่กลุ่มที่ 1 และไก่อ่กลุ่มที่ 2 พบการต่อติคของกระดูกเกิดขึ้นอย่างปกติ โดยในกระบวนการหายของกระดูกที่พบในไก่อ่กลุ่มที่ 1 นั้น ตัวอย่างที่เก็บมาตรวจมีลักษณะของปลายกระดูกที่ค่อนข้างเรียบและกระดูกเป็นกระดูกที่สมบูรณ์ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างที่เป็นส่วนของกระดูกที่ยังไม่มีการพอกของกระดูกเกิดขึ้น การสร้างของเนื้อเยื่อพังผืดและกระดูกใหม่พบได้มากที่สุดที่ 8, 10 และ 12 สัปดาห์ ภายหลังจากการศัลยกรรม ซึ่งการสร้างเนื้อเยื่อพังผืดปริมาณมากนั้นบ่งบอกถึงตัวแกนกระดูกที่มีการยึดตรึงภายในโพรงกระดูกได้อย่างไม่มั่นคง จึงมีการเคลื่อนของปลายกระดูกที่หักได้เล็กน้อยร่างกายจึงพยายามสร้างเนื้อเยื่อพังผืดและ callus มาพอกเพื่อยึดให้ปลายของกระดูกทั้งสองด้านมีความมั่นคง (James, 1999; Wheeler, Burkitt and Daniels, 1993) ส่วนตัวอย่างที่ 48 สัปดาห์พบลักษณะของกระดูกที่สมบูรณ์ แต่เนื่องจากเทคนิคการเก็บตัวอย่างและการตัดชิ้นกระดูกนั้นเก็บตัวอย่างได้เพียงบางส่วนจึงมีตัวอย่างบางตัวอย่างที่การเก็บนั้นไม่ครอบคลุมรอยหักของกระดูก ดังนั้นจึงไม่สามารถเห็นการต่อระหว่างปลายกระดูกทั้งสองปลายได้ จึงไม่สามารถอภิปรายผลได้ว่าการต่อติคของกระดูกเกิดขึ้นจากการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาได้แต่ผลดังกล่าวสามารถประเมินได้จากภาพถ่ายทางรังสีวิทยาซึ่งผลที่พบผู้วิจัยได้อภิปรายไว้ข้างต้นแล้ว สำหรับกระบวนการหายของกระดูกตั้งแต่เริ่มระยะ การอักเสบ ระยะการสร้างและการพอกของกระดูก จนเข้าสู่ระยะ การจัดเรียงกระดูกเพื่อให้ขนาดของกระดูกใกล้เคียงกับปกติ (remodeling) นั้นเกิดขึ้นได้โดยไม่พบ ปฏิกริยาการต่อต้านของร่างกายต่อแกนกระดูกซึ่งอยู่ในโพรงกระดูก และไม่พบการเกิดกระดูกตายหรือภาวะติดเชื่อ ดังนั้นผู้วิจัยคาดว่าน่าจะสามารถใส่แกนกระดูกได้ตามภายในโพรงกระดูกในระยะยาวได้โดยไม่มีปัญหาแทรกซ้อนเกิดขึ้น ภายหลังจากการทำศัลยกรรม สำหรับไก่อ่กลุ่มที่ 2 ซึ่งเก็บตัวอย่างตรวจทางจุลพยาธิวิทยา

ไก่ตัวที่เก็บตัวอย่างที่ 4 สัปดาห์ (1/5) พบภาวะการติดเชื้อภายในโพรงกระดูกโดยมีการสะสมของแบคทีเรียจำพวก cocci ที่เชื้อหุ้มกระดูกและเนื้อผิวนอกของกระดูก สาเหตุของการติดเชื้อที่กระดูกน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของเทคนิคการใส่เชื้อทางสัลยกรรม สำหรับไก่ที่เก็บตัวอย่างทางจุลพยาธิวิทยาในสัปดาห์อื่นๆนั้นไม่พบปัญหาแทรกซ้อนดังกล่าวภายหลังการทำสัลยกรรม โดยมีการบวมการต่อต้านของกระดูกใกล้เคียงกับปกติ มีการพอกของกระดูกและเนื้อเยื่อพังผืดปริมาณมากเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าจะเกิดเนื่องจาก ตัวแท่งเหล็กยึดติดภายในโพรงกระดูกนั้นแม้จะมีความแข็งแรงมากกว่าแกนกระดูกนิตยา แต่ก็มีความหนาของแท่งเหล็กที่ใส่ในโพรงกระดูกขนาดเล็กกว่าแกนกระดูกนิตยา ทำให้ความสามารถในการต้านแรงหมุนและแรงเฉือนต่ำ จึงมีการเคลื่อนของปลายกระดูกที่หักได้ ทำให้มีการสร้างและการพอกของกระดูกและเนื้อเยื่อพังผืดที่มากกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม กระบวนการต่อต้านของกระดูกก็สามารถเกิดขึ้นได้อย่างปกติในกลุ่มที่ทำการศึกษาทั้งสองกลุ่ม

การใช้อุปกรณ์พันตามภายนอกพันตามเพื่อพยุง โดยเฉพาะในระยะแรกเริ่มซึ่งมีการต่อต้านของกระดูก ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้บริเวณที่ตามกระดูกนั้นมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น และทำให้การต้านแรงหมุนก่อนข้างสมบูรณ์ การพันตามกระดูก tibiotarsus จะต้องพันแบบ external rotation เนื่องจากลักษณะการยื่นของขาปกติหรือการ abduct ของกระดูก femur จะพบว่ามุมของกระดูก tibiotarsus ค่อนข้างเอียงเข้าสู่แกนกลางของลำตัว (Hutchinson & Gateson, 2000) การพันตามที่เพิ่มแรงบิดเข้าสู่ด้านในจึงไปเพิ่มการบิดหมุนของขาและปลายเท้ามากยิ่งขึ้น ทำให้ไม่สามารถลงน้ำหนักของขาได้ การพันตามที่เพิ่มแรงบิดออกด้านนอกจะส่งผลต่อลักษณะการยื่นของขาทำให้การยืนนั้นสมดุลและสามารถวางเท้ารับน้ำหนักได้ดีกว่า

การใส่แกนกระดูกนิตยาดามภายในโพรงกระดูกสามารถเลือกขนาดที่พอดีกับโพรงกระดูกได้ เนื่องจากแกนกระดูกนิตยามีลักษณะที่เป็นร่องจึงไม่รบกวนหลอดเลือดภายในโพรงกระดูกที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านของกระดูกและทำให้มีความมั่นคงบริเวณรอยหักของกระดูกได้ดี ในขณะที่การเลือกใช้แท่งเหล็กขนาดที่เหมาะสมควรเลือกให้แท่งเหล็กมีขนาดไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ของโพรงกระดูก เนื่องจากแท่งเหล็กนั้นมีลักษณะกลม ถ้าเลือกให้ขนาดพอดีกับโพรงกระดูกจะรบกวนหลอดเลือดภายในโพรงกระดูกซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการต่อต้านของกระดูก แม้ขนาดของวัสดุที่ใหญ่กว่าสามารถใส่ในโพรงกระดูกได้มั่นคงกว่าเป็นข้อได้เปรียบของการใช้แกนกระดูกนิตยา แต่แกนกระดูกนิตยานั้นมีเพียงปลายด้านหนึ่งซึ่งสัมผัสกับส่วนของ metaphysis เท่านั้น จึงไม่สามารถค้ำ หรือรับแรงตามแนวแกนกระดูกได้ดีเท่ากับการใส่แท่งเหล็กดามภายในโพรงกระดูกที่มีการฝังตัวที่ metaphysis ของกระดูกทั้งสองข้าง การฝังตัวของแท่งเหล็กที่ metaphysis ของกระดูกแม้จะช่วยเรื่องความมั่นคงและการถ่ายรับแรงก็ตาม แต่ตัว metaphysis ของ

กระดูกสัตว์ปีกบางกว่ากระดูกของสุนัขอย่างมาก การใส่แท่งเหล็กอาจเลยเข้าข้อต่อได้โดยง่าย หรือแม้มีการใส่แท่งเหล็กที่พอดีแต่การถ่ายรับน้ำหนักผ่านแท่งเหล็กอยู่เรื่อยๆ อาจโน้มนำให้แท่งเหล็กเคลื่อนเข้าไปในข้อต่อได้ นอกจากนี้การใส่แท่งเหล็กรักษากระดูกหักทั้งแบบ normograde และ retrograde ต้องมีปลายของแท่งเหล็กด้านหนึ่งยื่นเข้าไปในข้อเข้าเสมอ มุมการเคลื่อนไหวของขาที่กว้างและทำขึ้นของข้อเข้าปกติที่กระดูก femur และ กระดูก tibiotarsus ทำมุมกันมากกว่าในสุนัขมีโอกาที่จะทำให้ปลายแท่งเหล็กเสียดสีกับข้อเข้าได้ง่ายและทำให้ข้อต่อเสียหายเกิดเนื้อเยื่อพังผืดหุ้มข้อต่อและอาจเกิดข้อต้อยึดได้

จากผลการศึกษา พบว่าการใส่แกนกระดูกชนิดยาคตามภายในโพรงกระดูก มีความแข็งแรงพอเพียงที่จะยึดปลายของกระดูก tibiotarsus ที่หักให้อยู่ใกล้กันจนกระดูกสามารถต่อติดได้ อีกทั้งในระยะยาวยังไม่ปรากฏผลข้างเคียงใดๆ หรือปฏิกิริยาต่อต้านใดๆ จากตัวสัตว์ จึงน่าจะสามารถใส่แกนกระดูกชนิดยาคตามภายในกระดูกเพื่อรักษากระดูก tibiotarsus หักในสัตว์ปีกได้โดยไม่เกิดปัญหาแทรกซ้อนในระยะยาว ผู้วิจัยจึงเห็นว่าสามารถที่จะใช้แกนกระดูกชนิดยาคตามภายในโพรงกระดูกเป็นทางเลือกเพื่อการรักษากระดูก tibiotarsus หักในสัตว์ปีกได้ อย่างไรก็ตามการรักษากระดูกหักโดยวิธีการนี้ จะได้ผลสูงสุดเมื่อรักษากับกระดูกที่มีการหักแบบขวาง มีขนาดของโพรงกระดูกซึ่งใหญ่เพียงพอที่จะใส่แกนกระดูกชนิดยาคตามภายในกระดูกได้ ซึ่งสามารถประเมินขนาดของโพรงกระดูกที่เหมาะสมได้จาก ภาพถ่ายทางรังสีวิทยา ส่วนมากใช้ได้กับสัตว์ปีกที่มีน้ำหนักมากกว่า 300 กรัม ไม่มีการติดเชื้อ และบริเวณที่เกิดกระดูกหักไม่ชิดกับข้อต่อมากเกินไป สำหรับการรักษากระดูกท่อนอื่นๆ หักโดยวิธีการนี้นั้นน่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกระดูกที่ไม่มีโพรงอากาศอยู่ภายในได้ สำหรับกระดูกที่มีโพรงอากาศอยู่ภายในนั้นมียางงานการประยุกต์ใช้แท่ง polypropylene ในกระดูก humerus (Coles, 1985) แต่รายงานนั้นไม่ได้มีการศึกษาถึงผลในระยะยาว และปฏิกิริยาของกระดูก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าถ้ามีการหักของกระดูกที่มีโพรงอากาศอยู่ภายในก็น่าจะสามารถใช้แกนกระดูกชนิดยาคตามภายในโพรงกระดูกเพื่อรักษากระดูกหักได้ แต่ผลของการรักษาและปฏิกิริยาของกระดูกในระยะยาวยังคงต้องมีการศึกษาวิจัยต่อไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการอ้างอิง

- Amand, W.B. General techniques for Avian Surgery. In Current Veterinary Therapy VI, Small Animal Practice, pp. 711-720. USA. W.B.Saunders, 1977.
- Altman, R.B. Fracture of the Extremities of birds. In Current Veterinary Therapy VI, Small Animal Practice, pp. 711-720. USA. W.B.Saunders, 1977.
- Blass, C.E. Orthopedics. In Elisha, W.B.(ed.), Companion Bird Medicine, pp.155-165 Iowa: Iowa State University Press. Ames, 1987.
- Bush, M.; Montali, R.J.; Novak, G.R.; James, A.E. The healing of avian fracture: A histologic xeroradiographic study. J. Am. Anim. Hosp. Assoc. 12 (1976): 768-773
- Bush, M. External Fixation to Repair Long Bone Fracture in Larger Birds. In: Current Veterinary Therapy VIII, Small Animal Practice, pp. 630-632. USA. W.B.Saunders, 1983.
- Bennett, R.A. Orthopedic surgery. In: R.B.Altman, et al. (eds.), Avian Medicine and surgery, pp. 733-766. Philadelphia. W.B.Saunders, 1997.
- Borman, E.R. and Putney, D.L. Repaired of wing fracture with methlymethacrylate bone cement. Veterinary Medicine, pp. 794, 1978.
- Coles, B.H. Avian medicine and Surgery, pp. 145-164. London. Blackwell Scientific Publications, 1985.
- Forbes, N.A. Birds. In: S. Chris and G. Robin (eds.), Manual of Small Animal Anesthesia and Analgesia, pp. 283-293. British Small Animal Veterinary Association, 1999.
- Galvin, C. Care and Treatment of Captive Wild Birds. In Current Veterinary Therapy VII, Small Animal Practice, pp. 653-696. Toronto. W.B. Saunders, 1980.
- Harcourt-Brown, N. Orthopedic and beak surgery. In: H-B. Nigel and C. John (eds.), BSAVA Manual of Psittacine Birds. 2nd edition., pp. 120-132. England. BSAVA, 2005.
- Hutchinson, J.R. and Gateson, S.M. Adductors, abductors and the evolution of archosaur locomotion. Paleobiology. 26(April 2000): 734-751
- James, C.W. Skeletal System. In: C.J.Thomas, D.H. Ronald, W.K. Norval (eds.), Veterinary Pathology 6th edition., pp. 899-1288. USA. Williams and Wilkins, 1999


- Levitt, L. Avian orthopedics. In: Hoefer (eds.), Practical avian medicine, pp. 159-168. New Jersey. Veterinary Learning System. 1989.
- MacCartney, W. T. Orthopedics injuries in pigeons. Veterinary Record. 134(1994):305-307
- Maccoy, D.M. Modified Kirschner splints for application to small birds. Veterinary Medicine Small Animal Clinician (1981): 853-855
- Maccoy, D.M. High density polymer rod as an intramedullary fixation device in birds. J. Am. Anim. Hosp. Assoc. 19(1983): 767-772
- Maccoy, D.M. and Haschek, W.M. Healing of transverse humeral fractures in pigeons treated with ethylene oxide-sterilized, dry-stored, onlay cortical xenografts and allografts. Am. J. Vet. Res. 49(1988): 106-111
- Maccoy, D.M. 1991. General principle of avian surgery. In: Hoefer (eds.) Practical avian medicine, pp. 128-132. New Jersey. Veterinary Learning System, 1997.
- Maccoy, D.M. Orthopedic surgery. In: Roskopf and Woerper (eds.). Disease of Cage and Aviary Bird 3rd ed., pp. 722-737. Maryland. Williams and Wilkins, 1996
- Marlow, J.B. and Seibels, R.E. A Technique for Repairing Fractures in Birds. Veterinary Medicine (1981): 742-744
- Olmstead, M.L.; Egger, E.L.; Johnson, A.L. and Wallace, L.J. Principle of fracture repair In: Small Animal Orthopedics, pp. 111-112, 1996.
- Olsen, G.T. and Orosz, S.E. Avian Medicine, pp.493-523, 2000
- Redig, P. Fractures In: S. Jaimes (eds.) Avian Medicine, pp. 131-165. London. Mosby. 2000
- Redrobe, S. Pigeons. In: M. Anna and S. Redrobe (eds.) BSAVA Manual of Exotic Pets. 4th edition, pp. 157-178. England. BSAVA, 2002
- Rupley, A.E. Manual of avian practice, pp. 199-225. Philadelphia. Saunders, 1999.
- Splink, R.R. Fracture Repaire in Rehabilitation of Raptors. Journal of Veterinary Medicine Small Animal Clinician. (November 1987): 1451-1455
- Stocker, L. Fracture Management. In: Practical Wildlife Care. 2nd edition, pp. 67-162. Australia. Blackwell, 2005.
- Statterfield, W.C. and O'Rourke K.I. External skeletal Fixation in Avian orthopedics using a Modified Through-and-Through Kirschner-Ehmer Splint Technique (The Boston technique). Journal of the American Animal Hospital Association. 17(1981): 635-637



ภาคผนวก

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก



รูปที่ 12 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยา ทันทีก่อนการรักษาระดูก tibiotarsus หักโดยการใส่แกน กระบอกฉีดยาตามภายในโพรงกระดูก ปลายกระดูกหักเคลื่อนเล็กน้อย



รูปที่ 13 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 4 สัปดาห์ หลังการรักษาระดูก tibiotarsus หักโดยการใส่ แกนกระบอกฉีดยาตามภายในโพรงกระดูก พบการเคลื่อนของปลายกระดูกออกจากแนวปกติ เล็กน้อย และพบการพองปริมาณมากของกระดูกภายนอก



รูปที่ 14 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 8 สัปดาห์ หลังการรักษากระดูก tibiotarsus หัก โดยการใส่แกนกระบอกฉีดยาตามภายในโพรงกระดูก การพอกของกระดูกภายในโพรงกระดูกเพิ่มมากขึ้น การพอกของกระดูกภายนอกลดลง การจัดตัวของกระดูกใหม่ใกล้เคียงกับแนวปกติ




รูปที่ 15 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 10 สัปดาห์ หลังการรักษากระดูก tibiotarsus หัก โดยการใส่แกนกระบอกฉีดยาตามภายในกระดูก การพอกของกระดูกภายในโพรงกระดูกเพิ่มมากขึ้น การพอกของกระดูกภายนอกลดลง พบการต่อติของกระดูกอย่างปกติ



รูปที่ 16 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 12 สัปดาห์ ภายหลังจากการรักษากระดูก tibiotarsus หักโดยการใส่แกนกระดูกชนิดขยายตามภายในโพรงกระดูก พบการต่อติของกระดูกอย่างปกติ



รูปที่ 17 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 48 สัปดาห์ ภายหลังจากการรักษากระดูก tibiotarsus หักโดยการใส่แกนกระดูกชนิดขยายตามภายในโพรงกระดูก พบการต่อติของกระดูกอย่างปกติ กระดูกมีการปรับรูปร่างใกล้เคียงกับกระดูกปกติ



รูปที่ 18 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาทันที ภายหลังการรักษากระดูก tibiotalus หักโดยการใส่ แท่งเหล็กตามภายในโพรงกระดูก



รูปที่ 19 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 4 สัปดาห์ ภายหลังการรักษากระดูก tibiotalus หักโดยการใส่ แท่งเหล็กตามภายในโพรงกระดูก เริ่มมีการพอกของกระดูกเล็กน้อย ยังพบรอยหักของกระดูก



รูปที่ 20 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 8 สัปดาห์ ภายหลังจากการรักษากระดูก tibiotarsus หักโดยการใส่แท่งเหล็กตามภายในโพรงกระดูก มีการพอกของกระดูกมาก แต่ยังเห็นรอยหักของกระดูก



รูปที่ 21 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 10 สัปดาห์ ภายหลังจากการรักษากระดูก tibiotarsus หักโดยการใส่แท่งเหล็กตามภายในโพรงกระดูก พบการต่อติคของกระดูกจนไม่พบรอยหักของกระดูก มีการปรับรูปร่างของกระดูก




รูปที่ 22 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 12 สัปดาห์ ภายหลังการรักษากระดูก tibiotarsus หักโดยการใส่แท่งเหล็กตามภายในโพรงกระดูก มีการต่อติของกระดูกและปรับรูปร่างของกระดูก




รูปที่ 23 ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาที่ 48 สัปดาห์ ภายหลังการรักษากระดูก tibiotarsus หักโดยการใส่แท่งเหล็กตามภายในโพรงกระดูก มีการต่อติของกระดูกและปรับรูปร่างให้เหมือนกระดูกปกติ

ไถ่กลุ่มที่ 1 รักษากระดูก tibiotalar โดยการใส่แกนกระดูกนํ้าตามภายในโพรงกระดูก




25 ก)




25 ข)

รูปที่ 25 ก - ข) ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของกระดูกในไถ่กลุ่มที่ 1 ที่ระยะเวลา 4 สัปดาห์ภายหลังการศัลยกรรม ที่บริเวณปลายของกระดูกที่หักจะพบเซลล์ osteocyte (arrow head) ฝังตัวอยู่ภายในกระดูกปกติ การพอกของแคลเซียมค่อนข้างเรียบ ยังไม่พบการสร้างเนื้อเยื่อเยื่อพังผืด หรือ callus มาพอก (สีย้อม HE, กำลังขยาย 40 เท่า)


สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




26 ก)



26 ข)



26 ค)




26 ง)


รูปที่ 26 ก - ง ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของกระดูกในไก่กลุ่มที่ 1 ที่ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ภายหลังการศัลยกรรม ประกอบด้วย การสร้าง callus และเนื้อเยื่อพังผืด (fibrous, F) ปริมาณมากบริเวณเยื่อหุ้มกระดูก (periosteum, P) เนื้อกระดูกที่สร้างขึ้นใหม่ (new bone, N) และเม็ดเลือดแดง (red blood cell, R) (สีย้อม HE, กำลังขยาย 4 เท่า)

รูปที่ 26 ค ส่วนของเนื้อเยื่อพังผืด (fibrous, F) แทรกตัวอยู่ในเยื่อหุ้มกระดูก (periosteum, P) และกล้ามเนื้อ (muscle, M) (สีย้อม HE, กำลังขยาย 10 เท่า)


รูปที่ 26 ง การสร้างและการจัดเรียงกระดูกใหม่ซึ่งจะมีเซลล์ osteoclast (arrow head) เรียงตัวอยู่ที่ผิวของกระดูก และกระดูกใหม่ (new bone, N) ที่มีการซ่อมติดสีไม่สม่ำเสมอ (สีย้อม HE, กำลังขยาย 40 เท่า)



27 ก)



27 ข)




27 ค)



27 ง)

รูปที่ 27 ก - ง ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของกระดูกในไก่กลุ่มที่ 1 ที่ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ภายหลังการศัลยกรรม ประกอบด้วย การสร้างเนื้อเยื่อพังผืด (fibrous, F) เข้ามาหุ้มบริเวณกระดูกที่สร้างใหม่ (new bone, N) ซึ่งตรวจพบ การแทรกของกระดูกเล็กๆ (bony matrix) ที่สร้างใหม่ร่วมด้วย เนื้อกระดูกที่สร้างใหม่ที่ยังมีการสะสมของแร่ธาตุไม่สมบูรณ์ สีที่ย้อมติดจึงยังไม่สม่ำเสมอ พบ เซลล์ osteoclast (arrow head) จำนวนมากที่ผิวของกระดูก (สีย้อม HE, กำลังขยาย 4 เท่า)


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




28 ก)



28 ข)




28 ค)



28 ง)

รูปที่ 28 ก – ง ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของกระดูกในไถ่กลุ่มที่ 1 ที่ระยะเวลา 12 สัปดาห์ภายหลังการศัลยกรรม ประกอบด้วย การสร้างกระดูกใหม่ (new bone, N) ซึ่งเริ่มเปลี่ยนเป็นเนื้อกระดูกถาวร พบการอักเสบติดเชื้อของกระดูกสม่ำเสมอมากขึ้น พบการสะสมของเซลล์อักเสบ heterophil (H) (สีย้อม HE, กำลังขยาย 4 เท่า)


รูปที่ 28 ง เซลล์ osteoclast (arrow head) ซึ่งมีลักษณะเป็น multinucleated cell (สีย้อม HE, กำลังขยาย 10 เท่า)




29 ก)



29 ข)



29 ค)




29 ง)


รูปที่ 29 ก - ง ลักษณะโรคทางจุลพยาธิวิทยาของกระดูกในไก่กลุ่มที่ 1 ที่ระยะเวลา 48 สัปดาห์ ภายหลังการสัลยกรรม ประกอบด้วยเนื้อกระดูกที่ใกล้เคียงกับกระดูกปกติโดย เนื้อกระดูกที่มีการสร้างขึ้นมา มีการย้อมติดสี eosinophilic ที่ไม่เรียบ เซลล์ osteocyte (arrow head) ที่ฝังตัวอยู่ใน matrix มีขนาดเล็กทั้งนิวเคลียสและไซโตพลาสซึม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ไถ่กลุ่มที่ 2 รักษากระดูก tibiotarsus โดยการใส่แท่งเหล็กไม่เป็นสนิมยึดตามภายในโพรงกระดูก



30 ก)



30 ข)



30 ค)




30 ง)

รูปที่ 30 ก ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของกระดูกส่วน tibiotarsus ที่ปกติประกอบด้วยส่วนเยื่อหุ้มกระดูก (periosteum, P) เนื้อกระดูกส่วนนอก (cortex, C) และเนื้อกระดูกส่วนใน (medulla, M) ภายหลังรักษากระดูก tibiotarsus หักโดยใส่ แท่งเหล็กไม่เป็นสนิมยึดตามภายในโพรงกระดูก ที่ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ภายหลังการศัลยกรรม (สีย้อม HE, กำลังขยาย 4 เท่า)


รูปที่ 30 ข การอักเสบของเยื่อหุ้มกระดูก ประกอบด้วย กลุ่มของแบคทีเรียและเซลล์เม็ดเลือดขาว ซึ่งอยู่ด้านนอกเนื้อกระดูก (arrow head) (สีย้อม HE, กำลังขยาย 4 เท่า)

รูปที่ 30 ค การสะสมของเซลล์ heterophil บริเวณเยื่อหุ้มกระดูกที่มีการหนาตัว และ มีการสะสมของเม็ดสีชนิด lipofuscin ในเซลล์มาโครฟาจระหว่างมัดกล้ามเนื้อ (arrow head) (สีย้อม HE, กำลังขยาย 10 เท่า)


รูปที่ 30 ง กลุ่มของแบคทีเรียชนิด cocci ที่สะสมบริเวณเยื่อหุ้มกระดูกที่อักเสบ (arrow head) (สีย้อม HE, กำลังขยาย 40 เท่า)




31 ก)



31 ข)




31 ค)




31 ง)

รูปที่ 31 ก - ง ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของกระดูกส่วน tibiotarsus ในไก่กลุ่มที่ 2 ที่ระยะเวลา 8 สัปดาห์ภายหลังการศัลยกรรม ประกอบด้วยส่วน เยื่อหุ้มกระดูก (periosteum, P) ซึ่งพบเนื้อเยื่อพังผืด (fibrous, F) แทรกตัวในเยื่อหุ้มกระดูก และ เนื้อกระดูกส่วนที่สร้างใหม่ (new bone, N) (สีย้อม HE, กำลังขยาย 4 เท่า)


รูปที่ 31 ง การสร้างและการจัดเรียงกระดูกใหม่ ซึ่งจะพบเซลล์ osteoclast ลักษณะเป็น multinucleated cell (arrow head) ในบริเวณที่มีการจัดเรียงกระดูกใหม่ (สีย้อม HE, กำลังขยาย 40 เท่า)




32 ก)



32 ข)



32 ค)




32 ง)


รูปที่ 32 ก - ง ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของกระดูกส่วน tibiotarsus ในไก่กลุ่มที่ 2 ที่ระยะเวลา 10 สัปดาห์ภายหลังการศัลยกรรม ประกอบด้วยส่วนเยื่อหุ้มกระดูก (periosteum, P) ซึ่งพบเนื้อเยื่อพังผืด (fibrous, F) แทรกตัวในเยื่อหุ้มกระดูก เนื้อกระดูกส่วนที่สร้างใหม่ (new bone, N) และโพรงกระดูก (marrow cavity, MC) (สีย้อม HE, กำลังขยาย 4 เท่า)

รูปที่ 32 ข และ ค การสร้างและการจัดเรียงกระดูกใหม่ซึ่งจะพบเซลล์ osteoclast (arrow head) เรียงตัวอยู่ที่ผิวของกระดูก เนื้อกระดูกใหม่มีการเชื่อมติดสีไม่สม่ำเสมอ (new bone, N) เนื่องจากมีการสะสมของแร่ธาตุไม่สมบูรณ์ (สีย้อม HE, กำลังขยาย 4 เท่า)


รูปที่ 32 ง การอักเสบของเยื่อหุ้มกระดูก ซึ่งจะพบการสะสมของเซลล์อักเสบและแบคทีเรีย (arrow head) ในเนื้อเยื่อพังผืดบริเวณเยื่อหุ้มกระดูก (สีย้อม HE, กำลังขยาย 40 เท่า)




33 ก)



33 ข)



33 ค)



33 ง)


รูปที่ 33 ก - ง ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของกระดูกส่วน tibiotarsus หักในไถ่กลุ่มที่ 2 ที่ระยะเวลา 12 สัปดาห์ ภายหลังการศัลยกรรม ประกอบด้วย การสร้าง callus และเนื้อเยื่อพังผืด (fibrous, F) ปริมาณมากบริเวณเยื่อหุ้มกระดูก (periosteum, P) พบเนื้อกระดูกแทรกในเนื้อเยื่อพังผืด (arrow head) และการสร้างของกระดูกใหม่ (new bone, N) ซึ่งยังมีการสะสมของแคลเซียมที่ไม่สมบูรณ์ จึงพบการย้อมติดไม่สม่ำเสมอ (สีย้อม HE, กำลังขยาย 4 เท่า)

รูปที่ 33 ข การสร้างกระดูกใหม่ (new bone, N) พบการย้อมติดสี ไม่สม่ำเสมอเนื่องจากการสะสมของแร่ธาตุไม่สมบูรณ์ (สีย้อม HE, กำลังขยาย 40 เท่า)


รูปที่ 33 ง การแทรกของหลอดเลือดใหม่ (arrow head) และเซลล์เม็ดเลือดแดง (red blood cell, R) ในขณะที่มีการสร้างเนื้อกระดูก (สีย้อม HE, กำลังขยาย 40 เท่า)




34 ก)



34 ข)



34 ค)



34 ง)

รูปที่ 34 ก - ง ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของกระดูกในกลุ่มที่รักษากระดูก tibiotarsus หัก โดยใส่แท่งเหล็กไม่เป็นสนิมยึดตามภายในกระดูก ที่ระยะเวลา 48 สัปดาห์ภายหลังการศัลยกรรมพบการสร้างและปรับรูปร่างกระดูกใหม่ของกระดูกที่หัก ที่ใกล้เคียงกับกระดูกปกติ (mature bone, M) ซึ่งประกอบด้วย เนื้อกระดูกที่มีการสร้างขึ้นใหม่มีการย้อมติดสี eosinophilic ที่ไม่เรียบ เซลล์ osteocyte (arrow head) ที่ฝังตัวอยู่ใน matrix ซึ่งมีขนาดเล็กทั้งนิวเคลียส และไซโตพลาสซึม (สีย้อม HE, กำลังขยาย 4 เท่า)

ตารางที่ 3 คะแนนความเจ็บปวดของไก่อุ่มที่ 1 (n=10) ซึ่งรักษากระดูก tibiotarsus หักโดยการใส่
แกนกระดูกนิตยาคตามภายในโพรงกระดูก

สัปดาห์ที่	ไก่อุ่มที่					
	1	2	3	4	5	6
4	2	2	2	2	2	2
8	1	1	2	2	2	2
10	0	0	0	0	1	1
12	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0

ตารางที่ 4 คะแนนความเจ็บปวดของไก่อุ่มที่ 2 (n=9) ซึ่งรักษากระดูก tibiotarsus หักโดยการใส่
แท่งเหล็กยึดตามภายในกระดูกตามภายในโพรงกระดูก

สัปดาห์ที่	ไก่อุ่มที่				
	1	2	3	4	5
4	2	2	2	3	3
8	1	1	1	1	2
10	0	1	1	1	1
12	0	0	0	0	1
48	0	0	0	0	0

ตารางที่ 5 คะแนนระดับการต่อต้านของกระดูก ของไก่อุ่มที่ 1 (n=10) ซึ่งรักษากระดูก tibiotarsus
หักโดยการใส่แกนกระดูกนิตยาคตามภายในโพรงกระดูก

สัปดาห์ที่	ไก่อุ่มที่					
	1	2	3	4	5	6
4	1	1	1	2	2	2
8	2	3	3	3	3	3
10	3	3	3	3	3	3
12	3	3	3	3	3	3
48	3	3	3	3	3	3

ตารางที่ 6 คะแนนระดับการหายของกระดูก ของไก่กลุ่มที่ 2 ($n=9$) ซึ่งรักษากระดูก tibiotarsus หัก โดยการใส่แท่งเหล็กยึดตามภายในกระดูกตามภายในโพรงกระดูก

สัปดาห์ที่	ไก่ตัวที่				
	1	2	3	4	5
4	1	1	1	1	1
8	2	2	3	3	3
10	3	3	3	3	3
12	3	3	3	3	3
48	3	3	3	3	3

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาว มธุ บำรุง कुमार เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2523 ที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2547 จากนั้นเข้าศึกษาต่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2547 ในสาขาวิชา ศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย