

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| บทคัดย่อภาษาไทย | ก |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ | ค |
| กิตติกรรมประกาศ | จ |
| สารบัญตาราง | ช |
| สารบัญภาพ | ญ |
| บทที่ 1 บทนำ | 1 |
| 1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา | 1 |
| 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย | 5 |
| 3. คำถามของการวิจัย | 6 |
| 4. ขอบเขตของการวิจัย | 6 |
| 5. นิยามศัพท์ | 6 |
| 6. กรอบแนวคิดในการวิจัย | 7 |
| 7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | 8 |
| บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 11 |
| 1. ความหมายของภาวะสับสนฉับพลัน | 11 |
| 2. ลักษณะทางคลินิกที่สำคัญของภาวะสับสนฉับพลัน | 13 |
| 3. สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสับสนฉับพลัน | 17 |
| 4. พยาธิสรีรวิทยาของภาวะสับสนฉับพลัน | 22 |
| 5. การวินิจฉัยและแนวทางในการประเมินภาวะสับสนฉับพลัน | 24 |
| 6. การจัดการอาการภาวะสับสนฉับพลัน | 57 |
| 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 66 |
| บทที่ 3 วิธีการดำเนินการศึกษา | 71 |
| 1. ประชากรที่ศึกษา | 71 |
| 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย | 71 |
| 3. การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย | 74 |
| 4. การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล | 75 |
| 5. การวิเคราะห์ข้อมูล | 77 |
| 6. จริยธรรมในการวิจัย | 77 |

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| บทที่ 4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล | 81 |
| 1. ผลการศึกษา | 82 |
| 2. อภิปรายผลการศึกษา | 105 |
| บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ | 113 |
| 1. สรุปผลการวิจัย | 113 |
| 2. ข้อเสนอแนะ | 115 |
| บรรณานุกรม | 117 |
| ภาคผนวก | 125 |
| ภาคผนวก ก สถิติที่ใช้ในงานวิจัย | 127 |
| ภาคผนวก ข สำเนาหนังสือการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 131 |
| ภาคผนวก ค สำเนาหนังสือการขออนุญาตใช้เครื่องมือในการวิจัย | 135 |
| ภาคผนวก ง สำเนาหนังสือการอนุมัติการเก็บข้อมูลในโรงพยาบาล | 139 |
| ภาคผนวก จ คำชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและแบบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย | 143 |
| ภาคผนวก ฉ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย | 153 |
| ภาคผนวก ช ผลการศึกษาเพิ่มเติม | 179 |
| ภาคผนวก ซ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ | 201 |
| ประวัติผู้เขียน | 205 |

สารบัญตาราง

| | | หน้า |
|-------------|--|------|
| ตารางที่ 1 | เปรียบเทียบแบบประเมินการทำหน้าที่สมองที่เกี่ยวข้องกับปัญญา | 41 |
| ตารางที่ 2 | เปรียบเทียบแบบประเมินภาวะสับสนฉับพลัน | 42 |
| ตารางที่ 3 | เปรียบเทียบแบบประเมินที่ใช้วัดความรุนแรงของภาวะสับสนฉับพลัน | 48 |
| ตารางที่ 4 | เปรียบเทียบแบบประเมิน The Delirium Rating Scale, The Thai Delirium Rating Scale และ Thai Version Delirium Rating Scale | 50 |
| ตารางที่ 5 | การประเมินภาวะสับสนฉับพลันตามลักษณะอาการทางคลินิก | 53 |
| ตารางที่ 6 | การเปรียบเทียบลักษณะอาการทางคลินิกระหว่างภาวะสับสนฉับพลัน ภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า | 55 |
| ตารางที่ 7 | แนวทางในการจัดการภาวะสับสนฉับพลันตามสาเหตุการเกิด | 60 |
| ตารางที่ 8 | เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย | 79 |
| ตารางที่ 9 | จำนวนผู้ป่วยรับใหม่ ผู้สูงอายุที่ศึกษาและผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนฉับพลัน จำแนกตามหอผู้ป่วยที่ศึกษา | 83 |
| ตารางที่ 10 | ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุที่ศึกษา | 85 |
| ตารางที่ 11 | ข้อมูลความเจ็บป่วยก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล | 89 |
| ตารางที่ 12 | ข้อมูลความเจ็บป่วยเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล | 93 |
| ตารางที่ 13 | ข้อมูลการเกิดภาวะสับสนฉับพลัน | 95 |
| ตารางที่ 14 | ข้อมูลค่าคะแนนแบบประเมินภาวะสับสนฉับพลัน | 97 |
| ตารางที่ 15 | ข้อมูลลักษณะอาการของภาวะสับสนฉับพลันของผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนฉับพลัน | 99 |
| ตารางที่ 16 | ข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะสับสนฉับพลันของผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนฉับพลัน | 101 |
| ตารางที่ 17 | ข้อมูลการจัดการอาการภาวะสับสนฉับพลัน | 104 |
| ตารางที่ 18 | ข้อมูลโรคประจำตัวของผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนฉับพลัน | 181 |
| ตารางที่ 19 | ข้อมูลการวินิจฉัยโรคของผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนฉับพลัน | 183 |
| ตารางที่ 20 | ข้อมูลค่าคะแนนแบบประเมินการทำหน้าที่ของสมองที่เกี่ยวข้องกับปัญญาของผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนฉับพลัน | 186 |
| ตารางที่ 21 | ค่าคะแนนแบบประเมินภาวะสับสนฉับพลันของผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนฉับพลัน | 187 |
| ตารางที่ 22 | ข้อมูลลักษณะอาการของภาวะสับสนฉับพลัน | 189 |

สารบัญตาราง (ต่อ)

| | | หน้า |
|-------------|---|------|
| ตารางที่ 23 | ข้อมูลการจัดการอาการภาวะสับสนฉับพลัน | 191 |
| ตารางที่ 24 | ข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะสับสนฉับพลันของผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนฉับพลัน | 192 |

สารบัญภาพ

| | | หน้า |
|----------|---|------|
| ภาพที่ 1 | กรอบแนวคิดในการศึกษาภาวะสับสนฉับพลันและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การเกิดภาวะสับสนฉับพลันในผู้สูงอายุที่อยู่รักษาในโรงพยาบาล | 9 |
| ภาพที่ 2 | แนวทางดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาวะสับสนฉับพลันและปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะสับสนฉับพลันในผู้สูงอายุ | 78 |