

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้

n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

R แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ของพลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 344 นาย นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรที่นำมาศึกษา

ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัว กับ พฤติกรรมความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของพลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร (ตัวแปรตาม) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearsons Correlation Coefficients) โดยจำแนกเป็น

ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรที่นำมาศึกษา

ตารางที่ 4.1 จำนวนและร้อยละของสถานภาพทั่วไป

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน(n = 344)	ร้อยละ
1. สถานภาพ		
โสด	289	84.0
สมรส	50	14.5
หย่า	2	0.6
ไม่ระบุ	3	0.9
2. อาชีพ		
ลูกจ้าง	96	27.9
รับจ้าง	99	28.8
ทหาร	48	14.0
ทำนา/ทำไร่/ทำสวน	27	7.8
อาชีพส่วนตัว/ค้าขาย	26	7.6
นักเรียน	27	7.8
ไม่ระบุ	21	6.1
3. รายได้(บาทต่อเดือน)		
Mean $\pm$ sd	11,376.53 $\pm$ 8,101.11	
median(min-max)	9,500.00(1,000.00-80,000.00)	
4. ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	41	11.9
มัธยมศึกษา	197	57.3
อาชีวศึกษา	76	22.1
อุดมศึกษา	27	7.8
ไม่ระบุ	3	0.9

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ตัวแปร สถานภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 84 มีสถานภาพ โสด และ ร้อยละ 14.5 0.6 0.9 อยู่ในสถานภาพ สมรส หย่า ไม่ระบุ ตามลำดับ ตัวแปร อาชีพ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 28.8 27.9 14.0 มีอาชีพ รับจ้าง ลูกจ้าง ทหาร และร้อยละ 7.8 7.8 7.6 6.1 มีอาชีพ ทำนา/ทำไร่/ทำสวน นักเรียน/นักศึกษา อาชีพส่วนตัว/ค้าขาย ไม่ระบุ ตัวแปร รายได้ กลุ่มตัวอย่าง มีรายได้เฉลี่ย 11,376.53 บาท ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8,101.11 บาท ตัวแปร ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.3 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รองลงมา ร้อยละ 22.1 มีการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ร้อยละ 11.9 7.8 มีการศึกษา ระดับประถมศึกษา อุดมศึกษา และ ร้อยละ 0.9 ไม่ระบุระดับการศึกษา

ตารางที่ 4.2 จำนวนและร้อยละ ความรู้เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี

ข้อความ	ไม่ถูกต้อง		ถูกต้อง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง	7	2.0	337	98.0
2. เมื่อได้รับเชื้อเอดส์เข้าสู่ร่างกายแล้วจะแสดงอาการของโรคเอดส์ทันที	12	3.5	332	96.5
3. เชื้อโรคเอดส์เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำให้ภูมิคุ้มกันเสื่อมลง	8	2.3	336	97.7
4. อาการเริ่มแรกของโรคเอดส์คือ มีไข้เรื้อรัง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ท้องเสียเรื้อรัง ต่อมน้ำเหลืองโต	43	12.5	301	87.5
5. เมื่อป่วยเป็นโรคเอดส์แล้วไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้	53	15.4	291	84.6
6. ผู้ที่มีเชื้อเอดส์อยู่ในร่างกายแม้ไม่แสดงอาการใดๆเลยก็สามารถแพร่เชื้อได้	36	10.5	308	89.5
7. การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ กระทำได้โดยการตรวจเลือดเท่านั้น	276	80.2	68	19.8
8. ชายรักร่วมเพศ ผู้ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หญิงขายบริการทางเพศ เป็นผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์สูง	6	1.7	338	98.3
9. โรคเอดส์ติดต่อโดยการสัมผัสกับเลือด น้ำลาย น้ำกามของผู้มีเชื้อเอดส์	46	13.4	298	86.6
10. โรคเอดส์สามารถรักษาให้หายได้ ถ้ารู้ตัวตั้งแต่ระยะเริ่มแรก	128	37.2	216	62.8
11. ในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ได้แล้ว	120	34.9	224	65.1
12. การที่มีแผลหรือรอยถลอกบริเวณอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง ถ้ามีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อเอดส์ จะทำให้มีโอกาสติดเชื้อเอดส์ได้ง่าย	12	3.5	332	96.5
13. ถ้าท่านมีเชื้อเอดส์อยู่ในร่างกาย ท่านสามารถถ่ายทอดเชื้อเอดส์ไปสู่ภรรยาได้ โดยการมีเพศสัมพันธ์	11	3.2	333	96.8
14. เชื้อเอดส์ติดต่อกันได้โดย				
การร่วมเพศ	8	2.3	336	97.7
รับเลือดจากผู้ที่มีเชื้อเอดส์	9	2.6	335	97.4
ถูกเข็มที่มีเชื้อเอดส์กัด	93	27.0	251	73.0
ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน	2	0.6	342	99.4

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ข้อความ	ไม่ถูกต้อง		ถูกต้อง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ใช้ห้องน้ำ-ห้องส้วม ร่วมกัน	24	7.0	320	93.0
ว่ายน้ำในสระเดียวกัน	38	11.0	306	89.0
แม่ที่มีเชื้อเอดส์ถ่ายทอดสู่ลูกในครรภ์	28	8.1	316	91.9
รับประทานอาหารร่วมโต๊ะเดียวกัน	49	14.2	295	85.8
15. ในปัจจุบันเราสามารถป้องกันการติดเชื้อเอดส์โดย				
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่ภรรยา				
ของตน หรือ หญิงขายบริการทางเพศ	4	1.2	340	98.8
เลือกหญิงขายบริการทางเพศที่มีราคาแพง	23	6.7	321	93.3
ไม่ใช่เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น	20	5.8	324	94.2
งดการสำส่อนทางเพศ(เลิกเที่ยวผู้หญิง)	22	6.4	322	93.6
กินยาขับปัสสาวะทันทีหลังการมีเพศสัมพันธ์	40	11.6	304	88.4
ทำความสะอาดอวัยวะเพศหลายๆครั้งหลังการมีเพศสัมพันธ์				
กับหญิงขายบริการทางเพศ	132	38.4	212	61.6
เลือกหาคู่นอนที่เป็นขาประจำและไว้ใจได้	110	32.0	234	68.0

$\bar{X} = 24.04$ S.D. = 2.52 Max = 28.00 คะแนน Min = 12.00 คะแนน

จากตารางที่ 4.2 และ 4.3 พบว่า ความรู้เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี ของพลทหารกองประจำการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 24.04 คะแนน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร มีความรู้ที่ไม่ถูกต้องในเรื่องที่คิดว่า การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ กระทำได้โดยการตรวจเลือดเท่านั้น ถึงร้อยละ 80.2 มีความรู้ไม่ถูกต้องคือเข้าใจว่าในปัจจุบันสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ได้โดยทำความสะอาดอวัยวะเพศหลายๆ ครั้ง หลังการร่วมเพศกับหญิงบริการทางเพศ ร้อยละ 38.4 และร้อยละ 37.2 มีความรู้ที่ไม่ถูกต้อง คือ เข้าใจว่าในปัจจุบันโรคเอดส์สามารถรักษาให้หายได้ ถ้ารู้ตัวตั้งแต่ระยะเริ่มแรก มีความรู้ถูกต้องมากที่สุด ถึงร้อยละ 99.4 คือ เชื้อเอดส์ติดต่อกันได้โดยใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน และ ร้อยละ 98.8 มีความรู้ถูกต้องว่า ต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่ภรรยาของตน หรือ หญิงขายบริการทางเพศ

ตารางที่ 4.3 ร้อยละของพลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามร้อยละการตอบผิด ความรู้เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี โดยเรียงลำดับจากตอบผิดจากมากไปน้อย

ข้อคำถามเกี่ยวกับความรู้	ตอบ ผิด (%)
1. การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ กระทำได้โดยการตรวจเลือดเท่านั้น	80.2
2. สามารถป้องกันทำควมสะอาดอวัยวะเพศหลายๆครั้งหลังการมีเพศสัมพันธ์ กับหญิงขายบริการทางเพศ	38.4
3. โรคเอดส์สามารถรักษาให้หายได้ ถ้ารู้ตัวตั้งแต่ระยะเริ่มแรก	37.2
4. ในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ได้แล้ว	34.9
5. สามารถป้องกันโดยเลือกหาคู่นอนที่เป็นขาประจำและไว้ใจได้	32.0
6. เชื้อเอดส์ติดต่อกันได้โดยถูกยุงที่มีเชื้อเอดส์กัด	27.0
7. เมื่อป่วยเป็นโรคเอดส์แล้วไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้	15.4
8. เชื้อเอดส์ติดต่อกันได้โดยรับประทานอาหารร่วมโต๊ะเดียวกัน	14.2
9. โรคเอดส์ติดต่อโดยการสัมผัสกับเลือด น้ำลาย น้ำกาม ของผู้มีเชื้อเอดส์	13.4
10. อาการเริ่มแรกของโรคเอดส์คือ มีไข้เรื้อรัง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ท้องเสียเรื้อรัง ต่อมน้ำเหลืองโต	12.5
11. สามารถป้องกันโดยกินยาขับปัสสาวะทันทีหลังการมีเพศสัมพันธ์	11.6
12. เชื้อเอดส์ติดต่อกันได้โดยว่ายน้ำในสระเดียวกัน	11.0
13. ผู้ที่มีเชื้อเอดส์อยู่ในร่างกายแม้ไม่แสดงอาการใดๆเลยก็สามารถแพร่เชื้อได้	10.5
14. เชื้อเอดส์ติดต่อกันได้โดยแม่ที่มีเชื้อเอดส์ถ่ายทอดสู่ลูกในครรภ์	8.1
15. เชื้อเอดส์ติดต่อกันได้โดยใช้ห้องน้ำ-ห้องส้วม ร่วมกัน	7.0
16. สามารถป้องกันโดยเลือกหญิงขายบริการทางเพศที่มีราคาแพง	6.7
17. สามารถป้องกันโดยงดการสำส่อนทางเพศ(เลิกเที่ยวผู้หญิง)	6.4
18. สามารถป้องกันโดยไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น	5.8
19. เมื่อได้รับเชื้อเอดส์เข้าสู่ร่างกายแล้ว จะแสดงอาการของโรคเอดส์ทันที	3.5
20. การที่มีแผลหรือรอยถลอกบริเวณอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง ถ้ามีเพศสัมพันธ์กับ ผู้ที่มีเชื้อ เอดส์จะทำให้มีโอกาสติดเชื้อเอดส์ได้ง่าย	3.2

21. ถ้าท่านมีเชื้อเอดส์อยู่ในร่างกาย ท่านสามารถถ่ายทอดเชื้อเอดส์ไปสู่ภรรยาได้
โดยการมีเพศสัมพันธ์ 2.6
22. เชื้อเอดส์ติดต่อกันได้โดยรับเลือดจากผู้ที่มีเชื้อเอดส์ 2.3

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

ข้อคำถามเกี่ยวกับความรู้	ตอบผิด(%)
23. เชื้อเอดส์ติดต่อกันได้โดยการร่วมเพศ	2.3
24. เชื้อโรคเอดส์เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำให้ภูมิคุ้มกันเสื่อมลง	2.0
25. โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง	2.0
26. ชายรักร่วมเพศ ผู้ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันหญิงขายบริการทางเพศ เป็นผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์สูง	1.7
27. สามารถป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่ภรรยาของตนหรือ หญิงขายบริการทางเพศ	1.2
28. เชื้อเอดส์ติดต่อกันได้โดยใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน	0.6

จากตารางที่ 4.3 พบว่า พลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร มีความรู้ไม่ถูกต้องในเรื่องความรู้ การป้องกันและการรักษา ได้แก่ ในเรื่องความรู้ พบว่า พลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 27.0 ตอบผิดว่าโรคเอดส์ติดต่อกันได้โดยถูกยุงที่มีเชื้อเอดส์กัด ในเรื่องการป้องกัน พบว่า พลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 34.9 ตอบผิดว่าในปัจจุบันนี้มีวัคซีนป้องกันได้แล้ว และในเรื่องการรักษา พบว่าพลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 37.2 ตอบผิดว่าโรคเอดส์สามารถรักษาให้หายได้ถ้ารู้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

ตารางที่ 4.4 จำนวนและร้อยละของระดับการรับรู้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

ระดับการรับรู้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ระดับมาก (คะแนนตั้งแต่ 34.41-40.00)	105	30.5
ระดับปานกลาง (คะแนนตั้งแต่ 31.11-34.40)	130	37.8
ระดับน้อย (คะแนนตั้งแต่ 20.00-31.10)	109	31.7
$\bar{X} = 32.76$ S.D. = 3.29 Max = 40.00 คะแนน Min = 20.00 คะแนน		

จากตารางที่ 4.4 พบว่า เมื่อพิจารณาระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของพลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยที่ 32.76 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง มีจำนวนถึง 130 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 เมื่อมีการจัดแบ่งโดยการคิดวิธีอิงกลุ่ม จะมีระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 37.8 31.7 และ 30.5 อยู่ในระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับมาก ตามลำดับ

ตารางที่ 4.5 คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

ข้อความ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		$\bar{X}$	S.D.
	อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	เห็นด้วย	อย่างยิ่ง		
1. การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการ						
ทางเพศและการนวดเสียดเข้าทาง						
เส้นเลือด ทำให้มีโอกาสติดเชื้อเอดส์ได้	259(75.3)	73(21.2)	5(1.5)	7(2.0)	3.7	0.6
2. การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการ						
ทางเพศ ถึงแม้จะเป็นขาประจำ ถ้าไม่ใช้						
ถุงยางอนามัย จะทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้	231(67.1)	102(29.7)	6(1.7)	5(1.5)	3.63	0.6
3. การป่วยเป็นกามโรคหรือโรคติดต่อทาง						
เพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น เริม แผลที่อวัยวะ						
เพศ ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ได้	153(44.5)	168(48.8)	21(6.1)	2(0.6)	3.37	0.63
4. ทุกคนมีโอกาสติดเชื้อเอดส์ได้เท่ากัน	81(23.5)	132(38.4)	88(25.6)	43(12.5)	2.27	0.96
5. การหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเอดส์วิธีหนึ่งคือ						
การเที่ยวหญิงขายบริการทาง เพศที่มี						
ราคาแพง	21(6.1)	41(11.9)	158(45.9)	124(36.1)	3.12	0.84
6. การใช้ปากร่วมเพศ ที่รุนแรงจนเกิด						
บาดแผล กับคู่นอนที่มีเชื้อเอดส์ทำให้						
เราติดเชื้อเอดส์ได้	151(43.9)	159(46.2)	26(7.6)	8(2.3)	3.32	0.71
7. การใช้เครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ เช่น แปรง						
สีฟัน มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ ร่วมกับ						
บุคคลที่มีเชื้อเอดส์ ทำให้เราติดเชื้อเอดส์	96(27.9)	192(55.8)	44(12.8)	12(3.5)	3.08	0.74
8. การสำส่อนทางเพศ ทำให้เสี่ยงต่อการ						
ติดเชื้อเอดส์สูง	223(64.8)	106(30.8)	10(2.9)	5(1.5)	3.59	0.62

9. ถ้าร่างกายแข็งแรงแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้

ถุงยางอนามัยเมื่อต้องการมีเพศสัมพันธ์

กับหญิงขายบริการทางเพศ 17(4.9) 15(4.4) 125(36.3) 187(54.4) 3.4 0.79

10. การร่วมเพศทางทวารหนักกับกลุ่มรัก

ร่วมเพศ ไม่ทำให้ติดเชื้อเอดส์ 22(6.4) 32(9.3) 117(34.0) 173(50.3) 3.28 0.88

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ระดับการรับรู้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ที่ถูกต้องมากที่สุด ในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศถึงแม้จะเป็นขาประจำ ถ้าไม่ใช้ถุงยางอนามัยก็จะ ทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้ ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีจำนวนถึง 231 คน (ร้อยละ67.1) ตอบเห็นด้วย มีจำนวน 102 คน (ร้อยละ29.7) ในเรื่องการร่วมเพศกับหญิงบริการทางเพศและการฉีดยาเสพติดทางเส้นเลือด มีโอกาสติดเชื้อเอดส์ได้ ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีจำนวนถึง 259 คน (ร้อยละ75.3) ตอบเห็นด้วย มีจำนวน 73 คน (ร้อยละ21.2) ในเรื่อง การสำส่อนทางเพศทำให้เกิดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์สูง ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีจำนวนถึง 223 คน (ร้อยละ64.8) ตอบเห็นด้วย มีจำนวน 106 คน (ร้อยละ30.8) อย่างไรก็ตามในเรื่องที่เข้าใจผิดว่าทุกคนมีโอกาสติดเชื้อเอดส์ได้เท่ากัน ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีจำนวนถึง 81 คน (ร้อยละ23.5) ตอบเห็นด้วย มีจำนวน 132 คน (ร้อยละ38.4) ซึ่งในทางที่ถูกต้องคือ ถ้าบุคคลนั้นมีความรู้ในเชิงการป้องกันที่ถูกต้อง สามารถลดโอกาสที่จะติดเชื้อเอดส์ได้ นอกจากนี้ ยังคงเข้าใจผิดว่า การหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเอดส์วิธีหนึ่งคือ การเที่ยวหญิงขายบริการทางเพศที่มีราคาแพงโดยตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีจำนวนถึง 21 คน (ร้อยละ6.1) ตอบเห็นด้วย มีจำนวน 41 คน (ร้อยละ 11.9) ในเรื่องการใช้เครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆเช่น แปรงสีฟัน มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ ร่วมกับบุคคลที่มี เชื้อเอดส์ ทำให้เราติดเชื้อเอดส์ได้ ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีจำนวนถึง 12 คน (ร้อยละ3.5) ตอบไม่เห็นด้วย มีจำนวน 44 คน (ร้อยละ12.8) และ เข้าใจผิดว่าการร่วมเพศทางทวารหนักกับกลุ่มรัก ร่วมเพศ ไม่ทำให้ติดเชื้อเอดส์ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีจำนวนถึง 22 คน (ร้อยละ 6.4) ตอบเห็นด้วย มีจำนวน 32 คน (ร้อยละ9.3) ถึงแม้ว่าจะมีสัดส่วนความเข้าใจผิดไม่มากนักแต่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง ต่อการติดเชื้อเอชไอวี ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจถึงการป้องกันที่ถูกต้องแก่ พลทหารกองประจำการต่อไป

ตารางที่ 4.6 จำนวนและร้อยละของระดับการรับรู้ความรุนแรงของเชื้อไวรัสเอชไอวี

ระดับการรับรู้ความรุนแรงของเชื้อไวรัสเอชไอวี	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ระดับมาก (คะแนนตั้งแต่ 31.22-39.00)	97	28.2
ระดับปานกลาง (คะแนนตั้งแต่ 28.51-31.21)	139	40.4
ระดับน้อย (คะแนนตั้งแต่ 20.00-28.50)	108	31.4

$\bar{X} = 29.85$ S.D. = 2.72 Max = 39.00 คะแนน Min = 20.00 คะแนน

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ระดับการรับรู้ความรุนแรงของเชื้อไวรัสเอชไอวีของพลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยที่ 29.85 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง มีจำนวนถึง 139 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 เมื่อมีการจัดแบ่งโดยการคิดวิธีอิงกลุ่ม จะมีระดับการรับรู้ความรุนแรงของเชื้อไวรัสเอชไอวี ร้อยละ 40.4 31.4 และ 28.2 อยู่ในระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับมาก ตามลำดับ

ตารางที่ 4.7 คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความรุนแรงของเชื้อไวรัสเอชไอวี

ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง	$\bar{X}$	S.D.
1. โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง	248(72.1)	87(25.3)	8(2.3)	1(0.3)	3.69	0.53
2. ปัจจุบันมียา หรือ วัคซีนที่จะ รักษาและป้องกันโรคเอดส์ได้						
100%	15(4.4)	74(21.5)	157(45.6)	98(28.5)	2.98	0.82
3. เมื่อติดเชื้อเอดส์แล้วจะไม่มีทาง กำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้						
เชื้อยังคงอยู่ในร่างกายตลอดชีวิต	144(41.9)	168(48.8)	26(7.6)	6(1.7)	3.31	0.69
4. ท่านเชื่อว่า ถ้าท่านป่วยด้วยโรค เอดส์ ครอบครัวของท่านจะเอาใจ ใส่ดูแลและไม่ทอดทิ้งท่าน	72(20.9)	186(54.1)	75(21.8)	11(3.2)	2.93	0.74
5. ปัจจุบันโรคเอดส์ได้แพร่ระบาด ในกลุ่มหญิงทั่วไป เช่น นักศึกษา แม่บ้าน หญิงตั้งครรภ์	83(24.1)	199(57.8)	50(14.5)	12(3.5)	3.03	0.73
6. ลูกที่เกิดจากแม่ที่มีเชื้อเอดส์ ลูกมี โอกาสได้รับเชื้อเอดส์ 30 %	66(19.2)	214(62.2)	43(12.5)	21(6.1)	2.94	0.75
7. เมื่อติดเชื้อเอดส์ ควรร่วมเพศ บ่อยๆ จะทำให้เชื้อเอดส์ในตัว ลดลง	13(3.8)	13(3.8)	75(21.8)	243(70.6)	3.59	0.74
8. โดยส่วนตัวท่านมีความกลัวและ วิตกกังวลมากเกี่ยวกับโรคเอดส์	124(36.0)	161(46.8)	46(13.4)	13(3.8)	3.15	0.79
9. คนที่ติดเชื้อเอดส์ เมื่อเป็นแล้ว	77(22.4)	131(38.1)	106(30.8)	30(8.7)	2.26	0.9

ต้องตายด้วยโรคเอดส์ทุกคน

10. ท่านเชื่อว่าเมื่อท่านป่วยเป็นโรค

เอดส์ ท่านอาจจะถูกปลดจากการ

เป็นพลทหารกองประจำการ 142(41.3) 98(28.5) 77(22.4) 27(7.8) 1.97 0.98

จากตารางที่ 4.7 พบว่า การรับรู้ความรุนแรงของเชื้อไวรัสเอชไอวี ของพลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องโรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีจำนวนถึง 248 คน (ร้อยละ72.1) ตอบเห็นด้วย มีจำนวน 87 คน (ร้อยละ25.3) ในเรื่องเมื่อติดเชื้อเอดส์ ควรร่วมเพศบ่อยๆ จะทำให้เชื้อเอดส์ในตัวลดลง ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีจำนวนถึง243 คน (ร้อยละ 70.6) ตอบไม่เห็นด้วย มีจำนวน 75 คน (ร้อยละ21.8) และในเรื่องเมื่อติดเชื้อเอดส์แล้ว จะไม่มีทางกำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้ เชื้อยังคงอยู่ในร่างกายตลอดชีวิต ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่งมีจำนวนถึง 144 คน (ร้อยละ41.9) ตอบเห็นด้วย มีจำนวนถึง 168 คน (ร้อยละ48.8) อย่างไรก็ตาม ในเรื่องที่ว่าเมื่อป่วยเป็นโรคเอดส์ อาจจะถูกลดจากการเป็นพลทหารกองประจำการ ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีจำนวนถึง 142 คน (ร้อยละ41.3) ตอบเห็นด้วย มีจำนวนถึง 98 คน (ร้อยละ28.5) และ ในเรื่องที่ยังคงเข้าใจว่า คนที่ติดเชื้อเอดส์ เมื่อเป็นแล้วต้องตายด้วยโรคเอดส์ทุกคน ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีจำนวนถึง 77 คน (ร้อยละ22.4) ตอบเห็นด้วย มีจำนวนถึง 131คน (ร้อยละ38.1)

ตารางที่ 4.8 จำนวนและร้อยละของระดับการรับรู้ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามคำแนะนำ

ระดับการรับรู้ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามคำแนะนำ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ระดับมาก (คะแนนตั้งแต่ 33.91-40.00)	124	36.0
ระดับปานกลาง (คะแนนตั้งแต่ 31.03-33.90)	99	28.8
ระดับน้อย (คะแนนตั้งแต่ 22.00-31.02)	121	35.2

$\bar{X} = 32.46$ S.D. = 2.87 Max = 40.00 คะแนน Min = 22.00 คะแนน

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ระดับการรับรู้ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามคำแนะนำของพลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยที่ 32.46 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง มีจำนวนถึง 99 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 เมื่อมีการจัดแบ่งโดยการคิดวิธีอิงกลุ่ม จะมีระดับการรับรู้ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามคำแนะนำ ร้อยละ 36.0 35.2 และ 28.8อยู่ในระดับมาก ระดับน้อย และระดับปานกลาง ตามลำดับ

ตารางที่ 4.9 คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามคำแนะนำ

ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง	$\bar{X}$	S.D.
1. การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ทุกครั้ง จะทำให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ เอดส์	206(59.9)	125(36.3)	12(3.5)	1(0.3)	3.56	0.58
2. การกินยาขับปัสสาวะหลังการมี เพศสัมพันธ์ จะป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ เอดส์ได้	11(3.2)	56(16.3)	199(57.8)	78(22.7)	3.00	0.72
3. การป้องกันโรคเอดส์ทำได้ยากกว่า การรักษา	39(11.3)	87(25.3)	111(32.3)	107(31.1)	2.83	1.00
4. การไปตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอดส์ ทำ ให้มั่นใจว่าปลอดภัย จากโรคเอดส์	180(52.3)	141(41.0)	17(4.9)	6(1.7)	3.44	0.67
5. ท่านจะวิตกกังวลเมื่อต้องไปตรวจ เลือดหาเชื้อเอดส์	58(16.9)	182(52.9)	86(25.0)	18(5.2)	2.81	0.77
6. การพกถุงยางอนามัยตลอดเวลา ช่วยให้ท่านใช้ถุงยางอนามัย มากขึ้น	131(38.1)	149(43.3)	60(17.4)	4(1.2)	3.18	0.75
7. การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มี เพศสัมพันธ์กับหญิง ขาบริการทาง เพศ เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก น่ารำคาญ	15(4.4)	35(10.2)	147(42.7)	147(42.7)	3.24	0.81
8. ควรสังเกตดูความผิดปกติของคู่นอน เช่น แผลหรือหนอง ที่อวัยวะเพศ ก่อนมีเพศสัมพันธ์เสมอ	94(27.3)	165(48.0)	74(21.5)	11(3.2)	2.99	0.79

9. ถ้าท่านปัสสาวะแสบขัด มีแผลหรือ

หนองไหลจากท่อปัสสาวะ ท่านจะรีบ

มาพบแพทย์ทันที 241(70.1) 95(27.6) 7(2.0) 1(0.3) 3.67 0.53

10. ทุกคนควรมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ แม้

จะไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงก็ตาม 260(75.5) 78(22.7) 4(1.2) 2(0.6) 3.73 0.50

จากตารางที่ 4.9 พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามคำแนะนำ ในเรื่องทุกคนควรมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ แม้จะไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงก็ตาม ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีจำนวนถึง 260 คน (ร้อยละ 75.5) ตอบเห็นด้วย มีจำนวนถึง 78 คน (ร้อยละ 22.7) ในเรื่อง ถ้าท่านปัสสาวะแสบขัด มีแผลหรือหนองไหลจากท่อปัสสาวะ ท่านจะรีบมาพบแพทย์ทันที ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีจำนวนถึง 241 คน (ร้อยละ 70.1) ตอบเห็นด้วย มีจำนวนถึง 95 คน (ร้อยละ 27.6) และในเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง จะทำให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อเอดส์ ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีจำนวนถึง 206 คน (ร้อยละ 59.9) ตอบเห็นด้วย มีจำนวนถึง 125 คน (ร้อยละ 36.3)

เมื่อพิจารณาการรับรู้ทั้ง 3 ด้านโดยพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า พลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร มีการรับรู้ไม่ถูกต้องในด้านความรู้ การป้องกันและการรักษา เช่นในเรื่องความรู้ พลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 23.5 38.4 ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วย ตามลำดับ เข้าใจผิดว่า ทุกคนมีโอกาสติดเชื้อเอดส์ได้เท่ากัน และ ร้อยละ 22.4 38.1 ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วยตามลำดับ เข้าใจผิดว่าคนที่ติดเชื้อเอดส์ เมื่อเป็นแล้วต้องตายด้วยโรคเอดส์ทุกคน ในเรื่องการป้องกันพลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 41.3 28.5 ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วย ตามลำดับ เข้าใจผิดว่า ท่านเชื่อว่าเมื่อท่านป่วยเป็นโรคเอดส์ ท่านอาจจะถูกปลดจากการเป็นพลทหารกองประจำการ ในเรื่องการรักษาพลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 4.4 21.5 ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วย ตามลำดับ เข้าใจผิดว่า ปัจจุบันมียาหรือวัคซีนที่จะรักษาและป้องกันโรคเอดส์ได้ 100 %

ตารางที่ 4.10 จำนวนและร้อยละของระดับการได้รับข่าวสารและคำแนะนำจากแหล่งต่างๆ

ระดับการได้รับข่าวสารและคำแนะนำจากแหล่งต่างๆ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ระดับมาก (คะแนนตั้งแต่ 19.65-27.00)	79	23.0
ระดับปานกลาง (คะแนนตั้งแต่ 16.83-19.64)	156	45.3
ระดับน้อย (คะแนนตั้งแต่ 10.00-16.82)	109	31.7

$\bar{X} = 18.24$ S.D. = 2.81 Max = 27.00 คะแนน Min = 10.00 คะแนน

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากแหล่งต่าง ๆ ของพลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.24 ซึ่งในอยู่ระดับปานกลาง มีจำนวนถึง 156 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมา ร้อยละ 31.7 ได้รับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากแหล่งต่าง ๆ ในระดับน้อย และมีเพียงร้อยละ 23.0 ได้รับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากแหล่งต่าง ๆ ในระดับมาก

ตารางที่ 4.11 คะแนนเฉลี่ยการได้รับข่าวสารและคำแนะนำจากแหล่งต่างๆ

ข้อความ	ทุกครั้งหรือ บ่อยที่สุด	นานๆ ครั้ง	ไม่เคย	$\bar{X}$	S.D.
1. จากหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ	56(16.3)	262(76.1)	26(7.6)	2.09	0.48
2. โทรทัศน์ / ภาพยนตร์	154(44.8)	172(50.0)	18(5.2)	2.4	0.59
3. รายการวิทยุ	36(10.5)	215(62.5)	93(27.0)	1.83	0.59
4. แผ่นป้ายตามสถานที่ต่างๆ	116(33.7)	203(59.0)	25(7.3)	2.26	0.58
5. การจัดนิทรรศการเผยแพร่/นิทรรศการ ต่อต้านโรคเอดส์	87(25.3)	206(59.9)	51(14.8)	2.1	0.63
6. เอกสารหรือใบปลิว แนะนำเรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือโรคเอดส์ ตามสถานพยาบาล	107(31.2)	200(58.3)	36(10.5)	2.21	0.61
7. คำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มี ความรู้เรื่องโรคเอดส์	81(23.5)	225(65.4)	38(11.0)	2.12	0.58
8. คำแนะนำจากเพื่อน	37(10.8)	208(60.5)	99(28.8)	1.82	0.6
9. แหล่งอื่นๆ	24(7.1)	98(29.1)	215(63.8)	1.43	0.62

จากตารางที่ 4.11 พบว่า พลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก โทรทัศน์/ภาพยนตร์ ในระดับมาก ได้รับข้อมูลข่าวสารจากแผ่นป้ายตามสถานที่ต่างๆ หนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ รายการวิทยุ คำแนะนำจากเพื่อน คำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้เรื่องโรคเอดส์,การจัดนิทรรศการเผยแพร่/นิทรรศการต่อต้านโรคเอดส์ และเอกสารหรือใบปลิว แนะนำเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือโรคเอดส์ตามสถานพยาบาล ในระดับปานกลาง และได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งอื่นๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ในระดับน้อย

ตารางที่ 4.12 จำนวนและร้อยละของระดับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

ระดับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ระดับมาก (คะแนนตั้งแต่ 41.50-65.00)	99	28.8
ระดับปานกลาง (คะแนนตั้งแต่ 35.56-41.49)	135	39.2
ระดับน้อย (คะแนนตั้งแต่ 23.00-35.55)	110	32.0
$\bar{X} = 38.53$ S.D. = 5.93 Max = 65.00 คะแนน Min = 23.00 คะแนน		

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ระดับคะแนนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของพลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.53 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางถึงจำนวนถึง 135 คนคิดเป็นร้อยละ 39.2 เมื่อมีการจัดแบ่งโดยการคิดวิธีอิงกลุ่มจะมีระดับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 39.2 32.0 28.8 ในระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับมาก ตามลำดับ

ตารางที่ 4.13 คะแนนเฉลี่ยแสดงจำนวนและร้อยละพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

ข้อความ	ทุกครั้ง	บ่อยครั้ง	นานๆ ครั้ง	ไม่เคย	$\bar{X}$	SD
1. ท่านเคยสัมผัสเลือดของบุคคลอื่นขณะที่						
ท่านมีบาดแผล	0(0.0)	6(1.7)	129(37.5)	209(60.8)	1.41	0.53
2. ท่านมักจะใช้ของมีคม เช่น มีดโกน						
หมวด ร่วมกับผู้อื่น	1(0.3)	9(2.6)	170(49.4)	164(47.7)	1.56	0.56
3. ท่านเคยฉีดยาด้วยตัวเอง โดยใช้เข็มฉีด						
ยาร่วมกับผู้อื่น	0(0.0)	3(0.9)	7(2.0)	334(97.1)	1.04	0.23
4. ก่อนเข้ารับราชการทหาร ท่านเคยใช้สาร						
เสพติดเช่น ยาม้า	6(1.7)	17(4.9)	102(29.7)	219(63.7)	1.45	0.67
5. ท่านเคยเจาะหู หรือสักยันต์บริเวณ						
ร่างกายแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม	19(5.5)	31(9.0)	175(50.9)	119(34.6)	1.85	0.80
6. ท่านเคยมีประวัติได้รับเลือดหรือ						
ส่วนประกอบของเลือด	3(0.9)	0(0.0)	15(4.3)	326(94.8)	1.07	0.34
7. ท่านชอบเที่ยวสถานเรีงรมย์ หรือสถาน						
บริการทางเพศเสมอ	7(2.0)	28(8.1)	185(53.8)	124(36.1)	1.76	0.68
8. ท่านมักดื่มสุรา ก่อนการมีเพศสัมพันธ์	30(8.7)	53(15.4)	177(51.5)	84(24.4)	2.08	0.86
9. ท่านมีเพศสัมพันธ์เฉพาะคู่นอนของท่าน						
เพียงคนเดียว	134(39.0)	76(22.0)	90(26.2)	44(12.8)	2.13	1.07
10. ท่านมีเพศสัมพันธ์แบบเปลี่ยนคู่นอน						
บ่อยๆ	8(2.3)	22(6.4)	131(38.1)	183(53.2)	1.58	0.72
11. ท่านมักมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ						
ทางเพศ	3(0.9)	14(4.1)	126(36.6)	201(58.4)	1.47	0.62

12. ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์กับชายเพศ

เดียวกัน	4(1.2)	4(1.2)	22(6.3)	314(91.3)	1.12	0.45
----------	--------	--------	---------	-----------	------	------

13. ท่านสวมถุงยางอนามัยเมื่อมี

เพศสัมพันธ์	87(25.3)	86(25.0)	143(41.6)	28(8.1)	2.33	0.94
-------------	----------	----------	-----------	---------	------	------

14. ท่านไม่สวมถุงยางอนามัยเมื่อมี

เพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศ	201(58.4)	37(10.8)	43(12.5)	63(18.3)	3.09	1.20
-----------------------------------	-----------	----------	----------	----------	------	------

ตารางที่ 4.13 (ต่อ)

ข้อความ	ทุกครั้ง	บ่อยครั้ง	นานๆ ครั้ง	ไม่เคย	$\bar{X}$	SD
15. ท่านเตรียมถุงยางอนามัยไว้เสมอ เมื่อ						
จะซื้อบริการทางเพศ	64(18.6)	53(15.4)	141(41.0)	86(25.0)	2.72	1.04
16. ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์ทางปากหรือทาง						
ทวารหนัก	11(3.2)	18(5.2)	88(25.6)	227(66.0)	1.46	0.74
17. ก่อนใช้ถุงยางอนามัย ท่านตรวจสอบว่า						
ยังไม่หมดอายุ ของไม่มีรอยฉีก	166(48.3)	63(18.3)	51(14.8)	64(18.6)	2.04	1.17
18. ท่านสามารถระงับความต้องการทาง						
เพศด้วยการเล่นกีฬา	49(14.2)	111(32.3)	120(34.9)	64(18.6)	2.58	0.95
19. ท่านสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองแทน						
การสำส่อนทางเพศ	24(7.0)	56(16.3)	219(63.7)	45(13.0)	2.83	0.74
20. เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่						
ภรรยาตน ท่านไม่ได้สวมถุงยาง						
อนามัย เพราะคิดว่าเป็นการเสียเวลา	10(2.9)	15(4.4)	108(31.4)	211(61.3)	1.49	0.72
21. เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่						
ภรรยาตน ท่านไม่ได้สวมถุงยาง						
อนามัย เพราะคิดว่าไม่ใช่ครั้งแรก						
ไม่ติดเอดส์	12(3.5)	21(6.1)	87(25.3)	224(65.1)	1.48	0.76

จากตารางที่ 4.13 พบว่า พลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ในเรื่องท่านไม่สวมถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศ ตอบทุก

ครั้ง มีจำนวนถึง 201 คน (ร้อยละ 58.4) ตอบบ่อยครั้ง มีจำนวนถึง 37 คน (ร้อยละ 10.8) ท่านเตรียม
 ถุงยางอนามัยไว้เสมอ เมื่อจะซื้อบริการทางเพศ ตอบไม่เคย มีจำนวนถึง 86 คน (ร้อยละ 25)
 ตอบนานๆ ครั้ง มีจำนวนถึง 141 คน (ร้อยละ 41) ท่านสามารถระงับความต้องการทางเพศด้วยการ
 เล่นกีฬา ตอบไม่เคย มีจำนวนถึง 64 คน (ร้อยละ 18.6) ตอบนานๆ ครั้ง มีจำนวนถึง 120 คน (ร้อยละ
 34.9) ท่านสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองแทนการสำส่อนทางเพศ ตอบไม่เคย มีจำนวนถึง 45 คน (ร้อยละ
 13) ตอบนานๆ ครั้ง มีจำนวนถึง 219 คน (ร้อยละ 63.7) นอกจากนี้ ร้อยละ 41.6 ตอบว่า นานๆ ครั้ง
 จะสวมถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ และร้อยละ 8.1 ตอบว่า ไม่เคยสวมถุงยางอนามัยเลยเมื่อมี
 เพศสัมพันธ์ จากข้อมูลดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าต้องให้ความรู้ถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และ
 มาตรการใช้ถุงยางอนามัยแก่พลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างเร่งด่วน นอกจากนี้
 พบว่า พลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ค่อยมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ที่มีผลต่อการ
 ติดเชื้อเอชไอวี กล่าวคือในเรื่อง ท่านเคยฉีดยาด้วยตัวเอง โดยใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น ตอบไม่เคยมี
 จำนวน 334 คน (ร้อยละ 97.1) ตอบนานๆ ครั้งมีจำนวน 7 คน (ร้อยละ 2) ท่านเคยมีประวัติได้รับเลือด
 หรือส่วนประกอบของเลือดตอบไม่เคยมีจำนวน 326 คน (ร้อยละ 94.8) ตอบนานๆ ครั้งมีจำนวน 15 คน
 (ร้อยละ 4.3) และในเรื่องท่านเคยสัมผัสเลือดของบุคคลอื่น ขณะที่ท่านมีบาดแผลตอบไม่เคยมีจำนวน
 209 คน (ร้อยละ 60.8) ตอบนานๆ ครั้งมีจำนวน 129 คน (ร้อยละ 37.5)

ตารางที่ 4.14 จำนวนและร้อยละของระดับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ระดับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ระดับมาก (คะแนนตั้งแต่ 32.71-50.00)	68	19.8
ระดับปานกลาง (คะแนนตั้งแต่ 27.62-32.70)	170	49.4
ระดับน้อย (คะแนนตั้งแต่ 15.00-27.61)	106	30.8
$\bar{X} = 30.16$ S.D. = 5.08 สูงสุด = 50.00 คะแนน ต่ำสุด = 15.00 คะแนน		

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ระดับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของพลทหารกองประจำการในเขต
 กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.16 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง มีจำนวน 170 คน
 คิดเป็นร้อยละ 49.4 โดย ร้อยละ 49.4 30.8 19.8 มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ในระดับปานกลาง ระดับ
 น้อย ระดับมาก ตามลำดับ

ตารางที่ 4.15 คะแนนเฉลี่ยแสดงจำนวนและร้อยละระดับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ข้อความ	ทุกครั้ง	บ่อยครั้ง	นานๆ ครั้ง	ไม่เคย	$\bar{X}$	S.D.
1. ท่านชอบเที่ยวสถานเริงรมย์ หรือสถาน						
บริการทางเพศเสมอ	7(2.0)	28(8.1)	185(53.8)	124(36.1)	1.76	0.68
2. ท่านมักดื่มสุรา ก่อนการมีเพศสัมพันธ์	30(8.7)	53(15.4)	177(51.5)	84(24.4)	2.08	0.86
3. ท่านมีเพศสัมพันธ์เฉพาะคู่นอนของท่าน						
เพียงคนเดียว	134(39.0)	76(22.0)	90(26.2)	44(12.8)	2.13	1.07
4. ท่านมีเพศสัมพันธ์แบบเปลี่ยนคู่นอน						
บ่อยๆ	8(2.3)	22(6.4)	131(38.1)	183(53.2)	1.58	0.72
5. ท่านมักมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขาย						
บริการทางเพศ	3(0.9)	14(4.1)	126(36.6)	201(58.4)	1.47	0.62
6. ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์กับชายเพศ						
เดียวกัน	4(1.2)	4(1.2)	22(6.3)	314(91.3)	1.12	0.45
7. ท่านสวมถุงยางอนามัยเมื่อมี						
เพศสัมพันธ์	87(25.3)	86(25.0)	143(41.6)	28(8.1)	2.33	0.94
8. ท่านไม่สวมถุงยางอนามัยเมื่อมี						
เพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศ	201(58.4)	37(10.8)	43(12.5)	63(18.3)	3.09	1.20
9. ท่านเตรียมถุงยางอนามัยไว้เสมอ เมื่อจะ						
ซื้อบริการทางเพศ	64(18.6)	53(15.4)	141(41.0)	86(25.0)	2.72	1.04
10. ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์ทางปากหรือทาง						
ทวารหนัก	11(3.2)	18(5.2)	88(25.6)	227(66.0)	1.46	0.74
11. ก่อนใช้ถุงยางอนามัย ท่านตรวจสอบ	166(48.3)	63(18.3)	51(14.8)	64(18.6)	2.04	1.17

ว่ายังไม่หมดอายุ ของไม่มีรอยฉีก

12. ท่านสามารถรับความต้องการทาง

เพศด้วยการเล่นกีฬา 49(14.2) 111(32.3) 120(34.9) 64(18.6) 2.58 0.95

13. ท่านสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองแทน

การสำส่อนทางเพศ 24(7.0) 56(16.3) 219(63.7) 45(13.0) 2.83 0.74

ตารางที่ 4.15 (ต่อ)

ข้อความ	ทุกครั้ง	บ่อยครั้ง	นานๆ ครั้ง	ไม่เคย	$\bar{X}$	S.D.
14. เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่ ภรรยาตน ท่านไม่ได้สวมถุงยาง อนามัย เพราะคิดว่าเป็นการเสียเวลา	10(2.9)	15(4.4)	108(31.4)	211(61.3)	1.49	0.72
15. เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่ ภรรยาตน ท่านไม่ได้สวมถุงยาง อนามัย เพราะคิดว่าไม่ใช่ครั้งเดียวคง ไม่ติดเอดส์	12(3.5)	21(6.1)	87(25.3)	224(65.1)	1.48	0.76

จากตารางที่ 4.15 พบว่า พลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ในเรื่องท่านไม่ได้สวมถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการทางเพศ ตอบทุกครั้ง มีจำนวนถึง 201 คน (ร้อยละ 58.4) ตอบบ่อยครั้ง มีจำนวนถึง 37 คน (ร้อยละ 10.8) ท่านเตรียมถุงยางอนามัยไว้เสมอ เมื่อจะซื้อบริการทางเพศ ตอบไม่เคย มีจำนวนถึง 86 คน (ร้อยละ 25) ตอบนานๆ ครั้ง มีจำนวนถึง 141 คน (ร้อยละ 41) ท่านสามารถรับความต้องการทางเพศด้วยการเล่นกีฬา ตอบไม่เคย มีจำนวนถึง 64 คน (ร้อยละ 18.6) ตอบนานๆ ครั้ง มีจำนวนถึง 120 คน (ร้อยละ 34.9) ท่านสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองแทนการสำส่อนทางเพศ ตอบไม่เคย มีจำนวนถึง 45 คน (ร้อยละ 13) ตอบนานๆ ครั้ง มีจำนวนถึง 219 คน (ร้อยละ 63.7) นอกจากนี้ ร้อยละ 41.6 ตอบว่า นานๆ ครั้ง จะสวมถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ และร้อยละ 8.1 ตอบว่า ไม่เคยสวมถุงยางอนามัยเลยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ จากข้อมูลดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าต้องให้ความรู้ถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยแก่พลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างเร่งด่วน

ตารางที่ 4.16 จำนวนและร้อยละของระดับพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ

ระดับพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ระดับมาก (คะแนนตั้งแต่ 9.22-19.00)	105	30.5
ระดับปานกลาง (คะแนนตั้งแต่ 7.54-9.21)	131	38.1
ระดับน้อย (คะแนนตั้งแต่ 6.00-7.53)	108	31.4
$\bar{X} = 8.38$ S.D. = 1.68 Max = 19.00 คะแนน Min = 6.00 คะแนน		

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ระดับพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆของพลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.38 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางมีจำนวน 131 คน โดยที่ร้อยละ 38.1 31.4 30.5 มีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ในระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับมาก ตามลำดับ

ตารางที่ 4.17 คะแนนเฉลี่ยแสดงจำนวนและร้อยละพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ

ข้อความ	ทุกครั้ง	บ่อยครั้ง	นานๆ ครั้ง	ไม่เคย	$\bar{X}$	SD
1. ท่านเคยสัมผัสเลือดของบุคคลอื่น						
ขณะที่ท่านมีบาดแผล	0(0.0)	6(1.7)	129(37.5)	209(60.8)	1.41	0.53
2. ท่านมักจะใช้ของมีคม เช่น มีดโกน						
หมวด ร่วมกับผู้อื่น	1(0.3)	9(2.6)	170(49.4)	164(47.7)	1.56	0.56
3. ท่านเคยฉีดยาด้วยตัวเอง โดยใช้เข็ม						
ฉีดยาร่วมกับผู้อื่น	0(0.0)	3(0.9)	7(2.0)	334(97.1)	1.04	0.23
4. ก่อนเข้ารับราชการทหาร ท่านเคยใช้						
สารเสพติดเช่น ยาม้า	6(1.7)	17(4.9)	102(29.7)	219(63.7)	1.45	0.67
5. ท่านเคยเจาะหู หรือสักยันต์บริเวณ						
ร่างกายแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม	19(5.5)	31(9.0)	175(50.9)	119(34.6)	1.85	0.80
6. ท่านเคยมีประวัติได้รับเลือดหรือ						
ส่วนประกอบของเลือด	3(0.9)	0(0.0)	15(4.3)	326(94.8)	1.07	0.34

จากตารางที่ 4.17 พบว่า พลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ค่อยมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ที่มีผลต่อการติดเชื้อเอชไอวี กล่าวคือในเรื่อง ท่านเคยฉีดยาด้วยตัวเอง โดยใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น ตอบไม่เคยมีจำนวน 334 คน (ร้อยละ 97.1) ตอบนานๆ ครั้งมีจำนวน 7 คน (ร้อยละ 2) ท่านเคยมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด ตอบไม่เคยมีจำนวน 326 คน (ร้อยละ 94.8) ตอบนานๆ ครั้งมีจำนวน 15 คน (ร้อยละ 4.3) และในเรื่อง ท่านเคยสัมผัสเลือดของบุคคลอื่นขณะที่ท่านมีบาดแผลตอบไม่เคยมีจำนวน 209 คน (ร้อยละ 60.8) ตอบนานๆ ครั้งมีจำนวน 129 คน (ร้อยละ 37.5)

ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัว กับ พฤติกรรมความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของพลทหารกองประจำการในเขตกรุงเทพมหานคร (ตัวแปรตาม) โดย Pearson s Correlation Coefficients โดยจำแนกเป็น

ตารางที่ 4.18 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านการรับรู้เรื่องโรคเอดส์ ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากแหล่งต่างๆ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

ปัจจัย	พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)	P-value
1. ปัจจัยด้านการรับรู้เรื่องโรคเอดส์		
ความรู้เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี	0.200	< 0.001*
การรับรู้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	0.124	0.021*
การรับรู้ความรุนแรงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	0.097	0.073
การรับรู้ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามคำแนะนำ	0.155	0.004*
2. ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากแหล่งต่างๆ	0.183	0.001*

*P<.05 มีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุด คือ $r = 0.200$ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามคือ มีความรู้เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีมาก พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีจะน้อยลง ส่วนปัจจัยด้านการรับรู้ความรุนแรงต่อการติดเชื้อเอชไอวีไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

ตารางที่ 4.19 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านการรับรู้เรื่องโรคเอดส์ ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากแหล่งต่างๆ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ปัจจัย	พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)	P-value
1. ปัจจัยด้านการรับรู้เรื่องโรคเอดส์		
ความรู้เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี	0.186	0.001*
การรับรู้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	0.122	0.024*
การรับรู้ความรุนแรงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	0.100	0.063
การรับรู้ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามคำแนะนำ	0.171	0.001*
2. ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำ		
จากแหล่งต่างๆ	0.208	< 0.001*

*P<.05 มีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากแหล่งต่างๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากที่สุด คือ $r = 0.208$ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามคือ การได้รับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากแหล่งต่างๆ มาก พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจะน้อยลง ส่วนปัจจัยด้านการรับรู้ความรุนแรงต่อการติดเชื้อเอชไอวีไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ตารางที่ 4.20 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านการรับรู้เรื่องโรคเอดส์ ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากแหล่งต่างๆ และพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ

ปัจจัย	พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)	P-value
1. ปัจจัยด้านการรับรู้เรื่องโรคเอดส์		
ความรู้เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี	0.146	0.007*
การรับรู้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	0.069	0.203
การรับรู้ความรุนแรงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	0.039	0.472
การรับรู้ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามคำแนะนำ	0.031	0.561
2. ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำ		
จากแหล่งต่างๆ	0.020	0.712

*P<.05 มีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆมากที่สุด คือ $r = 0.146$ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามคือ ความรู้เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีมาก พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ จะน้อยลง ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆเลย

