

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง Cross-Sectional Descriptive Study เพื่อศึกษาการรับรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของมารดาหลังคลอดทางด้านสุขภาพ ในการมารับบริการดูแลหลังคลอดเมื่อครบ 6 สัปดาห์ ของมารดาหลังคลอด ในสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหลังคลอดที่มารับบริการดูแลหลังคลอดเมื่อครบ 6 สัปดาห์ จำนวน 128 คน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2551 แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านประชากร ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ ข้อมูลการรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด การรับรู้ด้านการปฏิบัติตัว และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมารับบริการหลังคลอด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมารับบริการระหว่างกลุ่ม ใช้ Chi-square test ที่ระดับนัยสำคัญที่  $P=0.05$

ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 82.8 ของมารดามีการรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ร้อยละ 88.3 ของมารดารับรู้ถึงประโยชน์ของการมารับบริการหลังคลอด และร้อยละ 92.2 รับรู้ถึงสัมพันธภาพที่ดีกับพยาบาลที่ดูแลระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ทางด้านสุขภาพโดยรวมกับลักษณะด้านประชากร พบว่า รายได้ อาชีพ และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ของมารดาต่อการมารับบริการหลังคลอด ( $P\text{-value} < 0.05$ )

ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถนำไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานสำหรับพยาบาลในการวางแผนการพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดให้มีสุขภาพดีต่อไป

The cross-sectional study was conducted in post-partum women at Special Medical Center Chiang Mai University. The objectives were to study the perceptions and factors related to attendance of a six-week postpartum services of the hospital. One hundred and twenty eight postpartum women were recruited during April and June 2008. Data were collected by interview questionnaires which consisted of population data; age, married status, education and income and mother's perceptions on the importance of post-partum care, risk and severity of complications and factors related to attending the post-partum services. Descriptive statistics was used, describing in percentage, mean and standard deviation. To compare factors between the groups, Chi Square test was used with the significance level of 5%.

The result showed that 82.8 percent of women perceived the risk and severity of complications during postpartum period. Eighty-eight percent perceived the values and benefits of post-partum services provided by the hospital and 92.2 percent accepted that they had good relationships with health care a provider especially nurses. There was a significant difference of postpartum service attendance between the group with different incomes, occupation, and education (P-value <0.05).

The findings provide knowledge to be used in planning nursing care to promote health for women during postpartum.