

ผู้ที่เป็โรคจิตจากสารแอมเฟตามีนมีอัตรากลับเป็นซ้ำสูงเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อการกลับไปเสพสารแอมเฟตามีนซ้ำ การศึกษาเชิงพรรณนาคั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสพซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีน กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่เป็โรคจิตจากสารแอมเฟตามีน ที่เข้ารับการรักษารูปแบบผู้ป่วยใน ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2545 จำนวน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คัดแปลงจากแบบสอบถามของนันทา ชัยพิชิตพันธ์ (2541) ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) ปัจจัยนำ 3) ปัจจัยเอื้ออำนวย และ 4) ปัจจัยสนับสนุน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา พบว่า

1. ด้านปัจจัยนำ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 49 และร้อยละ 59 มีความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับสารแอมเฟตามีนอยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ
2. ด้านปัจจัยเอื้ออำนวย กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 81 มีการเสพสารแอมเฟตามีนในชุมชน ร้อยละ 78 ได้สารแอมเฟตามีนมาโดยการซื้อเอง ร้อยละ 78 ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสารแอมเฟตามีนจากโทรทัศน์ ร้อยละ 62 ไม่มีการผลิตแต่มีการจำหน่ายสารแอมเฟตามีนในชุมชน และร้อยละ 38 ซื้อสารแอมเฟตามีนได้ง่ายในบริเวณชุมชนที่อาศัย
3. ด้านปัจจัยสนับสนุน กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 82 มีเพื่อนสนิทเสพสารแอมเฟตามีน ร้อยละ 72 ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสารแอมเฟตามีนจากเพื่อน ร้อยละ 69 มีเพื่อนที่เสพสารแอมเฟตามีนอยู่ในชุมชนเดียวกัน และร้อยละ 48 สมาชิกในครอบครัวรู้ดีกว่าการเสพซ้ำเป็นถึงไม่ดี ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน

ผลการศึกษาคั้งนี้ สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการเสพสารแอมเฟตามีนซ้ำของบุคคลกลุ่มนี้ต่อไป

The relapse rate of amphetamine use is relatively high in persons with amphetamine induced psychotic disorder. This is due to many influencing factors. The purpose of this descriptive study was to study factors related to amphetamine reuse among persons with amphetamine induced psychotic disorder. The subjects consisted of 85 persons with amphetamine induced psychotic disorder who were readmitted to the Suanprung Hospital during April to June, 2002. The instrument of this study was a questionnaire, which modified from Nanta Chaipichitpan (1998), consisting of four parts: 1) demographic data, 2) predisposing factors, 3) enabling factors, and 4) reinforcing factors. Data analysis was done by descriptive statistics.

The study results were as follows:

1. Predisposing factors: Forty-nine and fifty-nine percents of the subjects reported a moderate level in terms of knowledge and attitude related to amphetamine respectively;

2. Enabling factors: Eighty-one percent of the subjects reported amphetamine reuse in their communities, 78 percent bought amphetamine by themselves, 78 percent received information related to amphetamine from televisions, 62 percent had not produced but sold amphetamine in their communities, and 38 percent had easy access to amphetamine in their communities; and

3. Reinforcing factors: Eighty-two percent of the subjects reported having closed friends using amphetamine, 72 percent received information related to amphetamine from their friends, 69 percent had friends using amphetamine lived in the same communities, and 48 percent had family members with negative feelings toward amphetamine.

These findings could be used as a baseline information to develop prevention guideline in amphetamine reuse in this group of population.