

ฐิติมา ธารประสิทธิ์ : ผลของการให้ข้อมูลขณะผ่าตัดต่อความวิตกกังวลของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยผ่าตัดฉุกเฉิน (THE EFFECT OF GIVING INTRAOPERATIVE INFORMATION ON ANXIETY OF FAMILY CAREGIVERS OF EMERGENCY SURGICAL PATIENTS)

อ.ที่ปรึกษา : รศ.ดร. สุรพร ธนศิลป์, 114 หน้า ISBN 974-14-3329-8

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้ข้อมูลขณะผ่าตัดต่อความวิตกกังวลของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยผ่าตัดฉุกเฉิน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยผ่าตัดห้องฉุกเฉิน ณ ห้องผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลตรัง จัดเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 20 คน โดยคำนึงถึงความคล้ายคลึงกันในเรื่องเพศ ความสัมพันธ์ อายุ และชนิดของการผ่าตัด กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ในขณะที่กลุ่มทดลองได้รับข้อมูลขณะผ่าตัด เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ การให้ข้อมูลขณะผ่าตัด คู่มือสำหรับครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด วิดีทัศน์เรื่องการให้ข้อมูลขณะผ่าตัดและแบบทดสอบความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ชุด คือ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและแบบวัดความวิตกกังวล ซึ่งได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.9 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที่

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ความวิตกกังวลหลังการทดลองของกลุ่มทดลองต่ำกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความวิตกกังวลหลังการทดลองของกลุ่มทดลองต่ำกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

# # 4577640036 : MAJOR NURSING ADULT

KEY WORD : INTRAOPERATIVE INFORMATION/ANXIETY OF FAMILY CAREGIVERS OF EMERGENCY SURGICAL PATIENTS

TITIMA THANPRASITT : THE EFFECT OF GIVING INTRAOPERATIVE INFORMATION ON ANXIETY OF FAMILY CAREGIVERS OF EMERGENCY SURGICAL PATIENTS.

THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. SUREEPORN THANASILP, D.N.S., 114 pp.  
ISBN 974-14-3329-8

The purposes of this quasi-experimental research were to study the effects of giving intraoperative information on anxiety of family caregivers of emergency surgical patients. The research subjects consisted of 40 family caregivers of emergency surgical patients, Trang Hospital, family caregivers of emergency surgical patients were selected by matched pair into an experimental group and a control group. Two groups were similar in sex, relation, age, and operation. The control group received routine nursing care while the experimental group received intraoperative information. Research instruments were an intraoperative information, handbook for patient's family about caring surgical patient, operative video and knowledge test sheet. Research data were obtained by questionnaires of families' anxiety. The instruments were validated by panel of experts. The Cronbach's alpha coefficient were .90. Statistical techniques used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test.

Major results were as follows:

1. The anxiety at the posttest phase of the experimental group was significantly lower than the anxiety at the pretest phase ( $p < .05$ ).
2. The anxiety at the posttest phase of the experimental group was significantly lower than that of the control group ( $p < .05$ ).