

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 ปริมาณสารเคมีในสารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi Solution สำหรับปลูกผักกาดหอมพันธุ์ Red Oak ที่เติมโพแทสเซียมไอโอไดด์ และโพแทสเซียมไอโอเดต 6 ความเข้มข้น โดยแต่ละความเข้มข้นมี ไอโอไดด์และไอโอเดตเท่ากับ 1, 5, 10, 50 และ 100 ไมโครโมลาร์	30
3.2 ปริมาณสารเคมีในสารละลายธาตุอาหารสูตร Hoagland and Arnon สำหรับปลูกผักบ่งจิ้นพันธุ์ยอดไผ่ 9 ที่เติมโพแทสเซียมไอโอไดด์ และโพแทสเซียมไอโอเดต 6 ความเข้มข้น โดยแต่ละความเข้มข้น มีไอโอไดด์และไอโอเดตเท่ากับ 1, 5, 10, 50 และ 100 ไมโครโมลาร์.....	31
4.1 ความสูงต้น (เซนติเมตร) ของผักกาดหอมพันธุ์ Red Oak ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่เติมไอโอไดด์และไอโอเดต ความเข้มข้น 0, 1, 5, 10, 50 และ 100 ไมโครโมลาร์ เมื่ออายุ 14, 21, 28, 35 และ 42 วันหลังเพาะเมล็ด	37
4.2 ความกว้างทรงพุ่ม (เซนติเมตร) ของผักกาดหอมพันธุ์ Red Oak ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่เติมไอโอไดด์และไอโอเดต ความเข้มข้น 0, 1, 5, 10, 50 และ 100 ไมโครโมลาร์ เมื่ออายุ 14, 21, 28, 35 และ 42 วันหลังเพาะเมล็ด	39
4.3 จำนวนใบของผักกาดหอมพันธุ์ Red Oak ที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่เติมไอโอไดด์และไอโอเดตความเข้มข้น 0, 1, 5, 10, 50 และ 100 ไมโครโมลาร์ เมื่ออายุ 14, 21, 28, 35 และ 42 วันหลังเพาะเมล็ด	41
4.4 ความยาวรากของผักกาดหอมพันธุ์ Red Oak ที่ปลูกในสารละลาย ธาตุอาหารที่เติมไอโอไดด์และไอโอเดตความเข้มข้น 0, 1, 5, 10, 50 และ 100 ไมโครโมลาร์ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต (42 วันหลังเพาะเมล็ด) ...	43

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.5	น้ำหนักสดและแห้งของต้นและรากของผักกาดหอมพันธุ์ Red Oak ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่เติมไอโอไดด์และไอโอเดต ความเข้มข้น 0, 1, 5, 10, 50 และ 100 ไมโครโมลาร์ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต (42 วันหลังเพาะเมล็ด) 44
4.6	ความสูงต้น (เซนติเมตร) ของผักบั้งจีนพันธุ์ยอดไผ่ 9 ที่ปลูกใน สารละลายธาตุอาหารที่เติมไอโอไดด์และไอโอเดตความเข้มข้น 0, 1, 5, 10, 50 และ 100 ไมโครโมลาร์ เมื่ออายุ 13, 17 และ 21 วันหลังเพาะเมล็ด 46
4.7	เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น (มิลลิเมตร) ของผักบั้งจีนพันธุ์ยอดไผ่ 9 ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่เติมไอโอไดด์และไอโอเดต ความเข้มข้น 0, 1, 5, 10, 50 และ 100 ไมโครโมลาร์ เมื่ออายุ 13, 17 และ 21 วันหลังเพาะเมล็ด..... 48
4.8	จำนวนใบของผักบั้งจีนพันธุ์ยอดไผ่ 9 ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหาร ที่เติมไอโอไดด์และไอโอเดตความเข้มข้น 0, 1, 5, 10, 50 และ 100 ไมโครโมลาร์ เมื่ออายุ 13, 17 และ 21 วันหลังเพาะเมล็ด 50
4.9	ความยาวรากของผักบั้งจีนพันธุ์ยอดไผ่ 9 ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหาร ที่เติมไอโอไดด์และไอโอเดตความเข้มข้น 0, 1, 5, 10, 50 และ 100 ไมโครโมลาร์ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต (21 วันหลังเพาะเมล็ด) 51
4.10	น้ำหนักสดและแห้งของต้นและรากของผักบั้งจีนพันธุ์ยอดไผ่ 9 ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่เติมไอโอไดด์และไอโอเดต ความเข้มข้น 0, 1, 5, 10, 50 และ 100 ไมโครโมลาร์ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต (21 วันหลังเพาะเมล็ด) 53

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางผนวกที่	หน้า
ค. 1 ปริมาณไอโอไดต์ที่สะสมในต้นและรากของผักกาดหอมพันธุ์ Red Oak ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่เติมไอโอไดต์ ความเข้มข้น 0, 1, 5, 10, 50 และ 100 ไมโครโมลาร์ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต (42 วันหลังเพาะเมล็ด)	83
ค. 2 ปริมาณไอโอเดตที่สะสมในต้นและรากของผักกาดหอมพันธุ์ Red Oak ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่เติมไอโอเดต ความเข้มข้น 0, 1, 5, 10, 50 และ 100 ไมโครโมลาร์ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต (42 วันหลังเพาะเมล็ด)	84
ง. 1 ปริมาณไอโอไดต์ที่สะสมในต้นและรากของผักบุ้งจีนพันธุ์ยอดไผ่ 9 ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่เติมไอโอไดต์ความเข้มข้น 0, 1, 5, 10, 50 และ 100 ไมโครโมลาร์ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต (21 วันหลังเพาะเมล็ด)	85
ง. 2 ปริมาณไอโอเดตที่สะสมในต้นและรากของผักบุ้งจีนพันธุ์ยอดไผ่ 9 ที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่เติมไอโอเดตความเข้มข้น 0, 1, 5, 10, 50 และ 100 ไมโครโมลาร์ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต (21 วันหลังเพาะเมล็ด)	86