

ในการที่จะให้ผู้ป่วยจิตสูรามีส่วนร่วมในการบำบัดรักษาโดยการมารับการรักษาตามแผนการรักษาอย่างต่อเนื่องนั้น พยาบาลควรตระหนักถึงความพร้อมในการรับการรักษาของผู้ป่วยกลุ่มนี้ ซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลให้ผู้ผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุราไปในทางที่ดีได้ การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมในการรับการรักษาของผู้ป่วยจิตสูราในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2549 จำนวน 190 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือข้อมูลส่วนบุคคล และแบบวัดขั้นตอนของความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและความต้องการการรักษาสำหรับผู้จิตสูรา ที่พัฒนาขึ้นโดยมิลเลอร์ และ โทนิแกน (Miller & Tonigan, 1996) และแปลเป็นภาษาไทยโดยพิชัย แสงชาญชัย (2546) และปรับปรุงโดยพันธุ์ภา กิตติรัตนไพบูลย์ (2547) หาค่าความเชื่อมั่นโดยการวัดซ้ำ (test-retest) ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันเท่ากับ 0.84 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมในการรับการรักษาในด้านการยอมรับ อยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x}=32.20$, $SD=1.93$) ด้านความลังเลอยู่ในระดับสูง ($\bar{x}=17.20$, $SD=1.60$) และด้านกำลังลงมือทำอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x}=33.11$, $SD=4.07$)

ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน และพัฒนาโปรแกรมในการเตรียมความพร้อมในการรับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยจิตสูรากลุ่มนี้ต่อไป

ABSTRACT

176079

In order to get better cooperation in that the patients with alcohol dependence will continue on the treatment plan, it is important for a nurse to be aware of readiness for treatment of these patients. This may result in a change of drinking behavior of the patients with a favorable outcome. The purpose of this descriptive study was to examine the level of readiness for treatment of patients with alcohol dependence at Suan Prung Psychiatric hospital. Purposive sampling was used to select 190 patients who presented themselves for treatment at the out-patient department of Suan Prung Psychiatric hospital, Chiang Mai province, during March to April 2006. The study instrument was a questionnaire set in two parts; the Demographic Data and the Stage of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale (SOCRATES-8A), developed by Miller and Tonigan (1996) and translated into Thai by Pichai Sangchanchai (2003) and further modified by Phunnapa Kittirattanapaiboon (2004). The Pearson's product moment coefficient of the questionnaire was 0.84. The data were analyzed by using descriptive statistics.

The results revealed that patients with alcohol dependence at Suan Prung Psychiatric hospital, Chiang Mai province had moderate level of recognition ($\bar{x}=32.20$, $SD=1.93$), high level of ambivalence ($\bar{x}=17.20$, $SD=1.60$), and moderate level of taking steps ($\bar{x}=33.11$, $SD=4.07$).

The study results can be used as basic information to plan and develop an intervention to prepare for readiness of treatment of patients with alcohol dependence.