

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดอันตรายในเด็กวัยเตาะแตะในชุมชน ก่อนการปฏิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพ และหลังการปฏิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพ ใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลองชนิดกลุ่มเดียว วัด 3 ครั้ง โดยประเมินพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดอันตราย ก่อนการปฏิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพ และหลังสิ้นสุดการปฏิบัติพยาบาล 2 ครั้ง กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาของเด็กวัยเตาะแตะในชุมชนของจังหวัดชุมพร ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 25 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการปฏิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ และแบบประเมินพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดอันตรายในเด็กวัยเตาะแตะในชุมชน ซึ่งมีความเที่ยงสัมประสิทธิ์ของครอนบาค เท่ากับ .87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดอันตรายในเด็กวัยเตาะแตะในชุมชน หลังสิ้นสุดการปฏิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพทันที สูงกว่าก่อนการปฏิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดอันตรายในเด็กวัยเตาะแตะในชุมชน หลังสิ้นสุดการปฏิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพ 2 สัปดาห์ สูงกว่าก่อนการปฏิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดอันตรายในเด็กวัยเตาะแตะในชุมชน หลังสิ้นสุดการปฏิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพทันที ไม่แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมหลังสิ้นสุดการปฏิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพ 2 สัปดาห์

The purposes of this quasi-experimental study was to compare mothers' behavior concerning injury prevention in toddlers before and after joining the nursing program which integrated support from the health alliance team in the community. The research design is one group pretest posttest design. The participants were 25 mothers of toddlers residing in one village of Chumporn province. Content validity of the measure was assessed by a panel of experts and internal consistency, based on Cronbach's alpha, was reported at .87. Data were collected during one pre-intervention and two post-intervention using measure of mother's injury preventive behavior. Data were analyzed using a one-way ANOVA. Post-hoc analysis was performed using Scheffe' method.

The major findings were as follows:

1. Immediately after the intervention, the mean score on injury preventive behavior of mothers was significantly higher than that of the mothers before joining the program. ($p < .05$).
2. Two weeks post-intervention, the mean score on injury preventive behavior of mothers was significantly higher than that of the mothers before joining the program. ($p < .05$).
3. There was no significant difference between the mean score on injury preventive behavior of mothers at immediately after the intervention and 2 weeks post-intervention.