



#### 4. การทดลองที่ 4 การประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนหลงลับแลนอกฤดู


การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวพบว่าในระยะเก็บเกี่ยว (11.4 เปอร์เซ็นต์) เกิดจากการเก็บทุเรียนที่อ่อน เนื่องจากการเคาะฟุ้งเสียง หรือดูลิงผิดพลาด ต้องอาศัยความชำนาญของผู้ตัดทุเรียนสูง ในขณะที่การสูญเสียในขณะขนส่ง (7.5 เปอร์เซ็นต์) เกิดจากการใช้รถมอเตอร์ไซด์ บรรทุกจากสวนทุเรียนตามไหล่เขา มายังบริเวณโรงคัดบรรจุ และบรรทุกโรตทรีกระบะสู่ตลาด ส่วนการสูญเสียในขณะวางจำหน่าย (81.1 เปอร์เซ็นต์) เกิดจากผลแตกมากที่สุด (26.5 เปอร์เซ็นต์) เนื่องจากการสุกของทุเรียน รองลงไปคือ โรคผลเน่า โรคคราดำ โรคคราแป้ง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ตามลำดับ เนื่องจากการขาดการจัดการศัตรูพืชไม่ดีเท่าที่ควร



ภาพ 4.1 การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนหลงลับแล ที่เกิดขึ้นในระยะเก็บเกี่ยว



ภาพ 4.2 การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนหลงลับแล ที่เกิดขึ้นในระยะขงนส่ง



ภาพ 4.3 การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนหลงลับแล ที่เกิดขึ้นในระยะการวางจำหน่าย